

מדריך למטופל ליבטאיו (סמיפלימאב)

מידע בטיחותי חשוב למזעור סיבוכים הנובעים מתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון

מדריך למטופל זה יסייע לך לזהות ולדווח על כל תסמין (סימפטום) של תופעות לוואי מהטיפול שלך בליבטאיו.

מידע חשוב

- לפני תחילת הטיפול בליבטאיו ספר לרופא שלך על כל הבעיות הרפואיות מהן אתה סובל ועל כל התרופות שאתה מקבל.
- ליבטאיו עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות אשר עלולות להחמיר.
- דווח לרופא שלך על כל תסמיני תופעות הלוואי, גם אם הם אינם מפורטים במדריך למטופל זה.
- אל תדחה דיווח על תסמיני תופעות לוואי כלשהן לרופא שלך, גם אם אתה נמצא הרחק מהבית.
- אל תנסה לטפל באף אחד מהתסמינים הללו בעצמך מבלי להתייעץ תחילה עם הרופא שלך.
- עליך לשאת עמך תמיד את כרטיס מידע למטופל במשך כל מהלך הטיפול.
- הצג את כרטיס המידע למטופל לכל הרופאים שאתה פוגש מלבד הרופא המטפל שרשם לך ליבטאיו.

ליבטאיו משמש לטיפול במבוגרים עם סרטן עור שנקרא קרצינומה עורית גרורתית או בעלת פולשנות מקומית מסוג תאי קשקש (CSCC) שאינם מועמדים לניתוח מרפא או קרינה מרפאה. ליבטאיו מכיל את החומר הפעיל סמיפלימאב, שהינו נוגדן חד שבטי החוסם PD-1. ליבטאיו פועל על ידי עזרה למערכת החיסון שלך, להילחם בסרטן. ליבטאיו פועל על המערכת האימונית שלך ועלול לגרום לדלקת בחלקי גופך השונים.

עליך לפנות לטיפול רפואי דחוף אם יש לך סימן או תסמין כלשהו מהרשימה שלהלן, או שהם מחמירים:

תופעות עוריות

- פריחה או גרד
- שלפוחיות בעור
- כיבים בפה או ברקמות ריריות אחרות

תופעות בריאות (דלקת ברקמת הריאות [פנאומוניטיס])

- שיעול חדש או החמרה בשיעול קיים
- קוצר נשימה
- כאב בחזה

תופעות במעי (דלקת במעי הגס [קוליטיס])

- שלשולים תכופים, לעיתים קרובות עם דם או ריר
- תנועות מעיים רבות יותר מהרגיל
- צואה שחורה הדומה לזפת
- כאב חמור או רגישות בבטן

תופעות בכבד (דלקת בכבד [הפטיטיס])

- הצהבת העור או לובן העיניים
- בחילות או הקאות חמורות
- כאב בצד ימין של הבטן
- ישנוניות
- שתן כהה (בצבע תה)
- דימום או הופעת חבורות בקלות רבה יותר מהרגיל
- ירידה בתחושת הרעב לעומת המצב הרגיל

תופעות בבלוטות ההורמונליות

- כאב ראש שאינו חולף או כאבי ראש חריגים
- פעימות לב מהירות
- הזעה מוגברת
- תחושת קור
- עייפות חמורה
- סחרחורת או עלפון
- עלייה במשקל או ירידה במשקל
- עלייה בתחושת הרעב או הצימאון לעומת המצב הרגיל
- נשירת שיער
- עצירות
- הקול שלך נעשה עמוק יותר
- לחץ דם נמוך מאוד
- מתן שתן לעתים תכופות יותר מהרגיל
- בחילות או הקאות
- כאב בטן
- שינויים במצב הרוח או בהתנהגות (כגון חשק מיני ירוד, עצבנות או שכחנות)

סוכרת מסוג 1

- עלייה בתחושת הרעב או הצימאון לעומת המצב הרגיל
- צורך במתן שתן לעתים תכופות יותר
- ירידה במשקל
- תחושת עייפות

תופעות בכליות (דלקת כליות [נפריטיס] ואי ספיקת כליות)

- מתן שתן בתדירות נמוכה יותר מהרגיל
- דם בשתן
- נפיחות בקרסוליים
- ירידה בתחושת הרעב לעומת המצב הרגיל

תגובות הקשורות לעירוי (לעתים יכולות להיות חמורות או מסכנות חיים)

- צמרמורות
- רעד או חום
- גרד או פריחה
- סומק או נפיחות בפנים
- קוצר נשימה או צפצופים בנשימה
- תחושת סחרחורת או תחושת עלפון
- כאב בגב או בצוואר

תופעות באזורי גוף אחרים

- כאב ראש או נוקשות בצוואר
- חום
- תחושת עייפות או חולשה
- בלבול
- בעיות זיכרון או תחושת ישנוניות
- פרכוסים
- ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים במציאות (הזיות)
- שינויים בראייה
- כאב או אודם בעיניים
- חולשת שרירים חמורה
- שינויים בקצב הלב, כגון קצב לב מהיר או תחושה של החסרת פעימה או תחושת הלמות לב
- חבורות או דימומים בעור

מידע חשוב ליצירת קשר

שם הרופא _____

מס' טלפון של הרופא _____

שם המטופל _____

מס' הטלפון של המטופל _____

איש קשר שלי למקרה חירום _____

מס' טלפון של איש קשר למקרה חירום _____

למידע נוסף, יש לעיין בעלון לצרכן או לפנות לחברת סאנופי 09-8633700
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>
כמו כן ניתן לדווח ישירות לחברת סאנופי 09-8633700
פורמט מדריך למטופל זה ותוכנו עודכנו ואושרו על ידי משרד הבריאות במרץ 2020.

REGENERON | SANOFI GENZYME 

Sanofi ו-Regeneron משתפות פעולה בפיתוח הגלובלי ושיווק של ליבטאיו (סמיפלימאב).
כל הזכויות שמורות.