

הוראות מתן תרסיס אסקטמין לאף



יש להימנע מאכילה
לפחות שעתיים לפני מתן
אסקטמין



יש להימנע ממתן
תרופות הנלקחות דרך
האף כשעה לפני מתן
אסקטמין



יש להימנע משתיה
לפחות חצי שעה לפני
מתן אסקטמין

תרסיס אחד מכיל 28 מ"ג של אסקטמין

כל תרסיס מכיל שני ריסוסים (ריסוס אחד לכל נחיר)

28 מ"ג



תרסיס אחד

56 מ"ג



שני תרסיסים

84 מ"ג



שלושה תרסיסים

מתן אסקטמין

שלב האינדוקציה

פעמיים בשבוע



שלב התחזוקה

פעם בשבוע



פעם בשבוע /
פעם בשבועיים
עד חצי שנה
לפחות.

9+

24

שבועות

תרסיס לאף אסקטמין



תרסיס לאף אסקטמין מיועד לנטילת תרופה בידי המטופל, תחת השגחת איש צוות רפואי. קרא הוראות שימוש אלה במלואן לפני שתדריך את המטופל ותשגיח עליו.


תרסיס אחד מכיל שני ריסוסים ריסוס אחד לכל נחיר.

2 נקודות ירוקות (ניתנו 0 מ"ג)




התרסיס מלא

נקודה ירוקה אחת



ניתן ריסוס אחד

אין נקודות ירוקות (ניתנו 28 מ"ג)



התרסיס ריק

שלב 1 התכונן



ודא את מספר תרסיסי אף אסקטמין הנדרשים.

28 מ"ג = תרסיס אחד


56 מ"ג = שני תרסיסים

84 מ"ג = שלושה תרסיסים




הנחה את המטופל לקנח את אפו לפני התרסיס הראשון בלבד.

שלב 4 המטופל מרסס פעם אחת לתוך כל נחיר



על המטופל:

להחזיר את קצה התרסיס ישר אל תוך הנחיר הראשון. על המשענת לאף לנעת בעזר שבין הנחיריים.




על המטופל:

לסגור את הנחיר הנגדי. לנשום פנימה דרך האף תוך כדי לחיצה על הבוכנה עד הסוף כלפי מעלה, עד שהיא תיעצר.



על המטופל:

למשוך בעדינות באפו לאחר הריסוס, כדי להשאיר את התרופה בתוך האף.



על המטופל:

להעביר את התרסיס לצידו השני כדי להכניס את קצה התרסיס לתוך הנחיר השני.


לחזור על שלב 4 למתן ריסוס שני.

שלב 2 הכן את התרסיס



איש צוות רפואי:

בדוק את תאריך התפוגה ("EXP"). אם הוא חלף, קח תרסיס חדש. הסר את כיסוי המגשית והוצא את התרסיס.



איש צוות רפואי:

אין לנער את התרסיס. הדבר יגרום לאובדן תרופה. בדוק שהסמן מראה שתי נקודות ירוקות.

במידה ולא, השלך את התרסיס וקח תרסיס חדש. תן את התרסיס למטופל.

שלב 3 הכן את המטופל



על המטופל:

להחזיק את התרסיס כמו באיור כאשר האגוזל תומך בעדינות בבוכנה. אין ללחוץ על הבוכנה.



על המטופל:

להשעין את הראש בזווית של 45 מעלות במהלך מתן התרופה על מנת שנוזל התרסיס ישאר בתוך האף.

שלב 5 ודא מתן תרופה ומנוחה



איש צוות רפואי:

קח את התרסיס מהמטופל. בדוק שהסמן אינו מראה נקודות ירוקות. אם תבחין בנקודה ירוקה, דאג שהמטופל ירסס שוב לנחיר השני. בדוק שוב את הסמן כדי לוודא שהתרסיס ריק.



על המטופל:

לנוח בתנוחה נוחה (עדיף שעון חלקית) למשך 5 דקות לאחר כל תרסיס. אין לקנח את האף. אם נוזל מטפטף החוצה, יש לטפוח קלות על האף באמצעות מגבון.

התרסיס הבא (במקרה הצורך)

28 מ"ג	5
56 מ"ג	5
84 מ"ג	5

איש צוות רפואי:

יש לחזור על שלבים 2-5 אם דרוש יותר מתרסיס אף אסקטמין אחד.

חשוב:

ודא שהמטופל ממתין 5 דקות לאחר כל תרסיס כדי לאפשר לתרופה להיספג.

השלך תרסיסים/ים משומשים לתוך מיכל המיועד לחפצים חדים.