

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

בפנטון® פלוס
קרם

הרכב:

כל גרם מכיל:

Dexpanthenol 50 mg

דקספנטנול 50 מ"ג

Chlorehexidine dihydrochloride 5mg

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 5 מ"ג

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, נא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 10 - 14 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיטוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון גירויים קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.

קבוצה תרפויטית:

דקספנטנול – פרו ויטמין B5

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד – מחטא (אנטיספטי)

בפנטון פלוס מכיל כלורהקסידין שקוטל חיידקים על העור או מאט את קצב גידולם וכך מונע או מממן זיהום חיידקי בפצעים שהתלכלכו. התכשיר מכיל גם דקספנטנול, שבעור נהפך לחומצה פנטוטנית מה שתומך בחידוש תאי העור מבפנים בקצב מואץ וכך גורם לזירוז ריפוי הפצע. העור שנוצר הינו גמיש יותר. הקרם קל למריחה והסרה בשטיפה ואינו שומני או דביק.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לדקספנטנול, לכלורהקסידין דיהידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אין למרוח תכשיר זה על עור תוף מנוקב.
- אין להשתמש בבפנטון® פלוס לפצעים עמוקים, חמורים או מזוהמים. טיפול בפצעים אלו יתבצע על ידי הרופא.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• לפני הטיפול בבפנטון® פלוס ספר לרופא אם:

- הנך סובל ממחלה כלשהי.
- הנך סובל מאלרגיות, רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי.
- הנך נוטל תרופות אחרות (כולל תרופות ללא מרשם) או עושה שימוש במשחות אחרות.

- יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזניים ורקמות ריריות.
- שימוש חוזר באותו שטח עור עלול להוביל לגירוי העור.
- בפנטון® פלוס מתאים לשימוש על שטחי עור מצומצמים בלבד. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.
- פצעים נרחבים, עמוקים, חמורים או מזוהמים וכן עקיצות/נשיכות ופצעי דקירה דורשים פנייה לרופא/טיפול רפואי בגלל הסיכון לזיהום טטנוס.
- יש לפנות לרופא במידה וגודל הפצע איננו קטן לאחר זמן מה או במידה והפצע איננו מחלים בתוך 10-14 יום. הדבר נכון גם לגבי פצע בעל שוליים אדומים מאוד, במידה והפצע מתנפח או מאוד כואב וכן במידה והפצע מלווה בחום (קיים סיכון לתגובה מערכתית לזיהום חיידקי חמור- ספסיס).
- אין להשתמש בתכשיר לטיפול בגירויים אשר הסיכון שיזדהמו נמוך (לדוגמא: כוויות שמש). במקרה כזה, מומלץ לעשות שימוש בתכשיר שאינו מכיל חומר מחטא.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תרופות למריחה על גבי העור ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אין להשתמש באזור המטופל בבפנטן® פלוס, בו זמנית גם בסבונים, דטרגנטים וחומרים מחטאים אחרים.

הריון והנקה:

הנתונים הקיימים בחיות לא הראו שהשימוש בתכשיר מסב נזק לעובר, אך אין מחקרים מבוקרים בנשים הרות ועל כן אם הנך בהריון היועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן® פלוס. ניתן להשתמש בבפנטן פלוס במשך תקופת ההנקה. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.

נהיגה ושימוש במכוניות

לא ידועה השפעה שלילית על יכולת הנהיגה או שימוש במכוניות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

תרופה זו מכילה צטייל אלכוהול, סטאריל אלכוהול ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור ממגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אופן השימוש ומינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: מרח שכבה דקה על האזור הנגוע עד 4 פעמים ביום. ניתן לחבוש את הפצע או להשאירו חשוף.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 - 10 ימים.

אם אתה מרגיש שפעולת התכשיר חזקה או חלשה מדי, יש להיוועץ ברופא או רוקח.

צורת הנטילה:

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. במידה ובלעת בטעות כמות גדולה של התכשיר, יש להיוועץ ברופא. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד (אמינוטרנזפראז). אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבפנטן® פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:

- במקרים נדירים עלולות להופיע תגובות אלרגיות כגון דלקת עור הקשורה למגע עם חומר, דלקת עור אלרגית, גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת (אורטיקריה), גירוי העור, תחושת בעירה או שלפוחיות.
- תגובת רגישות יתר, תגובה אנפילקטית, שוק אנפילקטי נצפו הכוללים ביטויים קליניים כגון אסתמה, תגובות של העור, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, או ליקוי במערכת הנשימה, הלב וכלי הדם.
- עלייה באנזימי כבד עלולה להופיע לאחר נטילת מינון יתר. ראה גם סעיף 3-"אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר".

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרורם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי איחסון:** אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- ניתן להשתמש בבפנטן® פלוס עד 12 חודשים מיום פתיחת האריזה. מומלץ לרשום את תאריך הפתיחה על האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על חומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Liquid paraffin, white soft paraffin, cetyl alcohol, wool fat (lanoline), macrogol stearate, stearyl alcohol, DL-pantolactone, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קרם בצבע שמנת.

גדלי אריזה מאושרים: 3.5, 30, 100 גרם. יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

בעל הרישום וכתובתו: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.

היצרן: GP גרנז' פרודקשנס, רח' אמיל ברל 7, D-79639 גרנז' ויילן, גרמניה.

נערך ינואר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 127 48 26501 01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.