

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר

בטאהיסטין טבע 16 מ"ג, טבליות**Betahistine Teva 16 mg Tablets****Contains: Betahistine Dihydrochloride 16 mg**

עדכונים בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Meniere's syndrome.

Symptomatic treatment of peripheral vertigo.

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום):

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בבטאהיסטין טבע 16 מ"ג היוועץ ברופא אם:

- אתה סובל מאסטמה
- אתה סובל מכיב קיבה (אולקוס)
- את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון
- את מניקה

אם אחד מהמצבים המתוארים מעלה חל עליך, הרופא ייעץ לך אם בטוח עבורך להתחיל ליטול בטאהיסטין טבע.

[...]

שימוש בתרופה ומזוןיש ליטול את התרופה עם או **ללא אחרי** ארוחה.**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. הרופא יתאים את המינון בהתאם למצבך הרפואי. יתכן שהשפעת בטאהיסטין טבע לא תהיה מיידיית. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים הוא: טבליה אחת (16 מ"ג) שלוש פעמים ביום. במידת הצורך, ניתן להתחיל עם מינון של 8 מ"ג (חצי טבליה) שלוש פעמים ביום.



המינון היומי נע בין 24 ל- 48 מ"ג ומומלץ לחלק אותו לשלוש מנות באופן שווה על פני היממה בכדי לוודא שרמת התרופה בגופך קבועה. נסה ליטול את הטבליה באותו הזמן בכל יום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

יש לבלוע את התרופה עם מים. רצוי ליטול את התרופה עם אוכל.
ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה. אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.

[...]

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

<http://www.health.gov.il>, וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.