

ו' באדר ב', התשפ"ב
09/03/2022
אסמכתא: 122351156022
(במענה נא ציינו אסמכתא)

לכבוד
מנהלי בתי חולים
מנהלים רפואיים בקופות החולים

שלום רב,

הנדון: אוזמפיק

סמגלוטייד (אוזמפיק) רשום לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 לא מאוזנת בשילוב עם דיאטה ופעילות גופנית, וכן כטיפול בודד או בשילוב עם תכשירים נוספים לאיזון סוכרת כאשר מטפורמין אינו מתאים לטיפול על רקע אי סבילות או הוריות נגד. הטיפול אינו כלול בסל, אך ניתן על ידי קופות החולים במסגרת הרחבת סל הקופה או במסגרת השב"ן.

לאחר אישור סמגלוטייד 2.4 מ"ג לטיפול בהשמנה בארה"ב, עלתה מאד צריכת האוזמפיק בשל רישום הטיפול למטופלים החיים עם השמנה כטיפול OFF LABEL. בשל היקפי הצריכה הגדולים בכל העולם צפוי מחסור בתכשיר במהלך החודשים הקרובים. להלן הנחיותינו בנושא:

- יש לקיים רצף טיפולי בחולים, שכבר החלו טיפול בתכשיר.
- לגבי התחלת טיפול בחולי סוכרת חדשים: ניתן להתחיל טיפול בהתאם להתוויה הרשומה.
- לגבי התחלת טיפול בהשמנה: ניתן להתחיל טיפול בהשמנה במטופלים עם BMI מעל 30, שלא הצליחו לרדת במשקלם לאחר 3 מפגשים עם תזונאית ולאחר כישלון הטיפול בסקסנדה (כמובן, בהעדר התווית נגד לטיפול).



"כישלון הטיפול בסקסנדה" - מטופל שלא הצליח לרדת 5% ממשקלו במהלך 12 שבועות תחת טיפול במינון התכשיר המירבי.
4. בכל מקרה יש להתחיל טיפול במינון היעיל הנמוך ביותר ולעלות במינון בהדרגה על פי החלטת רופא ועד למינון מרבי של 1 מ"ג בשבוע.


רברכה,

ד"ר הגר מזרחי
ראש חטיבת הרפואה