

קהל היעד: ילדים שמתאשפזים באופן דחוף במחלקה כירורגית במחלקה כירורגית ועוברים סיטי בטן.

הממצאים: מתוך 182 ילדים שהתאשפזו במחלקה שלנו באופן דחוף בגלל כאבי בטן במשך 3 שנים (2018-2020) אצל 33 ילדים עלה חשד בסיטי להמצאות מחלה דלקתית כרונית של המעיין. בילדים אלו בוצעו מעקב ובירורים נוספים, שבסופם רק בחמישה ילדים נקבעה אבחנה של מחלה דלקתית כרונית של המעי.

הפרמטרים שנמצאו מוגברים באופן משמעותי מאוד כבר בזמן האשפוז הראשוני בילדים שאכן נמצאו כחולים במחלה כרונית לעומת יתר הילדים הם: עיכוב בגדילה, אנמיה, וניקוד גבוה בשיטת פענוח מיוחדת של הסיטי) שנקראת (EMBRK criteria שלקוחה מפענוח של בדיקת סיטי מיוחדת שמיועדת לילדים עם מחלקת מעי דלקתית כרונית (זו שיטה שאיננה בשימוש שגרתי בפענוח של בדיקת סיטי רגילה שמתבצעת בגלל כאבי בטן).

הממצאים מסייעים לנו להחליט אצל מי מבין הילדים שמתאשפזים באופן דחוף בגלל כאבי בטן יש באמת סיכון גבוה שקיימת מחלה כרונית של המעי. אם גם הפענוח הראשוני של הסיטי מחשיד לכך, אז אנחנו ממליצים על פענוח של הסיטי בשיטה ייחודית, וכאשר הניקוד לפי שיטה זו גבוה ו/או הילדים סובלים מאנמיה ו/או פיגור בגדילה מומלץ לבצע בירור מלא, כולל בדיקות פולשניות, לשלילת מחלת מעי כרונית. אם פרמטרים אלו לא קיימים, ניתן להסתפק במעקב בלבד."