



ז' באלול, התשפ"ג
24/08/2023
סימוכין : 475141823

שלום רב,

הוספת מולקולות לתוספת השניה של תקנות הרוקחים (מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית), תשע"ד-2014

בהמשך להודעת משרד הבריאות בדבר סעיף 4, תת סעיף 5 במסמך " צוות רגולציה מאפשרת – מתווה הרפורמה הרגולטורית בתחום הרוקחות" מיום 22.6.2023, להלן רשימת מולקולות אשר תתווספנה לתוספת השניה של תקנות הרוקחים (מתן מרשם בידי רוקח בעל הרשאה אישית), תשע"ד-2014 .

התוספת השניה לתקנות מפרטת את "תרופות רוקח" אשר בסמכות רוקח בעל הרשאה אישית למתן מרשם רוקח לרשום למטופלים. מתן המרשם יעשה בכפוף להוראות החוק ולהתוויות הרשומות בפנקס התכשירים.

אין ספק שהרחבת האפשרות למתן מענה למטופלים הנוקקים לטיפול תרופתי גם מעבר לשעות פעילות מרפאות קופות החולים והנגשת שירות זה, צפוי להקל על המטופלים ולייעל את תהליך קבלת המרשם על ידי כך שיאפשר למטופלים, במצבים שיוגדרו, לגשת ישירות לרוקח מבלי לפנות או להגיע למרפאת הרופא.

חשוב לציין כי פעילות של מתן או חידוש מרשמים על ידי רוקח הנה פרקטיקה מקובלת בארגוני בריאות בעולם.

תודה לאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית אשר עמל יחד עם אגף הרוקחות, בדק ואישר את התוספת הרצ"ב.

בברכה,

מגר' אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות



הערות	מטרת השימוש ומגבלות	חומר פעיל, ריכוזו ושילובו עם חומר פעיל נוסף
	לטיפול באקנה, לשימוש חיצוני על העור	Adapalene בריכוז עד 0.3% כחומר פעיל בודד; יתכן בשילוב עם Benzoyl Peroxide בריכוז עד 10%
	לטיפול מקומי בדלקות אוזניים.	Benzocaine בריכוז עד 3%, בשילוב עם Neomycin בריכוז עד 0.35%, Phenylephrine בריכוז עד 0.25%, Sodium Propionate בריכוז עד 5%
הוספה של Adapalene לשילובים הקיימים בפריט 2 בתקנות	לטיפול באקנה, לשימוש חיצוני על העור	Benzoyl Peroxide בריכוז עד 10% כחומר פעיל בודד; ייתכן בשילוב עם Erythromycin בריכוז עד 4% או בשילוב עם Clindamycin בריכוז עד 1% או עם Adapalene בריכוז עד 0.3%
	לטיפול מקומי בסבוריאה ופטרות לשימוש חיצוני על העור	Bifonazole בריכוז עד 1% כחומר פעיל בודד
	לטיפול בתסמיני אלרגיה מעל גיל 12.	Bilastine בחוזק עד 20 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול בפטרות על העור, במפשעות וכף הרגל, לשימוש חיצוני על העור	Butenafine בריכוז עד 1% כחומר פעיל בודד
	לטיפול חיצוני על העור בפסוזיאריס וולגריס, במטופלים שאובחנו בפסוריאזיס וולגריס.	Calcipotriol anhydrous בריכוז עד 50 מיקרוגרם\גרם בשילוב עם betamethsone בריכוז עד 0.5 מ"ג\גרם
	לטיפול בפטרות על העור, לשימוש חיצוני על העור	Ciclopirox Olamine בריכוז עד 1% כחומר פעיל בודד
	לטיפול בדלקות עור משולבות עם פטרות, לשימוש חיצוני על העור	Ciclopirox Olamine בריכוז עד 1% בשילוב עם Gentamicin בריכוז עד 0.1% ו-Clobetasone Butyrate בריכוז עד 0.05%
	לטיפול בדלקות עור משולבות עם פטרות, לשימוש חיצוני על העור	Clotrimazole בריכוז עד 1% בשילוב עם Neomycin בריכוז עד 0.645% ו-Dexamethasone בריכוז עד 0.04%



הערות	מטרת השימוש ומגבלות	חומר פעיל, ריכוזו ושילובו עם חומר פעיל נוסף
	לטיפול בסימפטומים אלרגיים עבור מטופלים מעל גיל שנה.	Desloratidin כחומר פעיל בודד
	גולולות למניעת הריון	Desogestrel בחוזק 0.075 MG כחומר פעיל בודד
	לטיפול נוגד גרד, אנטי-היסטמיני ואנטי אלרגי למטופלים מגיל שנה	Dimethindene בריכוז 1 מ"ג/מ"ל כחומר פעיל בודד
	לטיפול בבחילות בנשים בהריון שאינן מגיבות לטיפול שמרני.	Doxylamine בחוזק עד 20 מ"ג בשילוב עם pyridoxine בחוזק עד 20 מ"ג
	לטיפול במיגרנה במטופלים שאובחנו בעבר כסובלים ממיגרנה	Eletriptan בחוזק עד 40 מ"ג לטבלייה כחומר בודד
	לטיפול חירום בתגובות אלרגיות חמורות לרבות אנפילקסיס	Epinephrine בריכוז עד 1.3 מ"ג \ 0.3 מ"ל כחומר פעיל בודד
	לטיפול מכיח במחלות נשימתיות אקוטיות וכרוניות	Erdosteine בחוזק עד 300 מ"ג לחומר פעיל בודד
	לשימוש וגינלי, לטיפול בהפרעות נרתיקיות הנובעות בחוסר באסטרוגן.	Estriol בריכוז 0.1% כחומר פעיל בודד
	לטיפול בכאב בינוני קצר טווח בדלקות מפרקים ושרירים ולאחר ניתוח דנטלי לתקופה של עד 10 ימים.	Etoricoxib בחוזק עד 90 מ"ג לטבלייה כחומר פעיל בודד
	לטיפול בתסמינים של דלקת אף אלרגית במטופלים	Fluticasone furoate בריכוז עד 27.5 מיקרוגרם \ מנה לחומר פעיל בודד
	לטיפול בדלקות עור, לשימוש חיצוני על העור.	Fusidic acid בריכוז עד 20 מ"ג/גרם כמרכיב בודד; יתכן בשילוב עם Hydrocortisone Acetate בריכוז עד 10 מ"ג/גרם
	להקלה ומניעת התקפים של תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס) במטופלים שאובחנו כסובלים מתעוקת חזה	Glyceryl trinitrate בחוזק עד 0.4 מ"ג כחומר פעיל בודד



הערות	מטרת השימוש ומגבלות	חומר פעיל, ריכוזו ושילובו עם חומר פעיל נוסף
	לטיפול בשיעול כחומר מכייה.	Guaiacolsulfonate בריכוז עד 33.3 מ"ג/5 מ"ל בשילוב עם Oxomemazine בריכוז עד 1.65 מ"ג/5 מ"ל ועם Benzoic acid בריכוז עד 33.3 מ"ג/5 מ"ל
	לטיפול בדלקות עור, לשימוש חיצוני על העור.	Hydrocortisone בריכוז עד 2.5% בשילוב עם Neomycin as sulfate בריכוז עד 0.5%
קיים כפריט 12 בתקנות הקיימות אך מוגבל רק לשמפו. אנחנו מרחיבים ומוספים קרם.	לטיפול בפטרות ובסבוריאה, לשימוש חיצוני	Ketoconazole בריכוז עד 20 מ"ג/גרם כחומר פעיל בודד
	לטיפול להפחתת הפרשת חומציות בקיבה	Lansoprazole בחוזק עד 15 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול בחרדה במבוגרים מעל גיל 18	lavender oil בחוזק עד 80 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול בטווח קצר בנדודי שינה, קושי להירדם או לישון ברציפות או איכות שינה ירודה בחולים בני 55 ומעלה.	Melatonin עד 2 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול בזיהומי עור, לשימוש חיצוני על העור.	Mupirocin בריכוז עד 2% כחומר פעיל בודד
	תרסיס לאף, לטיפול חירום לאחר מנת יתר של הרואין/סמים אופיאידים אחרים, מעל גיל 14.	Naloxone בחוזק עד 1.8 מ"ג למנה כחומר פעיל בודד
	לטיפול בזיהום פטרייתי בחלל הפה.	Nystatin בחוזק עד 100000 יחב"ל/מ"ל כחומר בודד בלבד
	לטיפול מקומי בדלקת עיניים	Ofloxacin בריכוז עד 0.3% כחומר פעיל בודד
	לטיפול בדלקת אלרגית של הלחמית.	Olopatadine בריכוז עד 1 מ"ג \ מ"ל כחומר פעיל בודד
	לאחת המטרות שלהלן: 1. טיפול שניוני מניעתי לאחר אוטם שריר הלב בנוסף לטיפול התרופתי. 2. לטיפול במצב של רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם, כתוספת לדיאטה שאינה מספקת לבדה.	OMEGA-3 כחוזק 1000 מ"ג כחומר פעיל בודד



הערות	מטרת השימוש ומגבלות	חומר פעיל, ריכוזו ושילובו עם חומר פעיל נוסף
	לטיפול בכאב שרירים	Paracetamol בריכוז עד 500 מ"ג בשילוב עם Orphenadrine בחוזק עד 30 מ"ג
	לטיפול מקומי בזיהומים דלקתיים של האוזן החיצונית	Polymyxin B בחוזק של עד 10000 יחב"ל בשילוב עם Dexamethasone בחוזק עד 1 מ"ג ועם Neomycin בחוזק עד 5 מ"ג
	לטיפול בדלקות עור, לשימוש חיצוני.	Prednisolone בריכוז עד 0.5% בשילוב עם Gentamicin בריכוז עד 0.16%
	להקלה על עיוות הסימפונות עבור אנשים המאובחנים באסטמה וצורות אחרות של בرونכוספאזם ובתנאי שמטופלים במשאפים סטרואידיים	Salbutamol בריכוז עד 5 מ"ג \ מ"ל כחומר פעיל בודד
	לטיפול ביבלות, לשימוש חיצוני על העור	Salicylic acid בריכוז עד 10 גרם \ 100 גרם בשילוב עם Fluorouracil 0.5 גרם \ 100 גרם
	לטיפול באין אונות - הפרעות בזקפה.	Sildenafil בחוזק עד 50 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול חיצוני בכוויות וזיהומי עור חיידיקיים.	Sulfadiazine Silver בריכוז עד 1% כחומר פעיל בודד
	לטיפול באין אונות - הפרעות בזקפה לפני מגע מיני ולא כטיפול של נטילה יומית.	Tadalafil בחוזק של עד 10 מ"ג כחומר פעיל בודד
	לטיפול מקומי בדלקת עיניים	Tobramycin בריכוז עד 0.3% כחומר פעיל בודד
	לטיפול בדלקות עור, לשימוש חיצוני.	Triamcinolone acetonide בריכוז עד 1 מ"ג \ גרם בשילוב עם Gramicidin בריכוז 0.25 מ"ג \ גרם, Neomycin בריכוז עד 2.5 מ"ג \ גרם ו-Nystatin בריכוז 100000 יחב"ל \ גרם
	חיסון למניעת מחלות הנגרמות ע"י נגיף הפפילומה האנושי	חלבונים פעילים מטוהרים מאוד של HPV מסוגים (6, 11, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
	חיסון הניתן בהתזה לאף לסייע בהגנה מפני שפעת לגילאי 2-49 שנים בלבד.	חיסון מוחלש לשפעת עונתית