

הועד:

יו"ר

א. אליצור

מזכיר

י. טל

גזבר

ר. מעוז סגל

חבר

ע. לחובר רוט

יו"ר יוצא

א. הרשקו

30/4/2024

המלצות האגוד לאלרגיה ואימונולוגיה למזעור וניהול הסיכון לתגובות רגישות יתר במתן פרינג'קט

1. מומלץ לתת פרינג'קט במשך לפחות שעה, בעיקר באנשים מבוגרים עם מחלות רקע קשות (כגון קרדיווסקולריות, אי ספיקת כליות, וכו')
2. לאור תגובות שאירעו עד שעה ממתן התרופה, מומלץ להישאר בהשגחה רפואית במשך שעה לפחות ממתן פרינג'קט
3. מומלץ לחדד את דרכי הטיפול בתגובה אנפילקטית כולל השימוש באדרנלין תוך שריירי כטיפול הבחירה.
4. מומלץ שכל תגובה החשודה כתגובה אלרגית תופנה ליעוץ אלרגולוג באותו מחוז / אזור

על החתום - הצוות המייעץ לטיפול תרופתי של האגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית:

פרופ' רונית קונפינו כהן

פרופ' אלון הרשקו

פרופ' אהרון קסל

פרופ' ננסי אגמון-לויין

פרופ' יובל טל

פרופ' ארנון אליצור

Executive

Committee

Chairman

A. Elizur

Secretary

Y. Tal

Treasurer

R. Maoz Segal

Member

I. Lachover

Roth

Past Chairman

A. Hershko