

חברת טבע מודיעה על העדכונים הבאים בעלוני לרופא ולצרכן של התכשיר:

הקסאקפרון® טבליות

HEXAKAPRON® TABLETS

Contains: Tranexamic Acid 500 mg

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Treatment of hemorrhage occurring in some forms of surgery, including prostatectomy.

Hematuria.

Menorrhagia.

Hereditary angioneurotic edema.

ברצוננו להודיע שהעלוני עודכנו, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום):

עדכונים בעלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

נהיגה ושימוש במכונות

לתרופה השפעה מועטה או אין השפעה על היכולת לנהוג. יחד עם זה הפרעה בראיה יכולה להופיע לאחר נטילת חומצה טראנקסאמית (החומר הפעיל בתרופה).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך. נטילת מינון יתר של חומצה טראנקסאמית עלולה לגרום **לשלשול**, בחילה, הקאה, סחרחורת או סחרור בעת קימה לעמידה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהקסאקפרון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק ליטול את התרופה ופנה מייד לחדר מיון אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:
תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 1,000):

קריש דם ברגל או בריאות, התסמינים האפשריים הם:

- כאב, נפיחות או אודם ברגל
- קושי לנשום או קוצר נשימה
- כאב בחזה, שעלול להחמיר בזמן הנשימה

