

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת פאדאגיס מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלונים לרופא ולצרכן של התכשיר:

**Setron 1 mg film coated tablet**

**סטרון טבליות מצופות פילם**

החומר הפעיל בתכשיר וחוזקו:

1 mg granisetron (as hydrochloride)

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Prevention of nausea and vomiting induced by cytostatic therapy.

מהות העדכון:

עדכוני בטיחות ועדכונים נוסח בהתאם לעלון האסמכתא, תנאי הרישום ובהתאמה להנחיות משרד הבריאות.

ברצוננו לציין כי חלו החמרות בעלון לצרכן:

[...]

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

התרופה מכילה לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, **כגון ללקטוז**, פנה לרופא לפני תחילת השימוש בתרופה. כל טבליה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן, ולכן התרופה נחשבת כנטולת נתרן.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המומלץ משתנה ממוטופל למטופל. המינון תלוי בגיל המטופל ובמשקלו. נוסלים טבליה אחת פעמיים ביום או 2 טבליות פעם ביום, למשך עד שבוע לאחר טיפול כימותרפיה או רדיותרפיה, כאשר את המנה הראשונה לוקחים כשעה לפני הטיפול. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

**צורת הנטילה**

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם מים. כתישה/חצייה/לעיסה: אין ללעוס/לכתוש/לחצות את הטבליה מכיוון שהיא מצופה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

**אם נטלת מנת יתר** או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר- מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר המיון של בית חולים **הקרב- והבא אריזת התרופה איתך- קח את האריזה ואת שאריות הטבליות איתך**. התסמינים למנת יתר כוללים כאבי ראש **קלים מתונים**. אתה תסופל בהתאם לתסמינים שלך.

[...]

העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug>

בברכה,

פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ