

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקמים (תכשירים)**

**התשנ"ו -1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## טריטיקו 50 מ"ג טריטיקו 100 מ"ג

## טבליות מצופות

**החומר הפעיל:**

**כל טבליה מצופה של טריטיקו 50 מ"ג מכילה:**
Trazodone hydrochloride 50 mg
Trazodone 45.5 mg

**כל טבליה מצופה של טריטיקו 100 מ"ג מכילה:**
Trazodone hydrochloride 100 mg
Trazodone 91.1 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים בתרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם.

תרופה זו נחשמה לטיפול עבורך. אתה עובר אותה לאחרים. לא תעלה להזיק להם אפילו אם תביא לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול במצבי דיכאון, עם או ללא חרדה.

### קצובה תרפוטית: נגודי דיכאון.

### 2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

<div> <ul style="list-style-type: none"><li>אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל Trazodone hydrochloride או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (ראה סעיף 6, "מידע נוסף").</li> <li>אתה צורך כמות גדולות של אלכוהול.</li> <li>אתה צורך כמות גדולות של תרופות שינה (hypnotics).</li> <li>אתה עובר לטיפול בתרופה זו, במקרה זה, הרופא שלך יאמנע מעליה או יירידה פתאומית במינון.</li> <li>יש לך <b>תפקוד כבד לקוי</b>, במיוחד אם הוא חמור (אי ספיקת כבד).</li> <li>יש לך <b>תפקוד כליות לקוי</b>, במיוחד אם הוא חמור (אי ספיקת כליות).</li> <li>יש לך <b>הפרעות לב או בכלי הדם</b>, כגון כאבים בחזה (אנגינה פקטוריס), הפרעות במערכת הולכה החשמלית של הלב או שעברת לאחרונה התקף לב.</li> <li>ראה גם סעיף 'אין להשתמש בתרופה אם':</li> <li>יש לך <b>היפרטרואידזם</b> (פעילות יתר של בלוטת התרס).</li> <li>יש לך <b>קושי במתן שתן</b>, כמו במקרה של היפרטרופיה של הערמונית (ערמונית מוגדלת).</li> <li>יש לך <b>גלוקוזמה</b> צרת זויות חריפה (לחץ מוגבר בעין).</li> <li>אתה <b>סובל מכיזופוריה או כל הפרעה נפשית אחרת</b>, כיוון ששימוש בטריטיקו עלול להמריא את ההפרעות הללו, למשל הגברת מחשבות פרנוציאיות (האמין שמשוה הוא אמיתי או נכון כאשר הוא לא). ראה סעיף 4 - "תופעות גורו אפשריות".</li> <li>יש לך <b>כאב גרון וחום</b>. במקרה זה, הרופא שלך עשוי ליישך לך לבצע בדיקת דם מכיוון שאלו יכולים להיות תסמינים של הפרעת דם (אגרנוטרוציטוס).</li> <li>היך <b>ישנן של א לבטוב או בעלפון</b> (במיוחד כשאתה קם מהמיטה או נעמד ממצב ישיבה), מכיוון שזה יכול להיות סימן ללחץ דם נמוך.</li> <li>אתה <b>זכר ויש לך זקפה ממושכת וכואבת</b>. אם זה קורה, הפסק את הטיפול מיד.</li></ul> </div>
---

**מטופלים מעל גיל 65 שנים**

השתמש בתרופה זו בזהירות, מכיוון שאתה עשוי להיות בעל כטיב גבוה יותר לחוות תופעות לוואי, למשל ירידה בלחץ הדם כשאתה נעמד (תת לחץ דם אורטוסטטי) או ישנוניות.

ספר לרופא שלך אם אתה או המטפל שלך מבחינים באחת מתופעות הלוואי הללו. הם יבצעו מעקב מקורב אחרוך, במיוחד אצל החולי הטיפול ולפני נבמהלך העלויות מינון.

ספר לרופא שלך אם יש לך מחלות כלשהן או אם הך נטל תרופות אחרות (ראה סעיף 'אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות'). הרופא ייקוט את אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע עלייה בתופעות הלוואי.

### הפרעה בלתי שוות

אם במהלך הטיפול בטריטיקו אתה עובר בבדיקת שתן לאיתור סמים המשמשתם בטכניקות מיוחדות (immunoassays), אתה עלול לקבל תוצאה חיובית שהיא עבור חיזוי אפסטימיים. אם זה קורה, שוחח עם הרופא שלך ובקש בדיקה המבוססת על טכניקות אחרות.

### ילדים ומתבגרים

טריטיקו אינה מיועדת לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

### אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקם.** במיוחד אם אתה לוקח:

**תרופות שעלולות להגביר את תופעות הלוואי האפשריות של טריטיקו**

- תרופות שמשנות את אופן פעולת הכבד**, כגון: אריתרומיצין (אנטיביוטיקה), סקוטוקוול, איטראקונוול (תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים פטריותיים), ביזונאביר, אידינאביר (תרופות המשמשות לטיפול בזיהום HIV).
- נפאזודין** (תרופה המשמשת לטיפול בצורות נשנות של דיכאון).
- הימנע מנטילת טריטיקו עם תרופות אלו. במידת הצורך, הרופא שלך יפחית את המינון של טריטיקו.
- תרופות נגודות דיכאון טריציקליות** (תרופות המשמשות לטיפול בדיכאון). הימנע מנטילת תרופות אלו ביחד עם טרזודון.
- פלואקסטין** (תרופה המשמשת לטיפול בחרדה ודיכאון).
- תרופות נירולפטיות** (תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות כגון סכיזופרניה).
- פנטיתאזים** (תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות כגון כיזופרניה), כגון **בלורפרומאזין**, **פלופמזין**, **בלומפרומאזין**, **פרפנזין**.
- תחפות העלולות להאריך את מחוה ה QT** (תרופות הגורמות שינויים באלקטרוקארדיוגרמה).
- שקשירים המכילים פרע מחורר (Hypericum perforatum)** (סנט ג'ון וורט, צמח המשמש כנגוד דיכאון).

**תרופות המפחיתות את ההשפעה של טריטיקו**

**אמצעי מניעה בחתום פומי** (גלולות למניעת הריון), **פנטילאן** (תרופה המשמשת לטיפול באכילספיה), **קרבמאזין** (תרופה המשמשת לטיפול באכילספיה). הרופא שלך יבצע מעקב אחרוך כדי לקבוע אם יש העלוות או המינון של טריטיקו.

**ברביבוטנס** (תרופות המשמשות כתרופות סדציה (הרגעה), דרדמה, תרופות אנטי-אפילפטיות, היפנוטיות (תרופות שינה).

### תרופות המגבירות את ההשפעה של טריטיקו

- סימטין** (תרופה המשמשת לטיפול בכיב קיבה).

**תרופות אחרות היצרות אינטראקציה עם טריטיקו**

**תרופות אנטי-פטריות** (תרופות המשמשות לטיפול במחלות נפש מסוימות), **תרופות הפינטיות** (תרופות לשינה), **תרופות סדטיביות** (תרופות הרגעה), **תרופות**

**אנקיסיליות** (תרופות לטיפול בחרדה) **ואנטי-היסטמינים** (תרופות המשמשות לטיפול בחלדיות), שכן השפעתן הסדטיבית עשויה להיות מוגברת (ירידה בערנות). במקרה זה, הרופא שלך עשוי להפחית את המינון של תרופות אלו.

- MAOI's** **מעכבי מנואמינ** **אוקסידאז** (תרופות המשמשות לטיפול בחרדה ודיכאון). אין ליטול טריטיקו ביחד עם MAOI's או כשבוועים שלאחר הפסקת הטיפול עם MAOI's, כמו כן, אין להשתמש ב MAOI's בשבוע שלאחר הפסקת הטיפול בטרזודון.

**חומר הרדמה**. אם אתה עובר לעבור ניתוח המצריך שימוש בחומרי הרדמה בשאיפה, ספר לרופא המרדים שאתה נוטל טריטיקו.

טריטיקו עשוי להגביר את השפעת חומר ההרדמה. **מרפי שרירים** (תרופות הגורמות להרדית שרירים). אם אתה צריך לעבור ניתוח הדורש שימוש בתרופות מרפות שרירים, ספר לרופא המרדים שאתה נוטל טריטיקו.

טריטיקו עשוי להגביר את ההשפעה של תרופות אלו, **לבדופפה** (תרופה המשמשת לטיפול במחלת פרקינסון), מכיוון שההשפעה של לבדופפה עלולה לרדת.

**קלנדינב** (תרופה המשמשת להורדת לחץ דם גבוה) שכן טרזודון יכול להפחית את ההשפעה של קלנדינב.

**תרופות נגודות קרשה** **ואו נגודות טסטוס** (משמשות לדילול הדם): ייתכן שישו בקרשיות הדם עם סיכון לדימום.

**תרופות אנטי-היפרטנסיביות** (תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה), מכיוון שהרופא עשוי להפחית את מינון התרופה להורדת לחץ הדם במידת הצורך.

- דיגוקסין** (תרופה המשמשת לטיפול בבעיות לב).

### שימוש בתרופה ומזון

במידה ומתאפשר, יש ליטול את הטבליות על קיבה מלאה.

נטילת טריטיקו לאחר ארוחות עלולה להפחית את הסיכוי לתופעות לוואי.

### שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

אל תיקח טריטיקו אם אתה צורך כמות גדולות של אלכוהול (ראה סעיף 2 'אין להשתמש בתרופה אם'). טריטיקו מגביר את ההשפעות הסדטיביות (ירידה בערנות) של אלכוהול. לכן עליך להימנע משתיית אלכוהול במהלך הטיפול בטריטיקו.

### הימנעו הנקה ופוריות

רופאים אודות נטילת טריטיקו במהלך היריון מוגבל. אם הךג בהריון או מניקה, חשבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת הריון, היוועץ עם הרופא או הרוקם שלך בטרם נטילת התרופה.

יש ליטול טריטיקו במהלך היריון או הנקה רק במקרה של צורך אמיתי ותחת השגחה צמודה של הרופא המטפל. במידה והרופא מחליט על נטילת התרופה עד הלידה יש לעקוב אחר הילוד כדי לנטר תסמיני גמילה.

### נהיגה ושימוש במכוונת

לטריטיקו יש השפעה קלה או מתונה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכוונת. לכן, היזהר במיוחד אם אתה צריך לנהוג או להשתמש במכוונת. אל תנהג או תשתמש במכוונת אם אתה חוה תופעות לוואי כלשהן כגון ישנוניות, סדציה (ירידה בערנות), סחרחורת, בלבול או טשטוש ראיה.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

**טריטיקו 50 מ"ג טבליות מצופות וטריטיקו 100 מ"ג טבליות מצופות מכילות:**

**לקטוז** - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ עם הרופא בטרם נטילת תרופה זו.

**שמן זיק (Castor oil)** - עלול לגרום ללקקול קיבה ושולשלים. **מלחן** - תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליומל נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר היא 'מלמשה' מלוחלת נתרן".

**טריטיקו 50 מ"ג טבליה מצופה מכילה גם Sunset yellow (E110):**

**Sunset yellow (E110):** עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקם אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. הימנע ואופן הטיפול ולקטעו על ידי הרופא בלבד.

### מבוגרים

המינון ההתחלתי נע בין 75 מ"ג (טבליה וחצי של טריטיקו 50 מ"ג) לבין 150 מ"ג (3 טבליות של טריטיקו 50 מ"ג או טבליה וחצי של טריטיקו 100 מ"ג) ליום, לנטילה במנות מחולקות.

במהלך הטיפול, הרופא שלך עשוי להעלות את המינון עד ל- 300 מ"ג (6 טבליות של טריטיקו 50 מ"ג או 3 טבליות של טריטיקו 100 מ"ג) ליום, לנטילה במנות מחולקות. במסלופי מאופזד, ניתן להעלות את המינון לעד 600 מ"ג ביום.

### מטופלים מעל גיל 65 שנים

הרופא שלך יתאים את המינון בהתאם למצבך הבריאותי הכולל ולסבילותך לתרופה. באופן כללי, המינון ההתחלתי המומלץ הוא של 100 מ"ג ליום, במנות מחולקות או בזמנה בודדת. לנטילה בלילה. יש להימנע מנות של יותר מ-100 מ"ג בפעם בודדת במטופלים אלה. סבור להניח שלא יהיה צורך במינונים של מעל ל-300 מ"ג ביום.

### אופן הנטילה

במידה ומתאפשר, יש ליטול את הטבליות על קיבה מלאה. נטילת טריטיקו לאחר ארוחות מפחיתה את הופעות תופעות הלוואי. את מנת הלילה יש ליטול לפני השינה.

ניתן לחצות את הטבליה לשני חצאים שווים. זה מאפשר לחלק מנות במהלך היום על פי הוראות הרופא שלך. אין ללעוס או לכמה את הטבליות – משום היותן מצופות.

### אין לעסוב על הלשמה המומלצת.

### משך הטיפול

יש ליטול תכשיר זה למשך הזמן המומלץ על ידי הרופא שלך.

### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

במקרה של נטילה בטעות או נטילת יתר של טריטיקו, יש ליצור קשר מיידי עם הרופא או לנשט לבית החולים הקרוב. יש לקחת עימך עלון זה.

אם נטלת מנת יתר של תרופה זו, **בתופעות הבאות** עלולות להופיע:

- ישנוניות
- סחרחורת
- בחילה
- הקאה

במקרים החמורים יותר, התופעות הבאות עלולות להופיע:

- תת לחץ דם (לחץ דם נמוך)
- היפותרמיה (ירידה ברמות הנתרן בדם הגורמת לתחושת חולי כללית)
- פרכוסים

קושי חמור בנשימה
הפרעות לב הכוללות בבדיקרידה (ירידה בקצב הלב), אריתמיה (הפרעות בקצב הלב).

הרופא יחליט על הטיפול התומך המתאים ביותר, בהתאם לסוג ולחומרת התופעות.

הסימפטומים עלולים להופיע תוך 24 שעות או יותר לאחר מנת היתר.

### אם שכחת ליטול את התרופה

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא שלך.

### אם אתה מפסיק ליטול את התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה פתאומיות, במיוחד בטיפול ממושך. יש להפסיק את הטיפול בתרופה זו בהדרגה ובפיקוח רפואי, כדי למנוע תופעת תסמיני גמילה כגון בחילה, כאבי ראש ותחושת חולשה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אין ליטול תרופות בחוץ/ן בודק את הויות והמנה בכל פעם שהךג נטל תרופה. הרכיב **ספסינים** אם הךג **זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או בהרקה.****

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטריטיקו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מנת אחת מהן.

אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מתרחשת או אם

המטפל שלך הבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות, **יש להפסיק את הטיפול בתרופה זו ולפנות מיידי לרופא:**

- צהבת (צהצה של העור והואזור הלבן בעיניים).
- החמרה של הדיכאון המאופינת בהתנהגות מאנית (התנהגות ואו מחשבות אובססיביות).

- פריאפזים (זקפה חריגה שאינה נעלמת).

אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מתרחשת או אם המטפל שלך הבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות, יש ליצור **קשר מיידי** עם הרופא:

- מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית או כל שינוי אחר בהתנהגות. תסמינים אלה עלולים להופיע גם במהלך הטיפול וגם סביבם המוקדמים לאחר הפסקת הטיפול. לכן הרופא שלך יבצע מעקב אחר תופעות אלה.

בנוסף, תופעות הלוואי הבאות עשויות להופיע בתדירות שאינה ידועה:

**תופעות לוואי נוספות ששיכותן אינה ידועה (תופעות ששיכותן טרם נקבעה):**

- אגרנולוציטוזיס/ לוקופניה (ירידה בספירת תאי הדם הלבנים)
- אאוטופיליה (עליה בספירת תאי הדם הלבנים)
- טורמוציטופניה (ירידה בספירת טסיות הדם)
- אנמיה (ירידה בהמוגלובין - חומר האמין על נשיאת המתצן בדם)
- תגובות אלרגיות
- תסמונת הפרשה הלא תואמת של הורמון ADH (מחלה המאופינת בירידה ברמות הנתרן בדם)
- ירידה ברמות הנתרן בדם
- ירידה במשקל, איבוד תיאבון עם ירידה חמורה במשקל, ותיאבון מוגבר
- בלבול, אינסומניה (נדודי שינה), חוסר התמצאות, חרדה, עצבנות ואי שקט (אגיטציה) (העלולה לעיתים להחמיר לדליריום (מצב בלבול חריף))
- דליריום (מצב בלבול חריף), אגרסיביות, הזיות (לראות דברים שלא באמת קיימים), סיטוי לילה

ירידה בחשק ימיני

תסמונת גמילה (הופעת תסמיני גמילה עם תסמינים כמו בחילה, גירוד, תחושת חול)

החמרת סחרטונין (מחלה המאופינת בהשפעה מוגברת של החומר סחרטונין, הגורמת למספר תופעות כגון כאב ראש, אי שקט (אגיטציה), בלבול, הזיות ותרדמת).

פרכוסים

תסמונת נירולפטית ממארת (מחלה חמורה של מערכת העצבים)

סחרחורת, ורטיגו, כאב ראש

ישנוניות, אי שקט, ירידה בערנות

רעד

טשטוש ראיה

הפרעות בזיכרון

התכווציות שרירים (מיוקלונוס)

הפרעות דיבור (אפזיה אקספרסיבית)

שינויים בתחושתיות (נימוח)

שינויים בחוש הריח (דיסטוניה)

שינויים בטווח הטעם

אריתמיה לבבית (הפרעות בקצב הלב), בבדיקרידה (ירידת בקצב הלב), בבדיקרידה (עליה בקצב הלב), שינויים באלקטרוקארדיוגרמה.

את לחץ דם (לחץ דם נמוך), כולל תת לחץ דם אורטוסטטי (ירידה חריפה בלחץ הדם מעברר לעמידה) סיקנפזה (עלפון)

יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה)

גודש גרון (אף נטום), דיספניאה (קשיי נשימה)

בחילה, גירוד, חולשת יתר (הפרהידחסי)

כאב חזונית ורגליים, כאב גב, מיאליגיה (כאבי שרירים), ארתרלגיה (כאבי פרקים)

קושי במתן שתן, בריחת שתן (איבוד שתן) או אצירת שתן (חוסר יכולת במתן שתן)

חולשה, בעקת (התנפחות בעקבות אגירת נוזלים), תסמינים דמויי שפעת, תשישות, כאבי חזה, חום

עליה האנמיה הכבד (חומרים המוצאים ככבד, כאשר מספרם עולה, מצביע על קיום חק לכבד).

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי החמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיוח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות 'ליחצה' על הקישור "דיוח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לרישך ידם וטווח ארימתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא תראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**בנצ'אמאסון:** תכשיר זה אינו מצריך תנאי אחסון מיוחדים, אך מומלץ לאחסן בסמפרטורות חדר.

אין לרוקם תרופה זו למי השפכים או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקם שלך כיצד להיפטר מתרופה בה אין לך צורך יותר. הדבר יעזור להגן על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

**טריטיקו 50 מ"ג, טבליות מצופות מכילות:**
Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Sunset yellow (E110) Lake, Castor oil (virgin), E wax, Talc.

**טריטיקו 100 מ"ג, טבליות מצופות מכילות:**
Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Talc, Castor oil (virgin), E wax.

**כיצד נראית התרופה מנה טוה האריזה:**

**טבליות טריטיקו 50 מ"ג**
טבליות טריטיקו 50 מ"ג היא טבליה מצופה בצבע כתום-צהוב בהיר, עגולה, חלקה, מבריקה, קמורה משני צידיה ובעלת קו חצייה (ב

المواصل. يجب إيقاف العلاج بهذا الدواء تدريجيًا وتحت إشراف طبي. من أجل تقليل ظهور أعراض الغطام مثل الغثيان، الأم راس والشعور بالمرض.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام **تحقق من المصنق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء**. ضع نظارتك إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة **إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.**

#### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال تريتيكو أعراضًا جانبيةً لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

إذا حدثت واحدة من الأعراض الجانبية التالية أو إذا لاحظت معالجتك أحد الأعراض الجانبية التالية، **يجب إيقاف العلاج بهذا الدواء والتوجه إلى الطبيب على الفور**:

- يرقان (اصفرار الجلد والمنطقة البيضاء في العينين).
- تفاقم الاكتئاب الذي يتميز بالسُّلوك الهوسي (سلوك و/أو أفكار هوسية).
- القيء (انتصاب شاذ الذي لا يزول).

إذا حدثت واحدة من الأعراض الجانبية التالية أو إذا لاحظت معالجتك أحد الأعراض الجانبية التالية، **يجب التواصل فورًا مع الطبيب**:

- أفكار انتحارية أو سلوك انتحاري أو أي تغيير آخر في السلوك.
- قد تظهر هذه الأعراض أثناء العلاج وكذلك في المراحل المبكرة بعد التوقف عن العلاج. لذلك سيُفرض طبيبك إجراء متابعة لهذه الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر الأعراض الجانبية التالية بوتيرة غير معروفة:

- أعراض جانبية شبيهة بشيوعها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوعها بعد):**

- ندرة المحبيات/نقص الكريات البيضاء (انخفاض في عد خلايا الدم البيضاء)
- فطريات الفم (ارتفاع في عد خلايا الدم البيضاء)
- قلة الصفائح (انخفاض في عد الصفائح الدموية)
- انخفاض في الهيموغلوبين – مادة مسؤولة عن حمل الأكسجين في الدم)
- ردود فعل أرجية
- متلازمة الإفراز غير الملائم لهرمون ADH (مرض يتميز بانخفاض مستويات الصوديوم في الدم)
- انخفاض سننويات الصوديوم في الدم
- انخفاض في الوزن، فقدان الشهية مع فقدان وخيم في الوزن، زيادة الشهية
- ارتباك أرق (مشاكل نوم)، توهان، قلق، عصبية وعدم الإرتياح (اهتياج) (والتي يمكن أن تتفاقم في بعض الأحيان إلى الهذيان (حالة الارتباك حادة))
- هذيان (حالة ارتباك حادة)، عدوانية، هوسية (رؤية أشياء غير موجودة بالفعل)، كوابيس
- انخفاض الرغبة الجنسية
- متلازمة الغطام (ظهور أعراض الغطام مع أعراض مثل غثيان، صداع، الشعور بالمرض)
- متلازمة السيروتونين (مرض يتميز بزيادة تأثير مادة السيروتونين، مما يسبب عددًا من الأعراض مثل صداع، عدم الإرتياح (اهتياج)، إرتباك، هوسات وغيبوبة).

- إختلاجات
- متلازمة الذهان الخبيثة (مرض وخيم في الجهاز العصبي).
- دوخة، دوام، صداع
- نعاس، عدم الإرتياح، انخفاض في اليقظة
- رعاش
- عدم وضوح الرؤية
- اضطرابات في الذاكرة
- تنسجات عضلية (الرعع العضلي)
- اضطرابات في النطق (الجسمة التعبيرية)
- تغيرات في الإحساس (خدر)
- تغيرات في توتر العضلات (خلل التوتر)
- تغيرات في حساسة التذوق
- خلل نظم قلبي (اضطراب في نظم القلب)، بطء القلب (انخفاض في نظم القلب)، تسرع القلب (ارتفاع في نظم القلب)، تغيرات في مخطط كهربية القلب.
- انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض حاد في ضغط الدم عند الانتقال إلى الوقوف)
- غشيان (إغماء)
- فط ضغط الدم (ضغط دم مرتفع)
- إحتقان الأنف (انتسداد الأنف)، ضيق التنفس (صعوبة في التنفس)
- غثيان، تغير، جفاف في الفم، إمساك، إسهال، مشاكل في الهضم، الأم بطن، التهاب المعدة والأمعاء (التهاب يشمل المعدة والأمعاء العليا)، الإفراطي في إفراز اللعاب، انتسداد الأمعاء المتدلول.
- تغيرات في وظائف الكبد (بما في ذلك تلف الكبد والركود الصفراوي)
- طفح جلدي، حكة، تورم فمرفق (فطرتورق)
- الأم الأترخ والتشمين، ألم الظهر، ألم عضلي (آلام في العضلات)، ألم مفصلي (الأم في المفصل)
- صعوبة في التبول، تسرب البول (فقدان البول) أو حصر البول (فقدان القدرة على التبول)
- ضعف، ونمة (تورم بسبب احتباس السوائل)، أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، الإرهاق، الأم في الصدر، سخونة
- ارتفاع في إنزيمات الكبد (مواد موجودة في الكبد، عندما يزداد عددها، تشير إلى وجود تلف الكبد).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في المنشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن الأعراض الجانبية

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا نلتزم معًا لحماية لواءنا" عبر "تطبيق تروفيث" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستشارة الإنترنتية للتبليغ عن الأعراض الجانبية. أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ إنتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

sedative effect may be increased (reduces alertness). In this case, your doctor may reduce the dose of these medicines.

- MAOI's: monoamine oxidase inhibitors** (medicines used to treat anxiety and depression). Do not take trazodone with MAOI's or in the two weeks following discontinuation of MAOI's treatment. Likewise, do not use MAOI's in the week following discontinuation of trazodone treatment.
- Anaesthetics.** If you need to have surgery requiring the use of inhaled anaesthetics, tell your anaesthetist that you are taking Trिटtico. Trिटtico may increase the effect of the anaesthetic.
- Muscle relaxants** (medicines that cause muscle relaxation). If you need to have surgery requiring the use of muscle relaxants, tell your anaesthetist that you are taking Trिटtico. Trिटtico may increase the effect of these medicines.
- Levodopa** (medicine used to treat Parkinson's disease), as the effect of levodopa may decrease.
- Clonidine** (medicine used to lower high blood pressure) as trazodone can decrease the effect of clonidine.
- Anticoagulant and/or antiplatelet agents** (for decrease of blood coagulation): blood coagulation may be changed with risk of bleeding.
- Antihypertensives** (medicines used to treat high blood pressure), as the doctor may reduce the dose of the antihypertensive if necessary.
- Digoxin** (medicine used to treat heart problems).

#### Use of this medicine and food

If possible, take the tablets on a full stomach. Taking Trिटtico after meals reduces the chances of side effects.

**Use of this medicine and alcohol consumption**
Do not take Trिटtico if you consume large quantities of alcohol (see section 2 "Do not use the medicine if").

Trिटtico increases the sedative effects (reduces alertness) of alcohol. You should therefore avoid drinking alcohol during treatment with Trिटtico.

#### Pregnancy, breast-feeding and Fertility

The information regarding taking Trिटtico during pregnancy is limited.

If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, talk to your doctor or pharmacist before taking this medicine.

If you are pregnant or breast-feeding, only take Trिटtico in case of real need and under the close supervision of your doctor. If the doctor instructs to take Trिटtico until delivery, newborns should be monitored for withdrawal syndromes.

#### Driving and using machines

Trिटtico has minor or moderate influence on the ability to drive and use machines. Therefore, take special care if you need to drive or use machines. Do not drive or use machines if you get any side effects such as drowsiness, sedation (reduces alertness), dizziness, confusion or blurred vision.

#### Important information about some of the ingredients of this medicine:

**Trिटtico 50 mg film-coated tablets and Trिटtico 100 mg film-coated tablets contain:**

**Lactose** - if you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

**Castor oil** - may cause stomach upset and diarrhoea.

**Sodium** - this medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially "sodium-free".

**Trिटtico 50 mg film-coated tablets contain also sunset yellow (E110):**
**Sunset yellow (E110):** may cause allergic reactions.

#### 3. How to use this medicine?

Always use this medicine according to the doctor's instructions. Check with the doctor or pharmacist if you are not sure about the dosage and the manner of treatment with the medicine. the dosage and manner of treatment will be determined by the doctor only.

#### Adults

- The starting dose varies from 75 mg (one and a half 50 mg Trिटtico tablets) to 150 mg (three 50 mg Trिटtico tablets or one and a half 100 mg Trिटtico tablets) per day, to be taken in divided doses.

- During treatment, your doctor may increase the dose to up to 300 mg (six 50 mg Trिटtico tablets or three 100 mg Trिटtico tablets) per day, to be taken in divided doses. If you are a hospitalized patient, the dose may be as high as 600 mg per day.

#### Patients from 65 Years of age

Your doctor will adjust the dose according to your general health and tolerance to the medicinal product. In general, the recommended starting dose is 100 mg per day, given in divided doses or as one single dose, to be taken at night. Single doses above 100 mg should be avoided in these patients. Doses above 300 mg per day are unlikely to be required.

#### Manner of administration

If possible, take the tablets on a full stomach. Taking Trिटtico after meals reduces the occurrence of side effects. Take the night-time dose before going to bed.

The tablet can be divided into equal parts. This allows you to spread the doses out throughout the day, as prescribed by your doctor.

The tablets cannot be chewed or crushed – as they are film coated.

#### Do not exceed the recommended dose.

#### Treatment duration

Take this medicine for the amount of time prescribed by your doctor.

#### If you have accidentally taken a higher dosage

In the event of accidental ingestion or intake of an overdose of Trिटtico, contact a doctor immediately or go to the nearest hospital. Take this package leaflet with you.

If you take an overdose of this medicine, the following symptoms may appear:

- Drowsiness
- Dizziness
- Nausea
- Vomiting

In the most severe cases, the following symptoms may occur:

- Coma
- Tachycardia (increased number of heartbeats)
- Hypotension (low blood pressure)
- Hyponatraemia (decrease of sodium in the blood which causes a general malaise)
- Convulsions
- Severe difficulty breathing
- Heart disorders including bradycardia (reduced heart rate), arrhythmia (heart rhythm problems).

The doctor will prescribe the most suitable supportive treatment according to the nature and severity of your symptoms.

Symptoms may appear within 24 hours or more after overdose.

#### If you forget to take the medicine

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Take the next dose at the usual time and consult your doctor.

#### If you stop taking the medicine

Do not suddenly stop taking the medicine, particularly in prolonged treatment. Treatment with this medicine should be stopped gradually and under medical supervision so as to minimise the onset of withdrawal symptoms such as nausea, headache and malaise.

Continue with the treatment as recommended by the doctor.

**Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take a medicine. Wear glasses if you need them. If you have further questions on the use of this medicine, consult the doctor or pharmacist.**

#### 4. Side effects

Like any medicine, the use of Trिटtico may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

- شروط التخزين:** لا يتطلب هذا المستحضر ظروف تخزين خاصة. لكن يوصى بالتخزين في درجة حرارة الغرفة.
- لا يجوز رمي هذا الدواء في المجاري أو في سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف تتخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. سوف يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

إضافة للتربك الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

يحتوي تريتيكو **50 ملغ**، أقراص مطلية:

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Sunset yellow (E110) Lake, Castor oil (virgin), E wax, Talc.

يحتوي تريتيكو **100 ملغ**، أقراص مطلية:

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Talc, Castor oil (virgin), E wax.

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص تريتيكو **50 ملغ**

قرص تريتيكو 50 ملغ هو قرص مطلي بلون برتقالي-أصفر فاتح، مستدير، أملس، براق، محذب من كلا الطرفين وذًا خط تصفيف (جانب واحد) الذي يمكن التصفيف.

أقراص تريتيكو **100 ملغ**

قرص تريتيكو 100 ملغ هو قرص مطلي بلون أبيض إلى كريمي، مستدير، أملس، براق، محذب من كلا الطرفين وذًا خط تصفيف (جانب واحد) الذي يمكن التصفيف.

الأقراص معبأة في لويحات (بليسترات) من 30 قرص (2 بليسترات من 15 قرص، بجرعة دوائية مقدارها 50 ملغ أو بجرعة دوائية مقدارها 100 ملغ).

#### اسم المنتج وعنوانه:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22 - 60100, Ancona - Italy

#### اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

راز روكوت مرض، شارع جيشر هيميش 31، المنطقة الصناعية عيمك حيفر، إسرائيل

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة:

TRITTICO 50 MG: 173-30-36297-00

TRITTICO 100 MG:173-31-36296-00

تم تنقيح هذه المنشرة في تشرين الثاني 2023 وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه المنشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

RAZP3612/29-01

<p><b>Patient package insert according to Pharmacists' Regulations (Preparations) -1986</b></p> <p>This medicine can be sold with a physician's prescription only</p> <p><b>TRITTICO 50 mg</b></p> <p><b>TRITTICO 100 mg</b></p> <p><b>FILM-COATED TABLETS</b></p> <p><b>Active ingredient:</b> <u>Each film coated tablet of Trिटtico 50 mg contains:</u> Trazodone hydrochloride 50 mg equivalent to trazodone 45.5 mg. <u>Each film coated tablet of Trिटtico 100 mg contains:</u> Trazodone hydrochloride 100 mg equivalent to trazodone 91.1 mg.</p> <p>Inactive ingredients and allergens in the medicine – see section 6 "additional information" and in section 2 "Important information about some of the ingredients of this medicine".</p> <p><b>Read this entire leaflet carefully before using this medicine.</b> This leaflet contains concise information about the medicine. If you have any further questions, ask the doctor or pharmacist. This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if you think that their medical condition is the same as yours.</p> <p><b>1. What is the medicine intended for?</b> Treatment of depression with or without anxiety.</p> <p><b>Pharmacotherapeutic group:</b> Antidepressants.</p> <p><b>2. Before using the medicine:</b> <b>Do not use the medicine if:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"><li>- you are (sensitive) allergic to the active ingredient trazodone hydrochloride or to any of the other ingredients this medicine contains (see section 6, "additional information").</li> <li>- you consume large quantities of alcohol.</li> <li>- you are a heavy user of medicines to help you sleep (hypnotics).</li> <li>- you have recently had a heart attack.</li> <li>- This medicine is not intended for children and adolescents. See section "Children and Adolescents".</li></ul> </div> <p><b>Special warnings regarding the use of this medicine:</b> <b>Do not switch to a different medicine containing Trazodone (the active ingredient in the medicine) without medical consultation and monitoring.</b> Talk to your doctor or pharmacist before and during taking Trिटtico. In particular, tell your doctor if:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- you or your caregiver notice a change in or worsening of your depression, or your usual behaviour, or if you have thoughts of killing yourself. If this happens, inform your doctor <b>immediately</b>.</li> <li>- you have or have ever had fits or seizures (<b>epilepsy</b>), in which case, your doctor will avoid sudden increases or decreases in dosage.</li> <li>- you have <b>reduced liver function</b>, particularly if severe (liver failure).</li> <li>- you have <b>reduced kidney function</b>, particularly if severe (kidney failure).</li> <li>- you have <b>heart or blood vessel disorders</b>, such as chest pain (angina pectoris), disorders of the heart's electrical conduction system or you have recently had a heart attack. See also "Do not use the medicine if" section.</li> <li>- you have <b>hyperthyroidism</b> (an overactive thyroid gland).</li> <li>- you have <b>difficulty urinating</b>, as in the case of prostate hypertrophy (enlarged prostate).</li> <li>- you have acute narrow-angle <b>glaucoma</b> (increased eye pressure).</li> <li>- you suffer from <b>schizophrenia or any other mental disorder</b>, as using Trिटtico could make these disorders worse, for example increasing paranoid thoughts (believing something is real or true when it is not). See section 4 "Possible side effects".</li> <li>- you have <b>sore throat and fever</b>. In this case, your doctor may advise you to have a blood test because these could be symptoms of a blood disorder (agranulocytosis).</li> <li>- you feel <b>unwell or faint</b> (in particular when you get out of bed or stand up from a seated position), since this could be a sign of low blood pressure.</li> <li>- you are male and have a <b>prolonged and painful erection</b>. If this occurs, stop the treatment immediately.</li></ul> <p><b>Patients from 65 Years of age</b> Use this medicine with caution, as you may be more likely to get side effects, for example a drop in blood pressure when you stand up (orthostatic hypotension) or sleepiness. Tell your doctor if you or your caregiver notice these side effects. They will monitor you closely, particularly at the beginning of treatment and before and during dosage increases. Tell your doctor if you have any diseases or are taking any other medicines (see the section "Drug interactions"). The doctor will take the necessary precautions to avoid an increase in side effects.</p> <p><b>Interference with urine tests</b> If, while you are taking Trिटtico, you undergo a urine test for drug screening which uses special techniques (immunoassays), you could obtain a false positive result for amphetamines identification. If this happens, talk to your doctor and ask for a confirmatory test based on other techniques.</p> <p><b>Children and adolescents</b> Trिटtico is not intended for children and adolescents under 18 years of age.</p> <p><b>Drug interactions</b> <b>If you are taking or have recently taken other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.</b> In particular if you are taking:</p> <p><b>Medicines that could increase the possible side effects of Trिटtico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Medicines that modify the way the liver functions</u>, such as: <ul style="list-style-type: none"><li>- erythromycin (an antibiotic).</li> <li>- ketoconazole, itraconazole (medicines used to treat fungal infections).</li> <li>- ritonavir, indinavir (medicines used to treat HIV infection).</li> <li>- nefazodone (medicine used to treat various forms of depression).</li></ul></li></ul> <p>Avoid taking Trिटtico with these medicines. If necessary, your doctor will reduce the dose of Trिटtico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tricyclic antidepressants</b> (medicines used to treat depression). Avoid taking these medicines at the same time with trazodone.</li> <li><b>Fluoxetine</b> (a medicine used to treat anxiety and depression).</li> <li><b>Neuroleptics</b> (medicines used to treat mental disorders such as schizophrenia).</li> <li><b>Phenothiazine</b> (medicines used to treat mental disorders such as schizophrenia), such as <b>chlorpromazine, fluphenazine, levomepromazine, perphenazine</b>.</li> <li>Medicines that might prolong the QT interval (medicines that cause changes in the electrocardiogram).</li> <li><b>Medicines containing Hypericum perforatum</b> (St. John's Wort, a plant used as an antidepressant).</li></ul> <p><b>Medicines that reduce the effect of Trिटtico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Oral contraceptives</b> (birth control pill).</li> <li><b>Phenytoin</b> (medicine used to treat epilepsy).</li> <li><b>Carbamazepine</b> (medicine used to treat epilepsy). Your doctor will monitor you to determine whether the dosage of Trिटtico needs to be increased.</li> <li><b>Barbiturates</b> (medicines used as sedatives (tranquillisers), anaesthetics, anti-epileptics, hypnotics (sleep medicines)).</li></ul> <p><b>Medicines that increase the effect of Trिटtico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Cimetidine</b> (medicine used for stomach ulcers).</li></ul> <p><b>Other medicines that interfere with Trिटtico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Antipsychotics</b> (medicines used to treat certain mental illnesses), <b>hypnotics</b> (sleep medicines), <b>sedatives</b> (tranquillisers), <b>anxiolytics</b> (medicines for anxiety) and <b>antihistamines</b> (medicines used to treat allergies), since their</li></ul>	
---	--

If any of the following side effects arise or if noticed by your caregiver, **STOP treatment with this medicine and contact your doctor immediately:**

- Jaundice (yellowing of the skin and white of the eyes).
- Worsening of depression characterised by manic behaviour (obsessive behaviour and/or ideas).
- Priapism (abnormal erection that will not go away).

If any of the following side effects occur or if noticed by your caregiver, contact your doctor **immediately:**

- suicidal thoughts or suicidal behaviour or any other change in behaviour. These effects could appear both during treatment and in the early stages following the withdrawal of treatment. Your doctor will therefore monitor these symptoms.

In addition, the following side effects could occur for which the frequency is not known:

**Side effects with unknown frequency (effects for which a frequency has not yet been determined):**

- agranulocytosis/leukopenia (reduced white blood cell count)
- eosinophilia (increased white blood cell count)
- thrombocytopenia (reduced blood platelet count)
- anaemia (reduced haemoglobin - substance that transports oxygen in the blood)
- allergic reactions
- syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (disease characterised by decreased blood sodium levels)
- reduced blood sodium levels
- weight loss, loss of appetite with serious weight loss, increased appetite
- confusion, insomnia, disorientation, anxiety, nervousness and agitation (occasionally worsening to delirium)
- delirium, aggressiveness, hallucinations (seeing things that are not really there), nightmares
- reduced sexual desire
- withdrawal syndrome (onset of withdrawal symptoms with such symptoms as nausea, headache, malaise)
- serotonin syndrome (disease characterised by an excessive increase in the effect of a substance called "serotonin", which causes a series of effects including headache, agitation, mental confusion, hallucinations and coma)
- convulsions
- neuroleptic malignant syndrome (severe nervous system disease)
- dizziness, vertigo, headache
- drowsiness, restlessness, decreased alertness
- tremor (shaking)
- blurred vision
- memory disturbance
- muscle twitching (myoclonus)
- language disorders (expressive aphasia)
- altered sensitivity (paraesthesia)
- altered muscle tone (dystonia)
- altered taste
- cardiac arrhythmias (heart rhythm problems), bradycardia (reduced number of heartbeats), tachycardia (increased number of heartbeats), electrocardiogram changes.
- hypotension (low blood pressure), including orthostatic hypotension (severe reduction in blood pressure when rising to a standing position)
- syncope (fainting)
- hypertension (high blood pressure)
- nasal congestion (stuffy nose), dyspnoea (difficulty breathing)
- nausea, vomiting, dry mouth, constipation, diarrhoea, digestion problems, stomach pain, gastroenteritis (inflammation involving the stomach and initial portion of the intestine), increased salivation, paralytic ileus (intestinal obstruction)
- altered liver function (including liver damage and cholestasis)
- rash, itching, excessive sweating (hyperhidrosis)
- pain in the legs and arms, back pain, myalgia (muscle pain), arthralgia (joint pain)
- troubles with urination, urinary incontinence (loss of urine) or urinary retention (inability to urinate)
- weakness, oedema (swelling due to fluid accumulation), influenza-like symptoms, fatigue, chest pain, fever
- increased liver enzymes (substances present in the liver and which, when increased, indicate the presence of liver damage).

**If a side effect appears, if one of the side effects worsens or if you suffer from a side effect which is not mentioned in this leaflet, consult the doctor.**

#### Reporting of side effects

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking the link "report side effects due to medication" that can be found on the homepage of the Ministry of Health website ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) directing to an online form for reporting side effects, or by clicking the link: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. How to store the medicine?

- Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be stored in a closed place out of the reach and sight of children and/or infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. Date) stated on the package. The expiry date refers to the last day of that month.
- **Storage conditions:** This medicinal product does not require any special storage conditions, but it is recommended to be stored in room temperature.
- Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

#### 6. Additional information

**In addition to the active ingredient, this medicine also contains:**

**TRITTICO 50 mg film-coated tablets:**

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Sunset yellow (E110) Lake, Castor oil (virgin), E wax, Talc.

**TRITTICO 100 mg film-coated tablets:**

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate \*2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Talc, Castor oil (virgin), E wax.

**What does the medicine look like and what does the package contain:**

**Trिटtico 50 mg Tablets:**

Trिटtico 50 mg is Pale orange yellow, round, smooth, glossy, biconvex film-coated tablets with one sided central score line.

**Trिटtico 100 mg Tablets:**

Trिटtico 100 mg is white to off-white, round, smooth, glossy, biconvex film-coated tablets with one sided central score line.

The tablets are packaged in blisters, in a box containing 30 tablets (2 blisters of 15 tablets, 50 mg or 100 mg each).

**Marketing authorization holder and importer**  
RAZ pharmaceuticals LTD., 31 GESHER HAETZ ST., INDUSTRIAL PARK, EMEK HEFER, 3877701, ISRAEL

**Registration numbers of the medicines in the national drug registry of the ministry of health:**

TRITTICO 50 MG: 173-30-36297-00

TRITTICO 100 MG: 173-31-36296-00

This leaflet was revised in November 2023 in accordance with the MOH guidelines.

RAZP3612/29-01

Trिटtico PIL PB0124-02