



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ולבוטרין XR 150 מ"ג טבליות בשחרור ממושך

כל טבלייה מכילה:

בופרופיון הידרוchlוריד (bupropion hydrochloride) 150 מ"ג

ולבוטרין XR 300 מ"ג טבליות בשחרור ממושך

כל טבלייה מכילה:

בופרופיון הידרוchlוריד (bupropion hydrochloride) 300 מ"ג

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 – " מידע נוסף".
קרה בעיון את העلون עד סוףו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על
הרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מצבם הרפואי דומה.
ולבוטרין XR אינה מיועדת לטיפול בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

ולבוטרין XR היא תרופה המיועדת לטיפול באפיוזודות של דיכאון מג'ורי. לאחר תגובה
מספקת, המשך הטיפול בולבוטרין XR ייעיל למניעת הישנות.

קבוצה Terapeutית:

תרופות נגדות דיכאון אחרות (other antidepressants).

היא נחשבת כמגיבה עם כימיקלים במוח הנקראים נוראדרנליין ודופמין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבופרופיון או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אתה לוקח תרופות אחרות המכילות בופרופיון
- אובחנת כסובל מאפילפסיה או שיש לך היסטוריה של פרוכסימים
- יש לך או הייתה לך הפרעת אכילה (לדוגמה, בולימיה או אנוורקסיה נרבותה)
- יש לך גידול במוח
- אתה בדרכך כל שטיין כבד וזה עתה הפסקת או שאתה עומד להפסיק לשתו
- יש לך בעיות כבד חמורות
- הפסקת לאחרונה לקחת תרופות הרגעה, או שאתה עומד להפסיק אותן בזמן שאתה לוקח ולבוטרין XR

- אתה לוקח או לוקחת תרופות אחרות לדיכאון או למחלת פרקינסון הנקראות מעכבי מונואמין אוקסידאי (MAOIs) ב-14 הימים האחרונים.
אם אחד מהן חל עלייך, שוחח מיד עם הרופא, מבלי לקחת וולבוטרין XR.

**ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
שוחח עם הרופא לפני השימוש בוולבוטרין XR.**

تسمונת ברוגדה

אם יש לך מצב הנקראות תסמונת ברוגדה (تسمונת תורשתית נדירה המשפיעה על קצב הלב) או אם דום לב או מוות פתאומי אירעו במשפחה.

ילדים ומתבגרים

וולבוטרין XR אינה מיועדת לטיפול בילדים מתחת לגיל 18 שנים. קיימים סיכון מוגבר להתקנות ולמחשבות אובדןיות כאשר ילדים מתחת לגיל 18 שנים מטופלים בנוגדי דיכאון.

מבוגרים

הרופא צריך לדעת לפני שתיקח וולבוטרין XR אם:

- אתה שותה הרבה אלכוהול באופן קבוע
- יש לך סוכרת שעוברת אתה משתמש באינסולין או בטבליות
- הייתה לך פגיעה ראש חמורה או היסטוריה של חבלת ראש

נמצא שולבוטרין XR גורמת להתקפים (פרוכוסים) בערך ב-1 מתוך 1,000 אנשים.

סביר יותר שתופעת לוואי זו תתרחש באנשים מהקבוצות הנזכרות לעיל. אם יש לך התקף פרוכוסים במהלך הטיפול עלייך להפסיק לocket וולבוטרין XR. אל תמשיך הטיפול

ופנה לרופא

• יש לך הפרעה דו-קוטבית (שינויים קיצוניים במצב רוח), מכיוון שולבוטרין XR עלולה להביא לאפיוזדה של מחלה זו

• אתה לocket תרופות אחרות לדיכאון, השימוש בתרופות אלה יחד עם וולבוטרין XR יכול להוביל לתסמונת סרוטוניין, מצב שיכל לסכן חיים (ראה "אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות" בסעיף זה).

• יש לך בעיות בכבד או בכליות, ייתכן שהייה לך סיכון רב יותר לסבול מתופעות לוואי. אם אחד מהນ汇报ים לעיל חל עלייך, שוחח שוב עם הרופא לפני לocket וולבוטרין XR. ייתכן שהוא ירצה להזכיר תשומת לב מיוחדת לטיפול שלך, או ימליץ על טיפול אחר.

מחשובות אובדןיות והחמרת דיכאון

אם אתה מודcka, עלולות להיות לך לעיתים מחשובות על פגיעה עצמית או התאבדות. מחשובות אלו עלולות להתגבר כאשר מתחילה לראשונה ליטול נוגדי דיכאון, שכן לתרופות הללו לוקח זמן להשפיע, לרוב כשבועיים אך לעיתים יותר.

אתה עלול לסבול מכך בסבירות גבוהה יותר אם:

- היו לך בעבר מחשובות להתאבד או פגוע בעצמך.

- אתה בוגר צעיר. מידע מניסויים קליניים הראה סיכון מוגבר של התנהגות אובדניתם במבוגרים מתחת לגיל 25 עם מצבים פסיכיאטריים שטופלו בוגד דיכאון. אם יש לך מחשבות על פגיעה עצמית או התאבדות בכל זמן שהוא, צור קשר עם הרופא או גש לבית החולים מכך.
- ייתכן שתמצא שימושי בספר לקרוב משפחה או חבר קרוב שאתה מודכו, ולבקש מהם לקרוא עליו זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם חושבים שהdicauן שלך מחייב, או אם הם מודאגים לגבי שינויים בהתנהגותך.

איןטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או מקבל תרופות אחרות לדיכאון או למחלת פרקיינסון הנקראות **מעכבי מונאמין אוקסידאי (MAOIs)** ב-14 הימים האחרונים, **ספר לרופא מבלי** לחתול ולבטרין XR (ראה גם "אין לשמש בתרופה אם" בסעיף 2).

אם אתה לוקח, אם מקבל לאחרונה או ייתכן שתיקח תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופת. ייתכן שהוא ישנה את המנה של ולבוטרין XR, או יציע שינוי בתרופות האחרות שלך.

תרופות מסוימות אין משתמשות עם ולבוטרין XR. חלק מהן עלולות להגדיל את הסיכוי להתקפים או לפרכוסים. תרופות אחרות עלולות להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי אחרות. כמו דוגמאות מפורטת מטה, אך זו אינה רשימה מלאה.

- **סיכוי גבוה מהרגיל לפרכוסים עלול להיות אם:**
 - אתה לוקח תרופות אחרות לדיכאון או למחלות נפש אחרות
 - אתה לוקח תאופילין לאסתמה או למחלת ריאות
 - אתה לוקח טרמדול, משקר כאבים חזק
 - **לקחת תרופות הרגעה, או אם אתה עומדת להפסיק אותן בעודך לוקח ולבוטרין XR** (ראה גם "אין לשמש בתרופה אם" בסעיף 2)
 - אתה לוקח תרופות נגד מלריה (כמו מלוקוין או קלורוקוין)
 - אתה לוקח מריצים או תרופות אחרות **שליטה במשקל או בתיאבון**
 - אתה לוקח סטרואידים (דרך הפה או בהזרקה)
 - אתה לוקח תרופות אנטייבוטיות הנקראות קוונילוניים
 - אתה לוקח סוגים מסוימים של אנטי-היסטמינים שעולים לגורם לשינויות
 - אתה לוקח **תרופות לסוכרת.**
- אם אחד מלהן **חל עלייך**, שוחח עם הרופא מיד, לפני נטילת ולבוטרין XR. הרופא ישקול את היתרונות והסיכוןם עבורך בנטילת ולבוטרין XR.

- **סיכוי גבוה מהרגיל לתופעות לוואי אחרות עלול להיות אם:**
- אתה לוקח תרופות אחרות לדיכאון (כגון אמיטריפטילין, פלאוקסטין, פארוקסטין, ציטלופרם, אסציטלופרם, ונלפקסין, דוסולפין, דיזפראמין או אימיפראמין) או למחלות נפש אחרות (כגון קלוזאפין, ריספרידון, תיוריידאין או אולאנזאפין).
- **ולבטרין XR עלולה להגביל עם תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בדיכאון** ואתה עלול לחות שינויים במצב הנפשי (לדוגמה אי שקט, הזיות, תרדמת), והשפעות אחרות

כגון חום גוף מעל 38°C , עליה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מוגזמים, נוקשות שריריים, חוסר קווארדינציה /או תסמיינים של מערכת העיכול (לדוגמה בחילה, הקאה, שלשול).

- אתה לוקח תרופות למחלת פרקינסון (לבודופה, אמאנטאידין או אורפננדرين)
 - אתה לוקח תרופות שימושיות על יכולת הגוף שלך לפרק וולבוטרין XR (קרבאמאזפין, פניטואין, ואלפרואט)
 - אתה לוקח תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בסרטן (כמו ציקלופוספמید, איפוספמיד)
 - אתה לוקח קלופיזוג'רל המשמשת בעיקר למניעת שבץ
 - אתה לוקח חוסמי בטא מסוימים (כמו מטופרולול)
 - אתה לוקח תרופות מסוימות לקצב לב לא סדר (פרופאפנון או פלקאיניד)
 - אתה משתמש במדבקות ניקוטין לעזור לך להפסיק לעשן.
- אם אחד אלה חל עלייך, שוחח עם הרופא מיד, לפני נטילת וולבוטרין XR.

וולבוטרין XR עלולה להיות פחות יעילה

- אם אתה לוקח ריטונאביר או אפיברין, תרופות לטיפול בווירוס HIV.
- אם זה חל עלייך, ספר לרופא. הרופא יבדוק עד כמה וולבוטרין XR יעילה עבורך. ניתן שייהי הכרחי להעלות את המנה שלך או לשנות טיפול אחר לדיכאון שלך. אל תעלה את מנת הולבוטרין XR שלך מבלי להתייעץ עם הרופא, שכן הדבר עלול להגבר את הסיכון שיהיו לך תופעות לוואי, כולל פרוכוסים.

וולבוטרין XR עלולה להפחית יעילות של תרופות אחרות

- אם אתה לוקח טומוקסיפין שמשמשת לטיפול בסרטן השד.
 - אם זה חל עלייך, ספר לרופא. ניתן שייהי צריך לשנות טיפול אחר לדיכאון שלך.
 - אם אתה לוקח דיגוקסין לטיפולقلب.
- אם זה חל עלייך, ספר לרופא. הרופא עשוי לשקל את התאמת המינון של דיגוקסין.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אלכוהול יכול להשפיע על אופן הפעולה של וולבוטרין XR, וכך גם נלקחים יחדיו הם עלולים, במקרים נדירים, להשפיע על העצבים שלך או על מצבך הנפשי. חלק מהאנשים מוצאים שהם רגשים יותר לאלכוהול כאשר הם נוטלים וולבוטרין XR. ניתן שהרופא ימליץ לך לא לשות אלכוהול (בירה, יין או משקאות חריפים) כאשר אתה נוטל וולבוטרין XR, או להשתדל לשות מעט מאוד. אבל אם אתה נהוג לשות כמויות גדולות של אלכוהול ביום, אל תפסיק בפתאומיות: זה עלול להגבר סיכון לפרקושים.

שוחח עם הרופא לגבי שתיתת אלכוהול לפני שאתה מתחילה לנקחת וולבוטרין XR.

השפעה על בדיקות שתן

וולבוטרין XR עלולה להפריע לבדיקות שתן מסויימות לזיהוי תרופות אחרות. אם עלייך לעמוד בבדיקה שתן, ספר לרופא או לבית החולים שאתה לוקח וולבוטרין XR.

הירון והנקה

אל תיקחי וולבוטרין XR אם אתה בהירון, חושבת שיתכן שאתה בהירון או מתכונת להרות, אלא אם כן הרופא ממליץ על כך. היועצץ ברופא או ברוקח לפני קייחת תרופה זו. חלק מהמחקרנים, אך לא כולם, דיווחו על עלייה בסיכון למומים מולדדים, במיוחד מומי לב, בתינוקות שאימהותיהם נטלו וולבוטרין XR. לא ידוע אם הם עקב השימוש בוולבוטרין XR.

הרכיבים של וולבוטרין XR יכולים לעורר לחלב אם. היועצץ עם הרופא או הרוקח לפני קייחת וולבוטרין XR.

נהייה ושימוש במכונות

אם וולבוטרין XR גורמת לך לשחרחות או להרגשה שאתה עומד להתעלף, אל תנהג או תפעיל כלים או מכונות כלשהם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. ניתן שיקח זמן עד שתתחל להריגש טוב יותר.локח זמן עד שמושגת השפעה מלאה של התרופה, לפעמים שבועות או חודשיים. כאשר תתחל להריגש טוב יותר, הרופא עשוי להמליץ לך למשיך לחת וולבוטרין XR כדי למנוע חזרה של הדיכאון. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל למבוגרים בלבד הוא טבליה אחת של 150 מ"ג פעם ביום. הרופא עשוי להעלות את המינה שלך ל-300 מ"ג פעם ביום אם הדיכאון שלך לא משתפר לאחר מספר שבועות.

קח את מנת טבליות הולבוטרין XR שלך ב�отק. אין לחת וולבוטרין XR יותר מפעם אחת ביום.

אין לעורר על המינה המומלצת.

הטבליה מצופה בקילפה המשחררת באיטיות את התרופה בתוך הגוף. ניתן שתבחן בשמהו בצוואה שלך שנראה כמו טבליה. זהה הקילפה הריקה היוצאת מגוף. בלוע את הטבליות בשלמותן. אין ללוות אותן, לכתחוש אותן או לחצוץ אותן – אם תעשה זאת, יש סכנה שתיקח מינון יתר, היות והתרופה תשחרר בתוך הגוף מהר מדי. הדבר יגביר את הסבירות שיהיו לך תופעות לוואי, כולל התקפים (פרכוסים). חלק מהאנשים ימשיכו לחת טבליה אחת של 150 מ"ג בכל יום במשך כל תקופת הטיפול שלהם. ניתן שהרופא רשם זאת אם יש לך בעיות כבד או כלויות.

marsh הטיפול

רק אתה והרופא יכולים להחליט כמה זמן عليك לחת וולבוטרין XR. ניתן שיקחו שבועות או חודשים של טיפול עד שתבחן בשיפור כלשהו. שוחח על התסמנים שלך עם

הרופא בקביעות על מנת להחליט כמה זמן נדרש לנקח אותה. כאשר תחיל להרגיש טוב יותר, הרופא עשוי להמליץ לך להמשיך לנקח וולבוטרין XR כדי למנוע מהDİCAGOן לחזור.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר
אם אתה נוטל יותר מדי טבליות, אתה עלול להגביר את הסיכון להתקפים או לפרכוסים.
אל תטעכב. אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ורבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, המtan וקח את הטבליה הבאה בזמן הרגיל.
אין ליטול מנת כפולה כדי לפסות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק לנקח וולבוטרין XR או להפחית את המנה
ללא התייעצות עם הרופא לפני כן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנק נוטל תרופה. הרכב
משמעותי אם הנק זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדים
הוראות פתיחה: כדי להסיר את הפקק, יש להחוץ מטה ובו זמנית לסובב שמאליה (נגד כיוון
השעון).
הוראות סגירה: יש להניח את הפקק על הקצה הפתוח של הבקבוק ולסובב לכיוון ימין
(בכיוון השעון) עד לסגירה מלאה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוולבוטרין XR עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות התקפים או פרכוסים

כ-1 מכל 1,000 אנשים הנוטלים וולבוטרין XR נמצא בסיכון להתקף (פרכוס או עוירת).
הסיכוי שהוא יקרה גבוה יותר אם אתה לוקח יותר מדי וולבוטרין XR, אם אתה לוקח תרופות מסוימות, או אם אתה נמצא בסיכון גבוה מהרגיל להתקפים. אם אתה מודאג, שוחח עם הרופא.

אם אתה חווה התקף, ספר לרופא לאחר שתתאושש. אל תיקח טבליות נוספת.

תגובהות אלרגיות

- חלק מהאנשים עלולים לפתח תגובה אלרגית לוולבוטרין XR. אלה כוללות:
- עור אדום או פריחה (דומה לסרפת), שלפוחיות או גבשושיות מוגדרות (חרפת) על העור. חלק מהפריחות העוריות עלולות להזכיר טיפול בבית חולים, במיוחד אם אתה סובל גם מכאבים בפה או בעיניים.
 - צפופים בלתי רגילים בנשימה או קשיי נשימה
 - עפupyים, שפתיים או לשון נפוחים
 - כאבים בשירים או במפרקים
 - התמוטטות או אובדן הכרה.
- אם יש לך סימנים כלשהם של תגובה אלרגית צור קשר עם רופא מיד. **אל תיקח טבליות נוספת.**
- תגובות אלרגיות עלולות להמשך זמן רב. אם הרופא רשם משוה שיעזר עם תסמיini אלרגיה, ודא שאתה נוטל את הטיפול עד סופה.

פריחה עורית של לופוס (זאבת) או החמרה בתסמינים של לופוס
שכיחות לא ידועה – לא ניתן להעריך את שכיחות המנתונים הקיימים באנשים הлокחים וולבוטרין XR.

לופוס הינה הפרעה במערכת החיסון המשפיעה על העור ואיברים אחרים.
← אם אתה חווה התלקחות של לופוס, **פריחה עורית או נגעים (ביחודה באזורי החשופים לשמש)** במהלך קיומה של וולבוטרין XR, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר **שייתכן** שהייתה צורך להפסיק את הטיפול.

(Acute Generalised Exanthematous Pustulosis -AGEP)

שכיחות לא ידועה – לא ניתן להעריך את שכיחות מהמידע הקיים באנשים הлокחים וולבוטרין XR.

התסמינים של AGEP כוללים פריחה עם פצעונים/שלפוחיות מלאי מוגלה.
← אם יש לך פריחה עם פצעונים/שלפוחיות מלאי מוגלה, צור קשר עם הרופא מיד, לאחר **שייתכן** שהייתה צורך להפסיק את הטיפול.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מכל 10 אנשים:

- קשיים בשינה. ודא שאתה לוקח וולבוטרין XR בבוקר
- כאב ראש
- יובש בפה
- תחושת בחילה, הקאה.

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- חום, סחרחורות, גרד, הזעה ופריחה בעור (לעתים בשל תגובה אלרגית)

- רעד, חולשה, עייפות, כאבים בחזה
- תחושת חרדה או עצבנות
- כאב בטן או הפרעות אחרות במערכת העיכול (עצירות), שינויים בטעם המזון, אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- עלייה בלחץ דם לעיתים חמורה, הסמקה
- צלצול באוזניים, הפרעות בראייה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- תחושת דיכאון (ראה גם סעיף 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה", תחת "מחשבות אובדן ווחחרמת דיכאון")
- תחושת הבלבול
- קושי ברכישת
- קצב לב מוגבר
- ירידת משקל.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- פרוכוסים.

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- דפוקות לב, עילפון
- עוויתות, נוקשות שרירים, תנעות לא נשלטות, בעיות בהליכה או בקואורדינציה תחושת חוסר מנוחה, אי שקט, עוינות, תוקפנות, חלומות מוחרים, תחושת עקצוץ או חוסר תחושה, אובדן זיכרון
- הצהבה של העור או של הלובן בעיניך (צחבת) שעלולה לגרום בשל עלייה באנמיי כבד, דלקת כבד (הפטיטיס)
- תגבות אלרגיות חמורות; פריחה יחד עם כאבי מפרקים ושרירים
- שינויים ברמות הסוכר בدم
- השתנה מרובה או פחותה מהרגיל
- אי שליטה במתן שתן (בריחה לא רצונית של שתן, דליפת שתן)
- פריחות חמורות בעור העlolות להופיע בפה ובחלקי גוף אחרים ויכולות להיות מסכנות חיים
- החמרה של פסורייזיס (כתמים מעובדים של עור אדום)
- נשירה או הידלות לא אופייניות של השieur (התקרחות)
- תחושה של ניתוק מהמציאות או מזרות (לה פרסונלייזציה); ראייה או שמיעה של דברים אשר אינם קיימים (היאית); תחושה או אמונה בדברים שאינם נכוןים (אשלית); חסドנות חמורה (פרנויה).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה

תופעות לוואי אחרות הופיעו במספר קטן של אנשים אך שכיחותן המדוקטת אינה ידועה:

- מחשבות על פגיעה עצמית או מחשבות אובדןites בזמן לקיחת וולבוטרין XR או מיד לאחר הפסקת הטיפול (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופת"). אם יש לך מחשבות כאלה, צור קשר עם הרופא או גש לבית החולים מיד
- אובדן קשר עם המציגות ואי יכולת לחשוב או לשפט בצורה צלולה (פסיכואה);
- תסמנינים אחרים יכולים לכלול הזיות ו/או אשליות בחושה פתאומית של פחד עז (התקף חרדה)
- גמגום
- ירידה במספר תאי הדם האדומים (אנמיה), ירידה במספר תאי הדם הלבנים (לוריופניה) וירידה במספר טסיות הדם (טרומבווציטופניה)
- ירידה ברמת הנתרן בדם (היפונטרמייה)
- שינוי במצב הנפשי (לדוגמה אי שקט, הזיות, תרדמת), והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל $C^{\circ} 38$, עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מוגזמים, נוקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תסמנינים של מערכת העיכול (לדוגמה בחילה, הקאה, שלשול), בעת לקיחת וולבוטרין XR יחד עם תרופות לטיפול בדיכאון (כגון פארוקסטין, ציטלופרם, אסציטילופרם, פלאוקסטין וונלפקסין).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמלה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לינק www.health.gov.il (המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרפיה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריך תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- $C^{\circ} 25$. יש לאחסן באזירה המקורי כדי להגן מלחות ומאור.
- לשימוש עד 30 יום מהפתיחה.
- הבקבוק מכיל מכל אטום קטן המכיל פחם וגל סיליקה על מנת לשמור על הטבליות יבשות. השאר את המכל בבקבוק. אל תבלע אותו.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתה. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוספַּן על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
הטבלייה מכילה:

Polyvinyl alcohol, glycerol dibehenate.

ציפוי הטבלייה מכיל:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion (Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

דיו להדפסה:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
טבליות וולבוטרין XR 150 מ"ג הן טבליות עגולות בצבע לבן שמנת עד צהוב חיוור עם הדפס "GS 5FV 150" בדיו שחור על צד אחד והצד השני חלק. הן זמינים בבקבוקי פוליאתילן לבנים המכילים 7, 30 או 90 (3X30) טבליות. הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדים.
טבליות וולבוטרין XR 300 מ"ג הן טבליות עגולות בצבע לבן שמנת עד צהוב חיוור עם הדפס "GS 5YZ 300" בדיו שחור על צד אחד והצד השני חלק. הן זמינים בבקבוקי פוליאתילן לבנים המכילים 7, 30 או 90 (3X30) טבליות. הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדים.
ייתכן שלא כל גדרי האריזה משוקקים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצרן: בוש הلت' קומפנייס INC, מניטובה, קנדה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
ולבוטרין XR 150 מ"ג: 140-05-31653
ולבוטרין XR 300 מ"ג: 140-06-31654
- לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך במאי 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.