

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קמזיוס® 2.5 מ"ג
קמזיוס® 5 מ"ג
קמזיוס® 10 מ"ג
קמזיוס® 15 מ"ג
כמוסות

חומר פעיל וכמותו:

קמזיוס 2.5 מ"ג: כל כמוסה מכילה 2.5 מ"ג מבקמטן (mavacamten)
קמזיוס 5 מ"ג: כל כמוסה מכילה 5 מ"ג מבקמטן (mavacamten)
קמזיוס 10 מ"ג: כל כמוסה מכילה 10 מ"ג מבקמטן (mavacamten)
קמזיוס 15 מ"ג: כל כמוסה מכילה 15 מ"ג מבקמטן (mavacamten)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וכן פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתרופה קמזיוס קיימים חוברת וכרטיס למטופל. החוברת והכרטיס מכילים מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בקמזיוס ולפעול על פיו. יש לעיין בחוברת ובכרטיס למטופל וכן בעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתרופה. יש לשמור את החוברת והכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

המידע החשוב ביותר שעליך לדעת על קמזיוס קמזיוס עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, לרבות:

- **אי ספיקת לב**, מצב שבו שריר הלב אינו יכול להתכווץ בעוצמה מספקת. אי ספיקת לב היא מצב חמור שעלול להוביל למוות. עליך לעבור בדיקות אקוקרדיוגרם (אקו לב) לפני נטילת המנה הראשונה ובמהלך הטיפול בקמזיוס כדי לעזור לרופא להבין כיצד הלב שלך מגיב לקמזיוס. אנשים המפתחים זיהום חמור או קצב לב בלתי סדיר נמצאים בסיכון גבוה יותר לאי ספיקת לב במהלך הטיפול בקמזיוס. דווח לרופא או פנה לעזרה רפואית מייד אם אתה מפתח תופעות חדשות או חלה החמרה בתופעות הבאות:
 - קוצר נשימה
 - כאב בחזה
 - תשישות
 - נפיחות ברגליים
 - תחושה של דפיקות לב (פלפיטציות)
 - עלייה מהירה במשקל
- **הסיכון לאי ספיקת לב מוגבר גם כאשר קמזיוס ניטלת עם תרופות אחרות מסוימות.** דווח לרופא על התרופות שאתה נוטל, הן תרופות מרשם והן תרופות ללא מרשם, לפני ובמהלך הטיפול בקמזיוס. ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות" בפרק 2 וכן פרק 4 למידע על תופעות לוואי.

1. למה מיועדת התרופה?

קמזיוס מותווית לטיפול במבוגרים עם קרדיומויפתייה היפרטרופית (Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM) חסימתית סימפטומטית עם תסמינים קלים עד משמעותיים בזמן פעילות יומיומית (NYHA class II-III), לשיפור התסמינים ויכולת התפקוד.

קבוצה תרפויטית: תרופות לטיפול בלב.

מהי קרדיומויפתייה היפרטרופית חסימתית (Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy, oHCM)

קרדיומויפתייה היפרטרופית היא מצב בו הדופן של חדר שמאל בלב מתכווצת חזק יותר ונעשית עבה מהרגיל. התעבות הדופן עלולה לחסום את זרימת הדם אל מחוץ ללב וגם לגרום לשריר הלב להיות יותר נוקשה.

חסימה זו מקשה על זרימת הדם לתוך ומחוץ ללב ועל הזרמתו לגוף בכל פעימה. התסמינים של קרדיומויפתייה היפרטרופית חסימתית כוללים: כאבים בחזה וקוצר נשימה (במיוחד בזמן פעילות גופנית), עייפות, הפרעות בקצב הלב, סחרחורת, תחושה שעומדים להתעלף, עילפון ובצקת (נפיחות) בקרסוליים, כפות רגליים, רגליים, אזור הבטן ו/או ורידים בצוואר.

כיצד פועלת התרופה

קמזיוס פועלת להפחתת ההתכווצות העודפת של שריר הלב ולהפחתת החסימה בזרימת הדם לגוף. כתוצאה מכך, קמזיוס עשויה לשפר את התסמינים שלך ואת יכולתך להיות פעיל.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) למבקמטן או לכל אחד מהמרכיבים האחרים שמכילה התרופה (כמפורט בפרק 6).
 - אתה נוטל תרופות מסוימות שעלולות להעלות או להוריד את רמות החומר הפעיל (מבקמטן) של התרופה בדם כשנלקחות יחד עם קמזיוס.
- שאל את הרופא אם התרופות שאתה נוטל מונעות ממך לקבל את קמזיוס. ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בקמזיוס, ספר לרופא אם:

- את בהיריון או מתכננת להרות. ראי סעיף "היריון והנקה".
- את אישה מניקה או מתכננת להניק. ראי סעיף "היריון והנקה".
- אתה נוטל תרופות נוספות כלשהן, כולל תרופות ללא מרשם (כגון אומפרזול או אזומפרזול) ו/או תרופות אחרות לטיפול במחלת קרדיומיופתיה היפרטרופית (HCM) חסימתית, ויטמינים או תוספים צמחיים. ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות".
- אתה מפתח זיהום.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18. אין מידע על בטיחות ויעילות של קמזיוס בילדים.

בדיקות ומעקב

הרופא יעריך את תפקוד הלב שלך באמצעות אקוקרדיוגרם (בדיקת אולטרה סאונד של הלב, נקרא גם אקו לב) לפני מתן המנה הראשונה ובאופן קבוע במהלך הטיפול בקמזיוס. חשוב מאוד לקיים את בדיקות האקוקרדיוגרם התקופתיות כי הרופא צריך לבדוק את ההשפעה של קמזיוס על הלב שלך. ייתכן שהמינון ישתנה במהלך הטיפול על מנת לשפר את תגובתך לקמזיוס או כדי להפחית את תופעות הלוואי.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

- נטילה של קמזיוס בשילוב עם תרופות מסוימות עלולה לגרום לאי ספיקת לב. אין להפסיק נטילה או לשנות מינון של תרופה ואין להתחיל נטילת תרופה חדשה ללא התייעצות עם הרופא.
- אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או שאתה עלול לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- סימטידין, אומפרזול, אזומפרזול, פנטופרזול (תרופות להפחתת רמת החומציות בקיבה).
- קלריתרומיצין ואריתרומיצין (אנטיביוטיקות מסוימות לזיהומים חיידקיים).
- איטרקונזול, פלוקונזול, קטוקונזול, פוסקונזול ווריקונזול (תרופות מסוימות לזיהומים פטרייתיים).
- פלואוקסטין, פלובוקסמין, ציטלופרם (תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון).

- ריטונאביר, קוביסיסטאט ואפוורנז (תרופות מסוימות לטיפול ב-HIV).
- ריפאמפיצין (תרופה נגד זיהומים חיידקיים כגון שחפת).
- אפלוטמייד, אנזלוטמייד, מיטוטן, סריטיניב, אידלליסיב, ריבוציקליב, טוקטיניב (תרופות לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן).
- קרבמזפין, פניטואין, פנוברביטל ופרימידון (תרופות מסוימות לטיפול בפרכוסים או באפילפסיה).
- תמצית של צמח ההיפריקום (St. John's wort) (תרופה צמחית לטיפול בדיכאון).
- וראפמיל ודילטיאזם (חוסמי בטא או חוסמי תעלות סידן מסוימים המשפיעים על ליבר).
- דיסופירמיד, רנולזין (תרופות מסוימות המסייעות לליבר להיות עמיד יותר לפעילות חשמלית לא תקינה, למשל חוסמי תעלות נתרן).
- טיקלופדין (תרופה למניעת שבץ והתקף לב).
- לטרמוביר (תרופה לטיפול ב-CMV).
- תרופות מסוימות למניעת היריון (אמצעי מניעה הורמונליים משולבים שאינם מכילים את השילוב של אתיניל אסטרדיול עם נוראתינדרון).
- פרדניזון (סטרואיד).
- מידזולאם (תרופה המשמשת להרגעה).
- רפגליניד, טולבוטמיד (תרופות מסוימות לטיפול בסוכרת).

שימוש בתרופה ומזון

נטילת קמזיוס עם מיץ אשכוליות עלולה להשפיע על רמות התרופה בדם ולהגביר את הסיכון לאי ספיקת לב. ניתן ליטול את קמזיוס עם או בלי אוכל.

היריון והנקה

היריון

אם את בהיריון או מתכננת להרות, יש להיוועץ ברופא טרם תחילת הטיפול בקמזיוס. קמזיוס עלולה לפגוע בעובר. דווחי לרופא מייד אם תהרי או אם את חושבת שיתכן שאת בהיריון במהלך הטיפול בקמזיוס.

אם את אישה ואת יכולה להרות:

- הרופא יבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול בקמזיוס.
- עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול בקמזיוס ובמשך 4 חודשים לאחר המנה האחרונה של קמזיוס.
- קמזיוס עלולה להפחית את היעילות של אמצעי מניעה הורמונליים מסויימים. שוחחי עם הרופא לגבי השימוש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול בקמזיוס.

הנקה

לא ידוע אם קמזיוס עוברת לחלב אם. אם את מניקה או מתכננת להניק, שוחחי עם הרופא על הדרך הטובה ביותר להאכיל את התינוק במהלך הטיפול בקמזיוס.

נהיגה ושימוש במכונות

לקמזיוס עלולה להיות השפעה מעטה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות. אם אתה מרגיש מסוחרר, אל תנהג או תשתמש בכלים או מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה נתרן פחות מ-1 מיליגרם (23 מיליגרם) למנה ונחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

התחלת הטיפול בקמזיוס ומהלך הטיפול יתבצעו תחת השגחתו של קרדיוולוג. יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

אין לשנות את המינון מבלי לשוחח עם הרופא תחילה. הרופא עשוי לשנות את המינון, להפסיק את הטיפול בקמזיוס באופן זמני או לצמיתות אם תסבול מתופעות לוואי מסוימות או אם אתה נוטל תרופות מסוימות.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- המינון ההתחלתי המומלץ הוא 5 מ"ג פעם ביום ללא קשר לאוכל.
- הרופא יעריך את תפקוד הלב שלך באמצעות בדיקות אקוקרדיוגרם (אקו לב) לפני המנה הראשונה ובמהלך הטיפול בקמזיוס על מנת להבין כיצד הלב שלך מגיב לטיפול. ייתכן שהמינון ישתנה במהלך הטיפול. המינונים האפשריים: 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 10 מ"ג או 15 מ"ג פעם ביום.
- המינון המקסימלי הוא 15 מ"ג ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

יש ליטול את קמזיוס פעם אחת ביום. ניתן ליטול את קמזיוס עם או בלי אוכל. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אין לשבור, לפתוח או ללעוס את הכמוסה, כיוון שאין מידע על שימוש בכמוסה באופן זה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, דבר מייד עם רופא או פנה מייד לבית חולים. קח איתך את אריזת התרופה ועלון זה.

אם שכחת מנה של התרופה

אם החמצת מנה של קמזיוס, עליך ליטול אותה בהקדם האפשרי באותו היום ואת המנה הבאה יש ליטול במועד המתוכנן הרגיל למחרת. אין ליטול 2 מנות באותו היום כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקמזיוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

• אי ספיקת לב. ראה סעיף "המידע החשוב ביותר שעליך לדעת על קמזיוס".
דווח לרופא או פנה לעזרה רפואית מייד אם אתה מפתח תופעות חדשות או חלה החמרה בתופעות הבאות:

- קוצר נשימה
 - כאב בחזה
 - תשישות
 - נפיחות ברגליים
 - תחושה של דפיקות לב (פלפיטציות)
 - עלייה מהירה במשקל
- אלו יכולים להיות סימנים שליבך לא מצליח להתכווץ בעוצמה מספקת, מצב שעלול להיות מסכן חיים ולהוביל לאי ספיקת לב.

תופעות לוואי אחרות כוללות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:
• סחרחורת

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100:
• עילפון

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי המגשית (הבליסטר) ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן מתחת ל 30°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

תכולת הכמוסה:

mannitol, croscarmellose sodium, silica colloidal hydrated, hypromellose, magnesium stearate.

מעטפת הכמוסה:

כמוסות של קמזיוס 2.5 מ"ג:

gelatin, titanium dioxide, black iron oxide, red iron oxide.

כמוסות של קמזיוס 5 מ"ג:

gelatin, titanium dioxide, yellow iron oxide.

כמוסות של קמזיוס 10 מ"ג:

gelatin, titanium dioxide, red iron oxide.

כמוסות של קמזיוס 15 מ"ג:

gelatin, titanium dioxide, black iron oxide.

דיו ההדפסה:

shellac, propylene glycol, strong ammonia solution, potassium hydroxide, black iron oxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קמזיוס 2.5 מ"ג: כמוסת ג'לטין בעלת ראש כמוסה אטום בצבע סגול בהיר עליו מוטבע בשחור "2.5 mg" וגוף כמוסה אטום בצבע לבן עליו מוטבע "Mava" בשחור.
קמזיוס 5 מ"ג: כמוסת ג'לטין בעלת ראש כמוסה אטום בצבע צהוב עליו מוטבע בשחור "5 mg" וגוף כמוסה אטום בצבע לבן עליו מוטבע "Mava" בשחור.
קמזיוס 10 מ"ג: כמוסת ג'לטין בעלת ראש כמוסה אטום בצבע ורוד עליו מוטבע בשחור "10 mg" וגוף כמוסה אטום בצבע לבן עליו מוטבע "Mava" בשחור.
קמזיוס 15 מ"ג: כמוסת ג'לטין בעלת ראש כמוסה אטום בצבע אפור עליו מוטבע בשחור "15 mg" וגוף כמוסה אטום לבן עליו מוטבע "Mava" בשחור.

קמזיוס מסופקת ככמוסות ארוזות במגשית (בליסטר) בגודלי האריזה הבאים:

אריזה המכילה 14 כמוסות.

אריזה המכילה 28 כמוסות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

בעל הרישום וכתובתו

בריסטול-מאירס סקוויב (ישראל) בע"מ,

רח' אהרון ברט 18 ת.ד. 3361,

קריית אריה,

פתח תקווה 4951448

יצרן וכתובתו

Bristol-Myers Squibb Company

Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, USA

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

קמזיוס 2.5 מ"ג: 174-18-37419-99

קמזיוס 5 מ"ג: 174-19-37420-99

קמזיוס 10 מ"ג: 174-20-37421-99

קמזיוס 15 מ"ג: 174-21-37422-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך ביולי 2024.