

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירטם) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

גנטוטרופין™ 12 מ"ג
אבקה וממס להכנת תמייסה להזרקה תת עורית.

עת מזרק של גנטוטרופין 12 מ"ג מכיל:
סומאטוטרופין רקומביננטי 12 מ"ג/ml ml/mg

לרשיימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים, ראה סעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה לך.

מה עלי לדעת בנוגע לגנטוטרופין?

- לפני השימוש בתרופה עליך לעמוד בדרך כלל אוף הכננת התרופה והזרקתה ע"י צוות רפואי מוסמך.

1. למה מיועדת התרופה?

בילדים:

- טיפול בבעיות גידילה בילדים הנגרמות על ידי אי-הפרשה או הפרשה לא מספקת של הורמון הגידילה מבולטות יותר מהמוח.
- בעיות גידילה עקב סינדרום טרנר.
- עיכוב גידילה בילדים עקב אי ספיקת כליתית.
- תסמונת פרדר-וילி (Prader-Willi syndrome).
- ילדים שנולדו קטנים לגיל ההריון (SGA).

במבוגרים:

- מבוגרים שסבלו מחוסר בהורמון גידילה מאז הילדות.
- מבוגרים הסובלים מחוסר בהורמון גידילה עקב בעיה בבולטות יותרת המות.

קבוצה טיפולית:
הורמון גידילה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- | |
|--|
| • אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6). |
| • אם יש לך גידול פעיל (סרטן). הגידול צריך להיות בלתי פעיל ועליך לסימן את הטיפול נגד הגידול לפני התחלת הטיפול עם גנטוטרופין. |
| • אם אתה סובל ממחלה קשה (לודגמה סיבוכים הנובעים מניטוח לב פתוח, ניתוח בטן, כשל נשימתית אקוטי, חבלה מקרית או מצביים דומים). אם עברת או אתה עומד לעבור הליך רפואי משמעוני, או שעלייך להתאשפז בבית החולים מכל סיבה, عليك לדוחך לרופא המתפל' שלך ולכל רופאי הנוספים שאתה מטופל בהורמון גידילה. |
| • לעידוד גידילה בילדים עם לוחיות גידילה (אפיפיזות) סגורות. |

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
ספר לרופא אם אחד מה הבאים מתיחס אליו:

- אם אתה בסיכון לפתח סוכרת, הרופא שלך ינטר את רמת הסוכר בדמרק במהלך הטיפול בגנטוטרופין.
- אם יש לך סוכרת גבוהה, עליך לנטר את רמת הסוכר בדמרק במהלך הטיפול בגנטוטרופין ולהתיעץ עם הרופא שלך לגבי צורך בהתאם מינון התרופות לטיפול בסוכרת.
- לאחר התחלת הטיפול בגנטוטרופין, יתכן שחלק מהחולים יצטרכו להתחילה טיפול בתחלפי הורמון בלבדות התריס.
- אם אתה מטופל בהורמוני בלבדות התריס, יתכן שייהי צורך בהתחמת מנת הורמוני בלבדות התריס שלך.
- אם אתה מטופל בהורמון גידילה על מנת לעודד גידילה, אתה צולע או אם התחלת לצולע במהלך הטיפול בהורמון גידילה בגלן כאבם בירך, عليك לידע את הרופא שלך.

- אם אתה מפתח לחץ תוך גולגתי מוגבר (עם תסמיים כגןocab ראש חזק, הפרעות בראייה או הקאה) עליך לידע את הרופא על כך.
- אם הרופא מאשר ש피תחת דלקת בשירים הסמוכים לאזור ההזרקה בשל החומר המשמר מטאקרטול, עליך להשתמש בתרופה ללא מטאקרטול.
- אם אתה מקבל גנטוטרופין בשל חוסר בהורמון גידילה הנובע מגידול קודם (سرطان), עליך לבדוק באופן סדרי להישנות של הגידול או כל סרטן אחר.
- אם אתה סובל מהחמרה בכאב בטני, עליך לידע את הרופא.
- קיימים מידע אודות טיפול בחולים מעל גיל 60 שנים. יתרון שקשישים יהו רגשיים יותר לפעולות של גנטוטרופין, וכן עשויים להיות בעלי נטייה גדולה יותר לפתח תופעות לוואי.

ילדים עם ספיקת כלות כרונית:

הרופא יבדוק את התפקוד הכליתי וקצב הגדילה לפני התחלת הטיפול בגנטוטרופין. יש להמשיך הטיפול הרפואי עבור המצב הכליתי. יש להפסיק את הטיפול בגנטוטרופין כאשר עוברים השתלת כליה.

ילדים עם תסמונת פרדר-וויל:

הרופא יניחה לבני תזונה מותאמת לשמנירה על המשקל. הרופא יבצע הערכה לנוכחות סימנים של חסימה בדרכי הנשימה העליונות, הפסיקת נשימה בשינה, או דיחום בדרכי הנשימה לפני התחלת הטיפול בגנטוטרופין.

אם במהלך הטיפול, מופיעים סימנים של חסימה בדרכי הנשימה העליונות (כולל התחלת או החמרה של נחירות), יש לבדוק ע"י הרופא. יתרון שהייה צריך בהפסקת הטיפול עם גנטוטרופין.

במהלך הטיפול, הרופא יבדוק האם קיימים סימנים של עקמתה, סוג של עיוות בעמוד השדרה.

אם במהלך הטיפול מתפתח ציהום בריאות, יש לידע את הרופא על מנת שיוכל לטפל ביוםdem.

ילדים אשר נולדו קטנה לגיל הבירין:

ילדים אשר נולדו קטנים לגיל הבירין (באורך או משקל), והם בין הגילים 12-9 שנים, יש לפנות לרופא לקבלת "יעוץ רפואי" עם תכשיר זה בגין התתגברות המינית. הרופא יבדוק את רמות הסוכר והאינסולין בدم לפני התחלת הטיפול ובכל שנה במהלך הטיפול. יש להמשיך טיפול עד שהגדילה הושלמה.

תగבות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת או מקבלת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במקרה אמ אתה לוקחת:

- תרופות לטיפול בסוכרת
- הורמוני בלוטת התריס
- קוורטיקוסטרואידים
- אסתרוגן הניתן דרך הפה או הורמוני מין אחרים
- ציקלוסופרין (תרופה המחלישה את מערכת החיסון לאחר השתלה)
- תרופות לטיפול באפיליפסיה (נוגדות פרקטיים, anticonvulsants)

"תכן שהרופא שלך יצטרך להתאים את המינון של תרופות אלה או את מינון הגנטוטרופין.

ażhorot:

- אם אתה נוטל טיפול גליקורטיקואיד חלפי, אנאattiיעץ עם הרופא שלך באופן קבוע כיוון שיتكن שהייה צורך בההתאמת מינון הגלוקורטיקואיד.

הירין והנקה

אין להשתמש בגנטוטרופין אם את בהירין, חושבת שיتكن שאת בהירין או מנסה להרotta. פניו לרופא לקבלת יעוץ לפני שימושו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחות מ 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה ולן נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או לרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן נטילת התכשיר.

המינון ואופן הטיפול "יקבעו ע"י" הרופא בלבד. התרופה מיועדת להזרקה תת עורית.

טרם השימוש הראשון עליך לעבורי הדרכה על אופן הכנת התרופה והזרקה על-ידי צוות רפואי מוסמך. מרבית המטופלים מזרקים לירך או לישבן. הזרק במקומות שבו הנחוו אותו הרופאה או האחות.

להוראות שימוש מפורטות ראה פרק "הוראות הכנה ושימוש בגנטוטרופין גו-קוויק 12 מ"ג".

עליך להזניק את התרופה באוזן שונה בגין מזרקה לזריקה.

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם נטلت בטעות מינון גבוה יותר

אם נטلت מנת יתר, או אם בטעות יلد בלע מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. רמת הסוכר בدم עלולה לרדת לרמה נמוכה מדי ובמהשך לעלות לרמה גבוהה מדי. אתה עלול להרגיש לא יציב, מזע, ישנו או "לא עצמן" ואותה עלול להתעלף.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח. הפסיקת התרופה פוגעת ביעילות הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנר זיקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגנטוטרופין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הללו, יתכן שלא תסבול מאי אחת מהן.

תופעות הלואן השכיחות מודע והשכיחות במובגרים יכולות להופיע במהלך החודשים הראשונים לטיפול ועשויות לחלוף מעצמן או עם הפחתת מינון התרופה.

תופעות לוואי שכיחות מודע (עשויות להופיע ביותר מ-1-מ-10 מטופלים):

במבוגרים:

- כאב מפרקיים.
- אצירת מים (אשר מתבטאת באצבועות נפוחות, או קרסולים נפוחים).

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע بعد-1-מ-100 מטופלים):

בילדים:

- כאב מפרקיים.
- אדמומיות, עקצוץ או כאב חולפים באוזן ההזרקה.

במבוגרים:

- חוסר תחושה/עקבוצז.
- תחושת כאב או שריפה בידים או בבית השחי (تسمונת מנחרת שורש כף היד, Carpal Tunnel Syndrome).
- נזקשות בזרועות וברגליים, כאב שרירים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע بعد-1-מ-100 מטופלים):

בילדים:

- לוקמיה (דוח במספר קטן של מטופלים עם מחסור בהורמון גידלה, חילוק טופלו עם סומאטרופין. עם זאת, אין הוכחה לכך שיש עלייה בשכיחות הלוקמיה במטופלים ללא גורמי Sicron המקבילים הורמון גידלה).
- לחץ תוך גולגולתי מוגבר (גורם לתסמינים כגון כאב ראש חזק, הפרעות בראיה או הקאה).
- חוסר תחושה/עקבוצז.
- פריחה.
- גרד.
- בליטות מוגדרות על פני העור.
- כאבי שרירים.
- חזזה מוגדל (גנוקומסטיה).
- אצירת מים (אשר מתבטאת באצבועות נפוחות או קרסולים נפוחים לפרק זמן קצר בתחילת הטיפול).

במ滂יגרים:

- חזה מוגדל (אגניקומוסטיה).

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה, לא ניתן להעריך את השכיחות המהמידע הקיימן:

- סוכרת סוג 2.
- נפיחות בפנים.
- **כאב ראש**
- ירידת ברמות ההורמון קורטיזול בדם.

בילדים:

- נוקשות בזרועות וברגליים.

במ滂יגרים:

- לחץ תוך-גולגולתי מוגבר (הגורם לתסמיינים כגון כאב ראש חזק, הפרעות בראין או הקאה).
- פריחה.
- גרד.
- בליטות מגדרות על פני העור.
- אדמומיות, עקצוץ או כאב באזור ההזרקה.

היווצרות נוגדים כנגד הורמון הגידילה המזרק, אולם נראה כי אלה אינם מונעים את השפעת ההורמון הגידילה. חספוא או גושים בעור שבאזור ההזרקה, ניתן למנועם באמצעות מזרקים במיקום שונה בכל הזרקה.

תופעת לוואי נדירה מאוד יכולה להופיע בגלל נוכחות החומר המשמר, מטאקרטול, היא דלקת של שריר באזורי ההזרקה. אם הרופא מאשר שיש לך תופעת לוואי זו, יש להשתמש בתרופה ללא מטאקרטול.

מקרים נדירים של מותות פתאומיות תוארו במטופלים עם תסמונת פרדר-ויל, אך לא הוכח קשר בין מקרים אלו והטיפול בגנטוטרופין. אם חשת אי נוחות או כאב בירך או בברך במהלך הטיפול בגנטוטרופין הרופא עלול לחשוד בהחלקת ראש עצם הירך (Slipped Capital Femoral Epiphysis) או מחלת פרטוס (Legg Calve Perthes disease) או מחלת פרטוס (Capital Femoral Epiphysis).

תופעות לוואי נוספות שייתכן שקשירות לטיפול של ההורמון גידילה הינה: רמות סוכר גבוהות בדם, רמות נמוכות של ההורמון בלוטת התריס - הרופא עשוי לשלוות אותך לבצע בדיקות ובמידת הצורך, ניתן לך טיפול מתאים. לעיתים מדירות דוחה על דלקת של הלבלב במטופלים הנוטלים ההורמון גידילה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למישר משרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות www.health.gov.il (הפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>)

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן לפני ערבות האבקה והמסם (המסה):
יש לאחסן במקסר (2°C - 8°C) ולהגן מפני אור.

לפני הפתיחה: ניתן להוציא את התכשיר מהמקסר, ללא החזרתו, לתקופה מקסימלית של חודש אחד בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C אך לאחר מכן יש להשליכו למכיל האשפה המיועד לכך.

אין להקפיו! אם התכשיר קופא – אין להשתמש בו.

אחסן לאחר ערבות האבקה והמסם (המסה):

יש לאחסן במקסר (2°C - 8°C) עד 28 ימים, יש להגן מפני חלופין, ניתן לאחסן עד לשעתים, פעמיים ביום, מחוץ למקסר בטמפרטורת החדר (עד 25°C) מוגן מואר, עד 28 ימים הערבות במסגרת חי' המדף של התכשיר.

אין להקפיו! אם התכשיר קפא – אין להשתמש בו.

אין להשתמש בתכשיר אם התמיסה עכורה או נראים בה חלקיקים.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

האבקה:

mannitol, glycine, sodium dihydrogen phosphate anhydrous, disodium phosphate anhydrous.

הממס:

water for injection, mannitol, metacresol.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

כל אריזה מכילה עט מוקן מראש, שמצירר המשנה פעמי אחד בתחילת השימוש בעט חדש.

כפתור ההזרקה בעט גנטופרין 12 מ"ג עט מוקן מראש (GoQuick) הינו סגול.

בעל הרישום וכותבתו: פייזר פרמצטטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

gentropin 12 מ"ג: 121.35.27540.22

לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון זכר. אף על זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש בגנטופרין גו-קוויק 12 מ"ג

נא לקרוא את ההוראות במלואן טרם השימוש בעט גנטופרין גו-קוויק.
אם יש לך שאלות בנוגע למינון או לטיפול שלך עם גנטופרין, פנה לרופא או לאחות.

אוזות גנטופרין גו-קוויק

גו-קוויק הינו עט רב מנתן, במילוי חד פעמי לשימוש חוזר להזרקה, המכיל 12 מ"ג סומאטופרין. העט מתאים להזרקת מנות מ- 0.3 מ"ג עד 4.5 מ"ג גנטופרין. כל נקישה של הטבעת השחורה משנה את המנה ב- 0.15 מ"ג.

הגנטופרין שבעט מומס פעמי אחת בלבד, בתחילת השימוש בעט חדש.
אין צורך להחליף מחסניות. כאשר העט מתוקן עליך להתחיל להשתמש בעט חדש.
העט מצוי בזיכרון mana. המנה נקבעת פעמי אחת עבור כל עט חדש. לאחר מכן העט מאפשר לך לשאוב את אותה mana קבועה בכל הזרקה. הדבר ימנע שאיבת כמות העולה על המנה שנקבעה

מידע חשוב

- אין להמיס את האבקה עם הנזול בעט אלא אם המחת מחוברת לעט.
- אין לאחסן את העט עם המחת מחוברת אליו. הגנטופרין עלול לדלוף מהעט ובוואות אוויר עלולות להיווצר במחסנית. יש תמיד להסיר את המחת ולהחבר את מכסה העט או את המכסה של מסתיר המחת טרם האחסון.
- יש להיזהר שלא להפיל את העט. אם העט נפל וחלק כלשהו נראה שבור או פגום, אין להשתמש בעט. פנה לרופא או לאחות לקבלת עט אחר. אם העט נפל והוא לא שבור, עליך לבצע איתחול נוסף כמפורט בסלב 6 (בסעיף הכתנת עט גו-קוויק חדש ושימוש בו).
- יש לנוקוט את העט במטלית לחחה. אין להכניס את העט למים.
- יש להשתמש תמיד במחט חדשה לכל הזרקה. אין לחלק את מחטי העט.
- מד (סקלה) הנפח הנותר אשר מצד מחזק המחסנית, מראה את הנפח של גנטופרין שנותר בעט.

טרם התחלה השימוש בגו-קוויק:

- עליך לעבור הדרכה על-ידי צוות רפואי.
- עליך לדעת מהו המינון שלך. עליך להכיר את חלקיו העט.
- עליך לוודא שיש בידך את העט בעל כפטור ההזרקה הסגול.

אחסון והשלכה

אחסון מפני האבקה והמים (המשך):

יש לאחסן במקרר (2°C - 8°C) ולהגן מפני אור.

לפני הפעילה: ניתן להוציא את התכשיר מהמקרר, ללא החזרתו, לתקופה מקסימלית של חודש אחד בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C אך לאחר מכן יש להשליכו מכל האשפה המיועד לכך.

אין להזכיר את התכשיר קפא – אין להשתמש בו.

אחסון לאחר ערבוב האבקה והמים (המשך):

יש לאחסן במקרר (2°C - 8°C) עד 28 ימים, יש להגן מואר. לחילופין, ניתן לאחסן עד לשעתיים, פעם ביום, מחוץ למקרר בטמפרטורת החדר (עד 25°C) מוגן מואר, עד 28 ימים מיום הערבוב (המשך) במסגרת ח'י המדף של התכשיר.


אין להזכיר את התכשיר קפא – אין להשתמש בו.

אין להשתמש בעט לאחר תאריך התטוגה.

יש להשליך (לפנות) את העט 28 ימים לאחר המהילה, גם אם נותרה בו תרופה.

עליך לפעול לפי חוקי הבריאות והבטיוחות המקומיים בעת השלכת (פינוי) העט. שאל את הרופא או האחות אם אין בטוח לגבי אופן ההשלכה.

חלק עט גו-קוויק



איור:

סגול	כפטור ההזרקה	ציר שחזור	ציר שחזור	חרץ	חלון הזיכרון	אבקה	מחזיק המחטן	סגול
חווגה אפורה	סגול	לזגו	לזגו	נוול	סקלט הנפה	מכסה לבן	מכסה לבן	חווגה אפורה

מפתח (אינה כלולה)	מפתח (מוספק בנפרד) עם מגן מפתח משוחרר							
מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט	מכסה המחט
החיצוני	הפנימי	אטם ניר	מכסה שחזור					

מחטי העט **אין כלולות** באירועת העט גו-קוויק. תצטרכ לחשיג מחטי עט באורך של עד 8 מ"מ מבית המרכיבת.

- מחטים לשימוש עם עט גו-קוויק:

- 31G or 32G (Becton Dickinson and Company)
- 31G or 32G (Novo Nordisk®)
- 32.5G or 34G (Terumo)


הכנת עט גו-קוויק חדש ושימוש בו

שלב 1 הכנה




- רץ ונגב את ידך.
- הנח את האביזרים הבאים על משטח נקי וישראל:
 - עט גו-קוויק חדש
 - מחת חדשה (אינה כלולה)
 - מכל מתאים לפינוי פסולת חדה (אינו כלול).
- **בדוק את תאריך התפוגה על תווית העט. אין להשתמש בעט אם תאריך התפוגה שלו חלף.**

שלב 2 בחירת מקום ההזרקה



- בחר ונקה את מקום ההזרקה לפי המלצת הרופא או האחות. בחר מקום שונה לכל הזרקה. יש לחת כל זריקה חדשה במרחב של לפחות 2 ס"מ מהמקום בו השתמש בעבר.
- הימנע מאזורים גרמיים, חבולים, אדומיים, פצעיים או קשים, ומאזור עור בהם ישן צלקות או הפרעות עוריות.


שלב 3 חיבור מחת חדשה



- הסר את המכסה הלבן מהעט במשיכה.
- קח מחת חדשה והסר את אTEM הננייר.
- לחץ בעדינות ובהברג את המחת אל העט. אין להדק יתר על המידה.
- **הערה:** היזהר שלא לחבר את המחת בזווית. הדבר עלול לגרום לדילפה מהעט.
- השאר את שני מכסי המחת על המחת.

שלב 4. המשט הגנטוטרופין


מצב A סובב בחזקה מצב B



- אחוז בעט כר שקצת המחט פונה כלפי מעלה והאות "A" כלפי.
- סובב בחזקה את מחזיק המחסנית לתוכה עד אשר האות "B" תיכנס לתוך החalice ותשמע נקישה.
- הטה בעדינות את העט מצד לצד לצורך המסעה מלאה של האבקה. אין לנער את העט. ביעור עלול לגרום בהורמון הגדילה.
- ודא כי הנזול שבמחסנית שkopf וכל האבקה התמוססה.
- אם הנזול עכור או אם ישנה אבקה הנראית לעין את העט בעדינות מצד לצד מספר פעמים נוספת.
- אם הנזול עדין עכור או אם ישנה אבקה הנראית לעין אין להשתמש בעט. נסהשוב עם עט חדש.


שלב 5 סילוק האוור מהעט

מצב C סובב בחזקה משוחרר



- הסר את מכסה המחט החיצוני במשיכה. שמור אותו לצורך הסרת המחט לאחר ההזרקה.
- להשאר את מכסה המחט הפנימי על המחט.
- הערה: אתה-Amor לראות את מכסה המחט הפנימי לאחר הסרת מכסה המחט החיצוני. אם אין רואת אותו, נסה לחבר את המחט שוב.
- אחוז בעט כר שקצת המחט פונה כלפי מעלה.
- הקש בעדינות על מחזיק המחסנית כדי לעזור בהזנת האויר הלכוד כלפי מעלה.
- סובב בחזקה את מחזיק המחסנית לתוכה עד אשר האות "C" תיכנס לתוך החalice ותשמע נקישה.
- יתכן שיופיע נזול סביב מכסה המחט הפנימי. זהו תופעה נורמלית.

שלב 6 איתחול העט



האיתחול מסלק את האויר הנוטר על ידי דחיפת כמות נזול קטנה החוצה מתוכן העט. מנת האיתחול היא 0.3 מ"ג והוא שונה מהמנה שנרשמה לרעל ידי הרופא.

עליך לאותל את העט רק במועד השימוש הראשוני.


- הסר את מכסה המחת הפנימי במשיכה והשלך אותו.
- **זהירות:** אין לגעת במחט כדי להימנע מדקירת מחט.

- ודה שהמנה 0.3 מ"ג נקבעה בחילון הזיכרון.
- סובב את החוגה האפורה בכיוון החיצים עד שהיא מפסיקה לנוקש

- אחיז בעט כר שהמחת פונה ישר כלפי מעלה.
- לחץ על כפטור ההזרקה הסגול עד הסוף פנימה.
- בדוק אם מופיע נזול בקצה המחת. במידה וכן, העט אותחל.
- אם לא מופיע נזול, חזור על שלבי האיתחול עד פעמיים נוספות.
- אם עדין לא מופיע נזול, אין להשתמש בעט. פנה לרופא או לאחות ליעוץ.

שלב 7 קביעת המינון ושאייבתו

סובב את החוגה האפורה סובב את הטבעת השחורה




- במועד השימוש בעט בפעם הראשונה, תקבע את המינון שנרשם על ידי הרופא או האחות.
- אין צורך לקבוע את המינון שוב עד אשר תתחילה להשתמש בעט חדש, או בהתאם להוראת הרופא או האחות.
- **סובב את הטבעת השחורה נגד כיוון השעון** עד אשר המינון שנרשם לרעל יופיע בקן ישר עם החץ הלבן בחילון הזיכרון. היזהר שלא **סובב את החוגה האפורה**.
- אם סובבת את המינון מעבר לחץ הלבן, סובב את הטבעת השחורה חוזרת לצורך קביעת המינון הנכון.

הערה: אם איןך יכול לסובב את הטבעת השחורה, לחץ על כפטור ההזרקה הסגול עד שהוא מפסיק לנוקש. לאחר מכן המשך לכונן את המינון שוב. שים לב ליציאת נוזל מיותר מהمطلوب.

- סובב את החוגה האפורה בכיוון החיצים עד שהחוגה מפסיקת לנוקש.


שלב 8 בדיקת המנה



- המנה שעל הציר השחור, צריכה להופיע בכו' ישר עם החץ הלבן.
- וודא שהמנה שנשאה, המצינית על הציר השחור זהה למינון שנקבע בחילון הדיכרון.
 - אם המנות תואמות העט מוכן להזרקה.
 - אם המנות אינן תואמות, וודא שסובבת את החוגה האפורה בכיוון החיצים עד שהוא מפסיקת לנוקש.


שלב 9 מתן זריקת גנטוטרופין

המתן	הזרק	החדר
Insert	Inject	Wait



- אחיז בעט מלל למקום ההזרקה.
- החדר את המחת ישירות לתוך העור.
- לחץ על כפטור ההזרקה הסגול כלפי מטה עד שהוא מפסיק לנוקש.
- המתן 5 שניות מלאות כדי להבטיח הזרקה של המנה במלואה. המשך בלחיצה קלה על כפטור ההזרקה הסגול תוך כדי הספירה.
- לאחר 5 שניות, הוציא את המחת מתוך העור במישcieה.
- הערה: אם אתה רואה טיפות נוזל במקום ההזרקה או בקצת המחת, בהזרקה הבאה נסה ללחוץ על כפטור ההזרקה הסגול במשך פרק זמן ארוך יותר טרם משיכת המחת מתוך העור.

שלב 10 הסרת המחת



- כסה בזיהירות את המחת

במכסה המחת החיצוני.

- זהירות: אין לגעת במחת כדי להימנע מדקירת מחת.
- השימוש במכסה המחת להסרת המחת באמצעות סיבוב.
 - השלך את המחת מכל מתאים לפינוי פסולת חדה.
 - כסא את העט במכסה הלבן בלחיצה.
 - אחסן את העט במקרר עד להזרקה הבאה.


שימוש שגרתי (יומיומי) בעט גו-קוויק

שלב 1 הכנה




- רץ ונגב את ידר.
- הניח את האביזרים הבאים על משטח נקי וישראל:
 - עט גו-קוויק שכבר עורבב
 - מחת חדשה (אינה כוללה)
 - מכל מתאים לפינוי פסולת חדה (אינו כולל).
- בדוק את תאריך התפוגה על תווית העט. אין להשתמש בעט אם תאריך התפוגה שלו חלף.
- אין להשתמש בעט מעבר ל- 28 ימים לאחר השימוש הראשון.

שלב 2 בחירת מקום ההזרקה




- בחר נקיה את מקום ההזרקה לפי המלצת הרופא או האחות. בחר מקום שונה לכל הזרקה. יש לחת כל זריקה חדשה במרקם של לפחות 2 ס"מ מהמקום בו השתמש בעבר.
- הימנע מאזוריים גרמיים, חboldים, אדומים, פצעיים או קשיים, ומאזורים עור בהם ישן צלקות או הפרעות עוריות.

שלב 3 חיבור מחת חדשה



- **הסר את מכסה הלבן מהעט במשיכת.**
- **קח מחת חדש והסר את אטם הנייר.**
- **לחץ בעדינות והברג את המחת אל העט. אין לבדוק יתר על המידה.**
- **הערה: היזהר שלא לחבר את המחת בזווית. הדבר עלול לגרום לדילפה מהעט.**
- **הסר את שני מכסים המחת.**
- **שמור את מכסה המחת החיצוני לצורך הסרת המחת לאחר ההזרקה.**


שלב 4 שאיבת המנה בדק סובב את החוגה



- **סובב את החוגה האפורה בכיוון החצים עד שהוא מפסיק להנוקש. המנה שעל הציר השחור צריכה להופיע בקן ישר עם החץ הלבן.**


- **ודא שהמנה שנשאה, המצוינת על הציר השחור זהה למים שנקבע בחולון הזיכרון.**
 - **אם המנות תואמות, העט מוכן למתן הזריקה.**
- הערה:** אם המנה שנשאה קטנה יותר, העט אינו מכיל מנתה מלאה של גנטוטרופין. פועל לפני הוראות הרופא או האחות לגבי הפעולה שעליך לבצע כאשר העט אינו מכיל מנתה מלאה, או פנה לרופא או לאחות ליעוץ.

שלב 5 מתן זריקת גנטוטרופין המתן הזרקן החדר



- אחוז בעט מעל מקום ההזרקה.
 - החדר את המחט ישירות לתוך העור.
 - לחץ על כפטור ההזרקה הסגול כלפי מטה עד שהוא מפסיק לנוקosh.
 - המתן 5 שניות מלאות כדי להבטיח הזרקה של המנה המלאה. המשך בלחיצה קלה על כפטור ההזרקה הסגול תוך כדי הספירה.
 - לאחר 5 שניות, הוציא את המחט מתוך העור במשיכה.
- הערה: אם אתה רואה טיפות נזול במקום ההזרקה או בקצת המחט, בהזרקה הבאה נסה ללחוץ על כפטור ההזרקה הסגול במשך פרק זמן אורך יותר טרם משיכת המחט מתוך העור.

שלב 6 הסרת המחט



- כסה בזהירות את המחט במכסה המחט החיצוני.
- זהירות: אין לגעת במחט כדי להימנע מדקירת מחט.
- השתמש במכסה המחט להסרת המחט באמצעות סיבוב.
- השליך את המחט למכל מתאים לפנוי פסולת חדה.
- כסה את העט במכסה הלבן בלחיצה.
- אחסן את העט במקרר עד להזרקה הבאה.

שימוש במסתיר המחט (אופציונלי)

מסתיר המחט הוא אביזר אופציונלי המסופק בנפרד ומשמש להסתרת המחט במהלך ההזרקה.

חיבור מסטיר המחט:
חבר את מסטיר המחט לאחר שלב 5 (בסעיף הcnת עט גו-קוויק חדש ושימוש בו) למנועת דקירת מהט.


הסר את המכסה השחור מסטיר המחט במשיכה.

- אם מגן המחט מחליק החוצה, החזר אותו לתוך מסטיר המחט בלחיציה עד אשר הוא יינעל בנקישה.

מקם את הלוגו השחור על מסטיר המחט בקז אחד עם הלוגו סגול על העט. לחבר את מסטיר המחט לעט בלחיציה זהירה עד אשר הוא יינעל בנקישה.

לאחר שלב 6 (בסעיף הcnת עט גו-קוויק חדש ושימוש בו), לחץ על

הכפטור השחור לשחרור מגן המחט שבמסטיר המחט.
פעל לפיה ההוראות כמפורט משלב 7 (בסעיף הcnת עט גו-קוויק חדש ושימוש בו).



להסרת המחט כאשר מסטיר המחט מחובר לעט:

חבר את מכסה המחט החיצוני לקצה של מגן המחט.


השתמש במכסה המחט החיצוני לדחיפת מגן המחט פנימה עד אשר הוא יינעל במקומו.

השתמש במכסה המחט להסרת המחט באמצעות סיבוב והשלך (פנה)

אותה למכל מתאים לפינוי פסולת חדה.

השאר את מסטיר המחט על העט.

חבר את המכסה השחור אל מסטיר המחט. אחסן את העט במקרר.



להסרת מסטיר המחט:

- תחילה הסר את המחט, לאחר מכן הסר את מסטיר המחט מהעט במשיכה עדינה.

- אין להשליך את מסטיר המחט. הוא ניתן לשימוש עם העט הבא.

9

עודכן ב 08/2024.