

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

מייבנקלאד 10 מ"ג

טבליות

החומר הפעיל:

כל טבלייה מכילה קלדריבין 10 מ"ג (cladribine 10 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העלון עד סוף בטטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. בוגוסל לעלון, לתכשיר מייבנקלאד קיימים מדריך למטופל. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעלייך לדעת לפני התחלה הטיפול ובמהלך הטיפול במייבנקלאד ולפערול על פיו. יש לעיין במדריך למטופל ובעלון לצרcn בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמר את המדריך לעיון נוספת במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה

מייבנקלאד מיועד לטיפול במוגרים עם טרשת נפוצה התקפית פעילה מאוד. קבוצה רפואיית (טיפולית): מdice סלקטיבי של מערכת החיסון.

טרשת נפוצה היא מחלת שבה דלקת הורסת את המערכת המגן מסביב לעצבים. מייבנקלאד מכיל את החומר הפעיל קלדריבין, חומר ציטוטוקס (הורג תאים) הפועל בעיקר על לימפוציטים (תאים של מערכת החיסון המעורבים בדלקת). טיפול עם מייבנקלאד הראה הפחתה בהתקלחויות של תסמים והאטיה בהתקדמות הנכות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קלדריבין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6)
- אתה נשא HIV, כלומר אתה נגע בנגיף הכספי החיסוני האנושי (HIV)
- יש לך שחפת פעילה או דלקת כבד (הפטיטיס)
- יש לך מערכת חיסון מוחלשת כתוצאה ממצב רפואי או בגלל **נטילת תרופות אחרות המחלישות את מערכת החיסון או מפחיתות את ייצור תאי הדם במח העצם** כולל:
 - ציקלוספורין, ציקלופוספאמיד ואזטאייפרין (המשמשים לדיכוי מערכת החיסון, למשל לאחר השתלת איברים)
 - מתוטרקסאט (המשמש לטיפול במצבים כמו פסורייזיס או דלקת מפרקים שגרונית)
 - קוורטיקוסטרואידים ארוכי טוח (המשמשים להפחחת דלקת, למשל באסתמה)
 ראה גם סעיף "tagobot בין תרופתיות"
- יש לך סרטן פעל
- יש לך בעיות מתונות או חמורות בכליות
- **את בהירין או מניקה (ראי גם סעיף "הירין והנקה")**

אם איןך בטוח אם אחד מהן'ל חל עלייך, אל טיפול מייבנקלאד ופנה לרופא או לרוקח.

اذירות ואמצעי זהירות מיוחדים הנוגעים לשימוש בתרופה

ziehominim

אתה תיבדק לראות אם יש לך זיהומיים כלשהם לפני התחלה טיפול עם מייבנקלאד. חשוב לדבר עם הרופא אם אתה חושב שיש לך זיהום. הם עשויים להיות חמורים ואףלו מסכני חיים. תסמיini זיהום יכולים לכלול חום, כאב, כאב שרירים, כאב ראש, הרגשה כללית לא טובאה או הצהבה של העיניים. הרופא עשוי לדוחות את הטיפול להפסיקו עד שהזיהום יחלוף.

אם נדרש, אתה תחוון כנגד שלבket חוגרת לפני התחלת הטיפול. יהיה לך לבחות בין 4 ל-6 שבועות עד שהחיסון יתחל לפעול. **ספר לרופא מיד אם יש לך תסמיינים של שלבket חוגרת**, סיבוך נפוץ של מייבנקלאד (ראה סעיף 4), אשר עשוי להזכיר טיפול ספציפי.

דלקת מוח נגיפית (PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy) היא מחלת נגיפית הנגרמת על ידי זיהום בז'ירוז, קשי דיבור או תקשורת, דבר עם הרופא בהקדם האפשרי. אליהם יכולים להיות תסמיינים של הפרעה נדרה במוח הנגרמת על ידי זיהום ונקראת דלקת מוח נגיפית (PML). דלקת מוח נגיפית היא מצב חמור העולם להוביל לנכות חמורה או מוות. למורות של דלקת מוח נגיפית לא צפתה עם מייבנקלאד, אמצעי זהירות, **יתכן שתצטרך MRI ראש** (דימות באמצעות תהודה מגנטית) לפני התחלת הטיפול.

سرطان מיריעים בודדים של סרטן נצפו במטופלים אשר קיבלו קלדריבין במחקר קליניים. דבר עם הרופא אם היה לך בעבר סרטן. הרופא יחליט מהי אפשרות הטיפול הטובה ביותר בגין עבורה. אמצעי זהירות, עליך לעקוב אחר המלצות הסטנדרטיות לאיתור סרטן, כפי שהומלץ על ידי הרופא.

בעיות בכבד מיבנקלאד עשוי לגרום לביעות בכבד. **ספר לרופא לפניו נטילה של מייבנקלאד אם יש לך או אין לך בעבר בעיות בכבד**. ספר לרופא שלך באופן מיידי אם אתה מפתח אחד או יותר מהتسمינים הבאים: תחולת בחילה, הקאות, כאבי בטן, עייפות, אובדן תיאבון, עור או עיניים צהובות (צחבת) או שtan כהה. אלה יכולים להיות תסמיינים של בעיותכבד חמורות.

אמצעי מניעה על גברים ונשים להשתמש באמצעי מניעה ייעילים במהלך הטיפול ולמשך לפחות 6 חודשים לאחר המנה האחונה. זה חשוב מאחר שמייבנקלאד עשוי להזיק לתינוק באופן חמור. ראה גם סעיף "הירון והנקה".

עירוי דם אם אתהzekוק לעירוי דם, ספר לרופא שאתה נוטל מייבנקלאד. **יתכן שתצטרך לקבל דם שעבר הקרינה על מנת למנוע סיבוכים**.

שינוי בטיפול אם אתה מחליף טיפול אחר לטרשת נפוצה במייבנקלאד, הרופא יבודק שספירת תא הדם (לימפוציטים) תקינה לפני תחילת הטיפול. אם אתה מחליף מייבנקלאד בטיפול אחר לטרשת נפוצה, דבר עם הרופא. יכול להיות שתהיה חפיפה בהשפעה על מערכת החיסון.

ילדים ותבגרים השימוש במייבנקלאד אינו מיועד למטופלים מתחת לגיל 18. התרופה לא נבדקה בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב יהיה לך לבצע בדיקות דם לפני תחילת הטיפול על מנת לבדוק שאתה יכול ליטול מייבנקלאד. הרופא יבצע בדיקות דם גם במהלך ולאחר הטיפול כדי לבדוק שאתה יכול להמשיך ליטול מייבנקלאד, ושאתה לא מפתח סיבוכים כלשהם כתוצאה מהטיפול.

תגובהות בין תרופתיות אם אתה לוקחת או אם לך תרופה אחרת כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אל תתחיל להשתמש במייבנקלאד יחד עם תרופות המחלישות את מערכת החיסון או מפחיתות את הייצור של תא דם על ידי מה העצם. זה כולל:

- ציקלוספורין, ציקלופוספאמיד ואזטאיופרין (המשמשים לדיכוי מערכת החיסון, למשל לאחר השתלת איברים)
- מתוטרקסאט (המשמש לטיפול במקרים כמו פסורייזיס או דלקת מפרקים שגרונית)

- קורטיקוסטרואידים ארוכי טווח (המשמשים להפחחת דלקת, למשל באסתמה). ניתן לשימוש בקורטיקוסטרואידים קצר טווח אם הומלץ על ידי הרופא.

אל תשתמש במיבנקלאד יחד עם תרופות אחרות לטרשת נפוצה, אלא אם הומלץ מפורשות על ידי הרופא.

אל תיטול מיבנקלאד באותו זמן יחד עם **תרופות אחרות**. השאר רוח של **פחות 3 שעות** בין נטילת מיבנקלאד ותרופות אחרות הנלקחות דרך הפה. מיבנקלאד מכיל hydroxypropylbetadex אשר עלול ליצור אינטראקציה עם תרופות אחרות בקיבה.

ספר לרופא אם אתה מטופל או טיפול בעבר עם:

- תרופות העוללות להשפיע על תא הדם (לדוגמה קארבאמאזפין, המשמש לטיפול באפילפסיה). יכול להיות שהרופא יצרך לבצע מעקב צמוד יותר.
- **סוגים מסוימים של חיסונים** (חיסונים חיים או חיסום מוחלשים). אם חוסנת במהלך 6-4 השבועות האחרונים, יש לדחות את הטיפול במיבנקלאד. אין לקבל חיסונים כאלו במהלך הטיפול במיבנקלאד. על המערכת החיסונית להתואוש לפני שתוכל להתחסן, זה יבדק על ידי בדיקות דם.
- **דילאזף, ניפדי芬, נימודיפין, חזרפיין, צילואטازול או סולינידק** (המשמש לטיפול לבב, לחץ דם גבוה, מחלות או דלקות בכלי הדם) או אלטרומבופאג (המשמש לטיפול במצבים הקשורים בדימומיים). הרופא יאמר לך מה לעשות אם אתה צריך לטול תרופות אלו.
- **ריפאמיצין** (המשמש לטיפול בסוג זיהום מסוימים), היפריקום (סנט ג'ונס וורט) (המשמש לטיפול בדיכאון) או קורטיקוסטרואידים (המשמשים לדיכוי דלקות). הרופא יאמר לך מה לעשות אם אתה צריך לטול תרופות אלו.

הירiox והנקה

אין ליטול מיבנקלאד אם אתה בהירiox או מנסה להכנס להירiox. זה חשוב מאחר שמייבנקלאד עלול להזיק לתינוק באופן חמוץ.

עליך לשימוש **באמצעי מניעהיעלים** על מנת להימנע מכניסה להירiox במהלך הטיפול במיבנקלאד ובמשך 6 חודשים לאחר נטילת המנה האחורונה. אם את נכנסה להירiox יותר מ-6 חודשים לאחר המנה האחורונה בשנה הראשונה, לא צפוי סיכון בטיחותי אך לא תוכל לקבל טיפול עם מיבנקלאד בזמן ההירiox.

גברים חייבים לשימוש **באמצעי מנעהיעלים** על מנת למנוע כניסה להירiox של בת הזוג, בזמן הטיפול עם מיבנקלאד ולמשך 6 חודשים לאחר המנה האחורונה. הרופא ייעץ לך בנוגע למתקנים.

אין ליטול מיבנקלאד אם את מניקה. אם הרופא סבור כי מיבנקלאד הוא חיוני עבורך, הרופא ייעץ לך להפסיק להניקה במהלך הטיפול ולפחות שבוע לאחר המנה האחורונה.

נהיגה ושימוש במכונות
מייבנקלאד לא צפוי להשפיע על יכולתך לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה 64 מ"ג סורביטול בכל טבלייה.

3. כיצד לשימוש בתרופה

תמיד יש לשימוש בתכשיר זה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק זאת עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל מפורט להלן.

מחזרי הטיפול

אתה תקבל מיבנקלאד בשני מחזרי טיפול במשך שנתיים.
כל מחזר טיפול כולל טיפול של שני שבועות, בהפרש של חודש בתחילת כל שנה טיפולית.
שבוע טיפול כולל 4 או 5 ימים שבהם תקבל 1 או 2 טבליות כל יום (ראה טבלה 1).
לדוגמא: אם אתה מתחילה את הטיפול באמצעות אפריל, עליך ליטול את הטבליות כפי שמופיע להלן:

שנה 2				שנה 1			
שבוע ראשון של הטיפול		שבוע שני של הטיפול		שבוע ראשון של הטיפול		שבוע שני של הטיפול	
טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע אפריל	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע מאי	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע יידחה.	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע שנותיים, הרופא ימשיך לעקב אחר מצב בריאותך לפחות שנתיים נוספת, שבhn אתה לא צריך ליטול את התroxpa.	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע אפריל	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע מאי	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע יידחה.	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע שנותיים, הרופא ימשיך לעקב אחר מצב בריאותך לפחות שנתיים נוספת, שבhn אתה לא צריך ליטול את התroxpa.

לפני התחלת מחזור טיפול, הרופא יבצע בדיקות דם לבדק שרמות הלימפוציטים (סוג של תא דם לבנים) הם בטוח המקובל. אם זה אינו המצב, הטיפול ידחה.
ברגע שהשלמת שני מחזורי טיפול במשך שנתיים, הרופא ימשיך לעקב אחר מצב בריאותך לפחות שנתיים נוספת, שבhn אתה לא צריך ליטול את התroxpa.

מינון

1. מספר הtablיות הנכון עבור כל שבוע טיפול ירשם לך, בהתבסס על משקל גופך כפי שמוצג בטבלה 2.
2. אתה תצטרך אריזה אחת או יותר על מנת לספק את מספר הtablיות הנכון.
3. כאשר אתה מקבל את התroxpa, בדוק שיש לך את מספר הtablיות הנכון.
4. מצא את השורה שמתאימה למשקל גופך (בק"ג) בעמודה הימנית בטבלה 2, ולאחר מכן בדוק את מספר הtablיות שצריך להיות באrizah/ות עבור שבוע הטיפול שאוטו אתה מתחילה.
5. אם מספר הtablיות באrizah/ות שקיבלת שונה מהמספר המוצג בטבלה עבור המשקל שלך, דבר עם הרופא.
6. שים לב שעבור טוויחי משקל מסוימים, מספר הtablיות עשוי להשתנות משבוע טיפול אחד לשני.

לדוגמה: אם אתה שוקל 85 ק"ג אתה עומד להתחיל את שבוע הטיפול הראשון, ינתנו לך 8tablיות.

טבלה 2

מספר הtablיות שעלייך ליטול				משקל שלך	
מחזור טיפול שנה 1		מחזור טיפול שנה 2			
שבוע טיפול 1	שבוע טיפול 2	שבוע טיפול 1	שבוע טיפול 2		
הרופא יאמר לך מה מספר הtablיות שעלייך ליטול				פחות מ-40 ק"ג	
4	4	4	4	40 ק"ג עד פחות מ-50 ק"ג	
5	5	5	5	50 ק"ג עד פחות מ-60 ק"ג	
6	6	6	6	60 ק"ג עד פחות מ-70 ק"ג	
7	7	7	7	70 ק"ג עד פחות מ-80 ק"ג	
7	8	7	8	80 ק"ג עד פחות מ-90 ק"ג	
8	9	8	9	90 ק"ג עד פחות מ-100 ק"ג	
9	10	9	10	100 ק"ג עד פחות מ-110 ק"ג	
10	10	10	10	110 ק"ג ומעלה	

אין לעבור על המנה המומלצת.

כיצד ליטול את התroxpa

יש ליטול את הtablיה/ות בערך באותו שעה בכל יום. יש לבלווע אותן עם מים, בלי ללעוז. אין צורך לקחת את הtablיות בזמן הארוחה. ניתן ליטול אותן עם הארוחות או בין הארוחות.

קרא את המדריך לנטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג בסוף עلون זה בנווגע לאופן הטיפול באירועים קשות פтиחה לילדים ואופן נטילת הטבליות הנמצאות בארץ.

חשיבות

- ודא כי ידיך יבשות לפני שאתה מרים את הטליה/ות.
- דוחף את הטליה/ות דרך הבליסטר ובלע מיד.
- אין להשאיר את הטליה/ות חשופה/ות על משטחים, למשל על שולחן, ואין להתעסק עם הTELיות זמן ארוך מהדרוש.
- אם TELיה הושארה על משטח או אם TELיה נשברת וחלקים منها נפלו מהבליסטר, יש לשטוף את האזור ביסודות.
- יש לשטוף את ידיךabisודות לאחר נטילת התרופה.
- אם אתה מאבד TELיה, היועץ ברופא.

משך הטיפול

בהתאם למספר הTELיות הכלול שנרשמו לך, עליך ליטול אותן במשך 4 או 5 ימים, בכל שבוע טיפול. TELה 3 מראה כמה TELיות (1 או 2 TELיות) עליך ליטול בכל יום. אם המינון הימני שלך הוא 2 TELיות, תול אותן באותו הזמן. לדוגמה: אם עליך ליטול 8 TELיות, עליך ללקחת 2 TELיות ביום 1, ביום 2, ביום 3, וTELיה אחת ביום 4 וביום 5.

TELה 3

מספר כולל של TELיות בכל שבוע טיפול	יום 1	יום 2	יום 3	יום 4	יום 5
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	2	1	1	1	1
7	2	2	1	1	1
8	2	2	2	1	1
9	2	2	2	2	1
10	2	2	2	2	2

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא מיד. הרופא יחליט אם עליך להפסיק את הטיפול או לא. יש ניסיון מוגבל עם מינון יתר של מייבנקלאד. ידוע כי ככל שנוטלים יותר מהתרופה, מספר הלימפוציטים בגוף עלול לרזדת, דבר שיוביל לליימפופניה (ראו סעיף 4). אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעלית מין מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול מייבנקלאד

אם שכחת mana ונזכرت רק ביום למועדת אל תיטול את המנה שנשכח יחד עם המנה הباءה המתוכננת. יש לקחת את המנה שנשכח ביום שלמחרת ולהאריך את מספר הימים בשבוע הטיפול הנוכחי.	אם שכחת mana ונזכرت באותו היום שבו הייתה אמרור ליטול אותה קח את המנה שנשכח באותו יום
---	--

לדוגמה: אם שכחת ליטול את המנה ביום 3 ולא נזכرت בכרע עד יום 4, יש לקחת את המנה של יום 3 ביום 4, ולהאריך את מספר ימי הטיפול הכלול בשבוע הטיפול ביום אחד. אם שכחת 2 מנות עוקבות (למשל גם ביום 3 וגם ביום 4), יש לקחת את המנות שנשכחו ביום"ים הבאים, ולהאריך את שבוע הטיפול ביום"ים.

יש להתמיד בטיפול כפי שהמליץ הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במיבנקלאד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשות תופעות הלואוי, יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי מסויימות עלולות להיות חמורות או להפוך לחמורות

לימפופניה ושלבתת חוגרת (עלולה להשפיע על יותר מ-1 מכל 10 מטופלים) – תופעת הלואוי החשובה ביותר היא ירידת במספר תאי הדם הלבנים הנקראים לימפוציטים (**לימפופניה**). תופעה זו שכיחה מאוד ועלולה להיות חמורה. לימפופניה עלולה להגביר את הסיכון להידבקות בזיהומיים. ביום אשר נראה לעתים קרובות עם מיבנקלאד הוא **שלבתת חוגרת**.

ספר לרופא מיד אם יש לך תסמינים של שלבתת חוגרת כגון "פס" של כאב חמור ופריחה של שלפוחיות, בדרך כלל בצד אחד של פלג הגוף העליון או הפנים. תסמינים אחרים יכולים להיות כאב ראש, תחושת צריבה, עקצוץ, חסור תחושה או גרד בעור באזורי הפגיעה, תחושה כללית לא טובה או חום בשלבים המוקדמים של הזיהום.

יהיה צריך לטפל בשלבתת החוגרת, ויתכן שהיא צריכה כורך בהפסקת הטיפול עם מיבנקלאד עד שהזיהום יחלוף.

בעיות כבד (תופעות לוואי לא שכיחות- עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 מטופלים):
ספר לרופא שלך באופן מיידי אם יש לך תסמינים, לדוגמה תחושת בחילה, הקאות, כאב בטן, עייפות, אובדן תיאבון, עור או עיניים צהובות (צחבת) או שtan כהה. יתכן שהיא צריכה להימנע מהטיפול באופן זמני או להפסיק את הטיפול במיבנקלאד.

תופעות לוואי אפשריות אחרות

תופעות לוואי שכיחות- עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 מטופלים:

- פצעי קור (הרופס אוראלי)
- פריחה
- נשירת שיער
- ירידת במספר תאי דם לבנים מסויימים (נויטרופילים)
- תגובות אלרגיות, כולל גרד, סרפה, פריחה ונפיחות של השפטיים, הלשון או הפנים

תופעת לוואי נדירה מאוד – עלולה להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 מטופלים:

- שחפת

אם הופעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלווואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא צינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לווואי

ניתן לדוח על תופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לווואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לווואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

- منع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה.
- אין לגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזיה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן מתחת ל- 25°C . אחסן את התרופה באזיה המקורית על מנת להגן מפני לחות.
- אין להשליך תרופות למערכת הביבוב או אשפת הבית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש, זאת כדי לשמר על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכיל מייבנקלאד

מוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

hydroxypropylbetadex, sorbitol and magnesium stearate.

כיצד נראה מייבנקלאד ומה תוכן האזיות

טבליות מייבנקלאד הן לבנות, עגולות, קמורות משני צידיהן, "C" מוטבע על צידן אחד ו-"10" על הצד השני. כל אריזה מכילה 1, 4, 5, 6, 7 או 8 טבליות בבליסטר, חתוכם בגרטיקן קרטון הנמצא באזיות קרטון קשת פתיחה לילדים. יתכן שלא כל גודלי האזיה ישוווקו.

שם בעל הרישום והיבואן: מרק סרונו בע"מ, רח' הקישון 18, יבנה 81220

שם הייצן וכתובתו: מרק אירופה V.B., אמסטרדם, הולנד


עלון זה נערך באוגוסט 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00 35306 78 159


שם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

מדריך לנטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג


מייבנקלאד ארכז באריזת קרטון קשת פתיחה לילדים שנייתן לסגור אותה מחדש ויש לשמר אותה הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים. ראה מטה מדריך בנוגע לאופן הטיפול באריזה ואופן נטילת טבליות מייבנקלאד. ודא כי אתה יודע כמה טבליות יש באריזה. ראה הנחיות בעלון.




1. הcn כו מים וודא כי ידיך נקיות ויבשות לפני נטילת הטעבלייה/ות.




2. הרם את הקרטון כאשר ההנחיות פונות כלפי מעלה.




3. (1) פותח את הפהה בקצה השמאלי של הקרטון.
- (2) דוחוף את הלשוניות המסומנות בצד' הקרטון בו-זמןית בעזרת האצבע המורה והאגודל, והשאר את הלשוניות לחוץות.
- (3) משור את המגש עד שהוא נוצר. **זהירות:** אל תסיר את המגש מהקרטון.




4. הוציא את העلون מהמגש. ודא כי קראת את כל העлон כולל המדריך לניטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג ושמור אותו במקום בטוח.




5. הרם את אריזת הבליסטר על ידי דחיפת האצבע דרך החור במגש. הניח את ידך מתחת לאריזת הבליסטר ודוחוף טבלייה 1 או 2 טבליות לתוך ידך, על פי המינון שנרשם לך.



6. בלע את הטבלייה/ות עם מים. יש לבלווע את הטבליות בשלמותן מבל' ללווע או לאפשר להן להתמוסס בפי'. יש להגביל את המגע עם העור. הימנע מגיעה באף, עיניים וחלקים אחרים בגוף.



7. שטוף את יDIR ביסודות עם סבון ומים.



8. דחוף את המגש בחזרה לקרטון. אחסן מתחת ל- -25°C באריזה המקורית על מנת להגן מפני חותות. שומר את הטבליות בבליסטר עד לנטיילת המנה הבאה. אין להוציא את הטבליות מהבליסטר. אין לאחסן את הטבליות במכל אחר.