



אוגוסט 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

משרד ראשי

רח' החרש 4
הוד השרון 45240
ת.ד. 10 ת"א 61000

Head Office

4 Haharash St.
Hod-Hasharon 45240
P.O.Box 10 Tel-Aviv 61000
Israel

Tel. +972-9-7626333

Fax. +972-9-7626300

הנדון: עדכון עלון לצרכן

TZAREVET X MINT FLAVOUR צרבת איקס בטעם מנטה

TZAREVET X MELON FLAVOUR צרבת איקס בטעם מלון

אנו מבקשים להודיעכם כי העלון לצרכן של תכשירי צרבת איקס בטעם מנטה ומלון עודכן.
עדכון העלון כולל החמרות.
העדכון כולל שינוי מינורי בשם התכשיר בעברית מ-X ל"איקס".

ההתוויה המאושרת:

Antacid

Calcium Carbonate 500 mg

Chewable tablets

הרכב וחוזק חומר פעיל:

צורת מינון:

בפירוט שלהלן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד.
תוספת טקסט או טקסט בעל שינוי משמעותי מסומן בצבע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים העיקריים בעלון לצרכן הינם בפרקים הבאים:

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים וילידים מעל גיל 12 הוא:

לעס 2-4 טבליות בעת הופעת התסמינים, או לפי המלצת הרופא.

אין לקחת יותר מ-15 טבליות ב-24 שעות.

אם את בהריון, אין לקחת יותר מ-10-9 טבליות ב-24 שעות.

אם נטלת מנת יתר

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

תסמינים של מינון יתר עלולים לכלול: אנוקסיה, צימאון, בחילות, הקאות, עצירות, כאבי בטן, חולשת שרירים, עייפות, הפרעות נפשיות, צימאון יתר, השתנת יתר, כאב עצמות, הסתיידות בכליות, חצצת כליה ובמקרים חמורים הפרעות בקצב הלב. מינון יתר קיצוני של סידן עלול לגרום לתרדמת ולמוות.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות <http://www.health.gov.il>

ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת כצט בע"מ, רח' החרש 4 הוד השרון, 1-700-500-220

בברכה,

מאיה ספקטור

רוקחת ממונה - כצט תעשיות כימיות בע"מ