

## **Wegovy 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 1.7mg and 2.4mg Solution for injection**

חברת נובו נורדייסק בע"מ מבקשת לידע על עדכון העלון לצריכן לתוכشيرם.

### **חומרים פעילים:**

Wegovy 0.25 mg - semaglutide 0.68 mg/ml

Wegovy 0.5 mg - semaglutide 1.34 mg/ml

Wegovy 1 mg - semaglutide 1.34 mg/ml

Wegovy 1.7 mg - semaglutide 2.27 mg/ml

Wegovy 2.4 mg - semaglutide 3.2 mg/ml

### **התוויה הרשומה לתכשיר:**

#### **Adults**

Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management, including weight loss and weight maintenance, in adults with an initial Body Mass Index (BMI) of

- $\geq 30 \text{ kg/m}^2$  (obesity), or
- $\geq 27 \text{ kg/m}^2$  to  $<30 \text{ kg/m}^2$  (overweight) in the presence of at least one weight-related comorbidity e.g. dysglycaemia (prediabetes or type 2 diabetes mellitus), hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea or cardiovascular disease.

#### **Adolescents ( $\geq 12$ years)**

Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management in adolescents ages 12 years and above with

- obesity\* and
- body weight above 60 kg.

Treatment with Wegovy should be discontinued and re-evaluated if adolescent patients have not reduced their BMI by at least 5% after 12 weeks on the 2.4 mg or maximum tolerated dose.

\*Obesity (BMI  $\geq 95$ th percentile) as defined on sex- and age-specific BMI growth charts (CDC.gov) (see Table 1).



**Table 1 BMI cut-off points for obesity ( $\geq 95^{\text{th}}$  percentile) by sex and age for paediatric patients aged 12 and older (CDC criteria)**

Age (years)	BMI ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ) at 95 <sup>th</sup> Percentile	
	Males	Females
12	24.2	25.2
12.5	24.7	25.7
13	25.1	26.3
13.5	25.6	26.8
14	26.0	27.2
14.5	26.4	27.7
15	26.8	28.1
15.5	27.2	28.5
16	27.5	28.9
16.5	27.9	29.3
17	28.2	29.6
17.5	28.6	30.0

בהתשובה זו מציינים העדכוניים המהווים בלבד. טקסט באדום עם **קו תחתית** מצין טקסט שהוסף לעלון ואילו טקסט עם קו חוצה מסמן טקסט שהורד מהעלון. החומרות מסומנות ברקע צהוב. נא לעיין בעלונים המצורפים להודעה זו המכילים את כל העדכוניים.

#### עדכוניים בעלון לצרכן:

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בויגובי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואה. יתכן שלא תסבול מארח אחת מהן.

#### **תופעות לוואי חמורות**

#### **יש לפנות מיד לרופא אם מופיעה אחת מתופעות לוואי החומרות המפורטוות מטה.**

**שכיחות** (עלולות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 10)

- סיבוכים של מחלת עיניים סוכרתית (רטינופתיה סוכרתית). אם אתה סובל מסוכרת, עלייך לידע את הרופא אם אתה חווה בעיות עיניים, כגון שינוים בראיה, במהלך הטיפול בתרופה זו.

**שאינם שכיחות** (עלולות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 100)

- דלקת בלבלב (פנקראטייס אקטואיטיס). סימני דלקת בלבלב עלולים לכלול כאב חמור וממושך בבטן, הכאב עלול לעבור לגב. עלייך לפנות לרופא מיד אם אתה חווה תסמיינים אלה.

**נדירות** (עלולות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 1000)

- תגבות אלרגיות חמורות (תגבות אנטיפילקטיות, אנגיואדמיה). עלייך לפנות לעזרה רפואיית מיידית ולידע את הרופא מיד אם אתה חווה תסמיינים כגון קושי בנשימה, נפיחות, תחושת שחזור, קצב לב מהיר, חזעה ואיבוד הכרה או התנפחות מהירה מתחת לעור באזוריים כגון פנים, גרון, זרועות ורגליים, אשר יכולה להיות מסכנת חיים אם הנפיחות בגרון חוסמת את נתיב האויר.

**נווֹוְנוֹרְדִּיסְקּ בָּעֵמֶן**

OTech

בניין OTech  
רחוב עתיר ידע 1 קומה 5 כפר סבא,

4464301



- **שכיחות בלתי ידועה** (השכיחות אינה ניתנת להערכת מהנתונים הזמינים)
- **חסימת מעיים**. צורה חמורה של עצירות עם תסמיינים נוספים כגון כאב בטן, נפיחות, הקאות וכו'.

.....

העלון המעודכן נשלח לפרנסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום: נובו נורדיסק בע"מ, רח' עתיר ידע 1, בפר-סבא 4464301, ישראל.  
טלפון: 09-7630444, פקס: 09-7630456.

, בברכה,

ליאת אטיאס, רוקחת ממונה  
nobo nordisk בע"מ