

Зепосия[®] (Озанимод)

информационная брошюра для пациента/медицинского работника

Что такое Зепосия и для чего он предназначен

Зепосия – это препарат, предназначенный для лечения следующих заболеваний:

- Рассеянный склероз
- Язвенный колит

Зепосия содержит активное вещество озанимод (ozanimod), относящееся к группе препаратов, способных уменьшать количество определенных видов лейкоцитов (лимфоцитов), которые свободно циркулируют по организму.

Что такое рассеянный склероз?

Зепосия показана для лечения взрослых пациентов с рецидивирующе-ремитирующим рассеянным склерозом (RRMS) в активной фазе, который был диагностирован согласно клиническим характеристикам или посредством визуализационных исследований.

Рассеянный склероз – это заболевание, при котором иммунная система (защитная система организма, которая включает лейкоциты) ошибочно атакует защитное покрытие нервов в головном и спинном мозге. Это не позволяет нервам нормально функционировать и вызывает такие симптомы, как покалывание на коже, затруднения при ходьбе, проблемы со зрением и поддержанием равновесия тела.

При рецидивирующе-ремитирующем рассеянном склерозе после обострения (атаки на нервные клетки) наступает период ремиссии. Симптомы могут исчезать в периоды ремиссий, но при этом некоторые из проблем иногда остаются.

Зепосия помогает защитить нервную ткань от атаки иммунной системы, останавливая лимфоциты (вид лейкоцитов) и предотвращая их попадание в головной и спинной мозг, где они могут вызвать воспаление и повредить защитную оболочку нервов.

Язвенный колит

Зепосия показана для лечения взрослых пациентов с активным язвенным колитом (язвенное воспаление толстого кишечника) со степенью тяжести болезни от средней до тяжелой.

Язвенный колит – это воспалительное заболевание кишечника, при котором иммунная система организма атакует стенку кишечника, что вызывает такие симптомы, как боли в животе, понос и кровотечение.

Зепосия может способствовать уменьшению признаков и симптомов язвенного колита посредством уменьшения воспаления и предотвращения попадания определенных лейкоцитов на стенку кишечника.

Не следует пользоваться препаратом Зепосия, если:

- вы страдаете аллергией на озанимод или какой-либо из других компонентов препарата;
- врач сообщил вам, что ваша иммунная система серьезно ослаблена;

- вы перенесли инфаркт, стенокардию, инсульт, микро-инсульт (транзиторную ишемическую атаку – ТИА) или определенные виды тяжелой сердечной недостаточности за последние 6 месяцев;
- вы страдаете или страдали в прошлом определенными видами аритмии (нарушениями сердечного ритма). Врач проведет у вас обследование функций сердца перед началом лечения;
- вы страдаете серьезным инфекционным заболеванием, например, воспалением печени (гепатитом) или туберкулезом;
- вы страдаете онкологическим заболеванием;
- у вас серьезные нарушения функции печени;
- вы беременны или можете забеременеть и не пользуетесь эффективными противозачаточными средствами.

Если вы принимаете препарат Зепосия впервые:

Прежде чем вы начнете принимать препарат, внимательно прочтите инструкцию по применению препарата, так как в ней содержится важная для вас информация. Сохраните эту инструкцию, так как, возможно, вам потребуется прочесть ее повторно в процессе применения препарата.



Ваш лечащий врач проведет у вас исследование сердца, прежде чем вы начнете прием Зепосия

Перед тем, как вы начнете принимать препарат Зепосия, врач проведет обследование функций вашего сердца с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). Если вы страдаете замедлением сердечного ритма или определенными нарушениями деятельности сердца, вы будете находиться под наблюдением врача как минимум в течение первых 6 часов после приема первой дозы препарата, в частности у вас будут проверять пульс и артериальное давление каждый час. Возможно, вам будет сделана ЭКГ в начале и в конце этого шестичасового промежутка времени.

Безотлагательно сообщайте о симптомах замедления сердечного ритма (например, головокружение, вертиго, тошнота или сильное сердцебиение) после первого приема препарата. Поскольку другие лекарства также могут замедлять ваш сердечный ритм, важно сообщать всем вашим лечащим врачам о том, что вы принимаете Зепосию.



Вакцинация

Перед началом лечения препаратом Зепосия ваш врач проверит, вакцинированы ли вы от ветряной оспы. Возможно, вам потребуется сделать прививку от ветряной оспы за месяц до начала лечения препаратом.



Исследование функций печени

Перед началом лечения препаратом Зепосия врач должен провести у вас исследование функций печени.



Исследование глаз

Если вы страдаете сахарным диабетом, воспалением глаз (воспалением сосудистой оболочки глаза – увеитом) или заболеванием сетчатки или страдали заболеванием сетчатки в прошлом, возможно, что врач направит вас на исследование глаз, перед началом лечения, или во время лечения Зепосией.

В период приема препарата Зепосия:

Прекращение лечения

Сообщите вашему врачу, если вы прекращаете принимать препарат Зепосия даже на короткое время. В соответствии с промежутком времени, который прошел с тех пор, как вы перестали принимать препарат, вам может понадобиться изменение дозировки. Возможно, врач уменьшит вам дозировку препарата, а затем постепенно увеличит ее опять.



Неврологические симптомы

Незамедлительно сообщите врачу, если вы заметили неожиданные неврологические и/или психиатрические признаки/симптомы: например, внезапные сильные головные боли, ощущение дезориентации, судороги, усиливающуюся слабость, неуклюжесть в движениях и изменения зрения, или ускоренное ухудшение неврологического состояния во время приема препарата Зепосия.



Инфекции

Во время приема препарата Зепосия вы можете быть сильнее подвержены инфекциям. Сообщите врачу немедленно, если у вас проявился один из признаков и симптомов инфекции во время приема препарата и в течение 3 месяцев после прекращения его приема. Зепосия также может уменьшать количество лейкоцитов (лимфоцитов) в системе кровообращения вашего организма.

Врач может назначить вам анализ крови, чтобы проверить уровень клеток крови перед началом приема препарата, и направлять вас на периодические анализы в дальнейшем.



Симптомы, связанные со зрением

Незамедлительно сообщите врачу, если у вас появится какой-либо симптом ухудшения зрения во время приема препарата Зепосия, а также в течение 3 месяцев после прекращения его приема.



Беременность

Не принимайте препарат Зепосия, если вы беременны, кормите грудью или можете забеременеть и не пользуетесь эффективными противозачаточными средствами. Если вы принимаете препарат во время беременности, Зепосия может нанести вред плоду. Среди возможных рисков также могут быть выкидыш или врожденные дефекты плода.

В период приема препарата Зепосия: (продолжение)

Перед началом приема препарата Зепосия:

- врач объяснит вам возможные риски для плода, если вы забеременеете во время приема препарата;
- вы должны получить отрицательный результат теста на беременность, который будет подтвержден врачом, а затем периодически повторять тест;
- вам следует использовать эффективные противозачаточные средства во время приема препарата (даже если ваше лечение было временно прекращено), а также в течение 3 месяцев после прекращения лечения препаратом.



Вам следует предохраняться от беременности во время приема препарата Зепосия. Врач сообщит вам о вреде для ребенка, связанном с лечением данным препаратом, и в случае необходимости вам будет предложено исследование УЗИ.



Вы должны прекратить прием препарата Зепосия за 3 месяца до планирования беременности. Если вы перестанете принимать препарат по причине беременности или в целях планирования беременности, симптомы заболевания могут возобновиться.



Сообщите врачу незамедлительно, если вы беременны или кормите грудью, думаете, что вы беременны или планируете забеременеть во время приема препарата Зепосия или в течение 3 месяцев после прекращения его приема.



Исследование функций печени

Ваш врач направит вас на анализ крови для проверки функций печени в первый, третий, шестой, девятый и двенадцатый месяц приема препарата Зепосия, а также назначит периодические исследования в дальнейшем.

Если результаты исследования укажут на нарушение функций печени, возможно, что вам придется прекратить лечение препаратом Зепосия.

Если во время лечения препаратом Зепосия у вас возникнет тошнота неясного происхождения, рвота, боли в правой части живота, утомляемость, потеря аппетита, пожелтение кожных покровов или белков глаз (желтуха) и/или появится темная моча, вам следует немедленно обратиться к своему врачу. Эти симптомы могут быть следствием поражения печени.

