

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשיררים) התשמ"ו 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרימבו 5/12.5/100

תמיisha לשאיפה במשאף

הרכב

החומרים הפעילים וכמותם:

כל חיציה משחררת:

בקלומטזון דיפרופיונאט 100 מיקרוגרם

פורמטורול פומראט דיבידראט 6 מיקרוגרם

גליקופירוניום ברומיד 12.5 מיקרוגרם

כל מנת המשחררות מהפיה מכילה:

בקלומטזון דיפרופיונאט 87.4 מיקרוגרם

פורמטורול פומראט דיבידראט 5.2 מיקרוגרם

גליקופירוניום 9 מיקרוגרם

Beclometasone dipropionate 100 micrograms
Formoterol fumarate dihydrate 6 micrograms
Glycopyrronium bromide 12.5 micrograms
(Beclometasone dipropionate 87.4 micrograms)
(Formoterol fumarate dihydrate 5.2 micrograms)
(Glycopyrronium 9 micrograms
[as 10.9 micrograms Glycopyrronium bromide])

חומרים בלתי פעילים וארגניים - ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.
תרופה זו נרשותה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

• מחלות ריאות חסימתיות כרונית (COPD) :

טיפול תחזוקתי במטופלים מבוגרים ממחלת ריאות חסימתיות כרונית (COPD) ביןונית עד חמורה, אשר אינם מטופלים רפואי ע"י שילוב של קורטיקוסטרואיד בשאיפה ובטא-2 אגוניסט ארכטוווזה, או שילוב של בטא-2 אגוניסט ארכטוווזה ואנטוגוניסט מוסקריני ארכטוווזה.

• אסתמה :

טיפול תחזוקתי באסתמה במטופרים אשר אינם מאוזנים רפואי ע"י שילוב תחזוקתי של בטא-2 אגוניסט ארכטוווזה ומינון ביןוני של קורטיקוסטרואיד בשאיפה ואשר חוו החמרה אחת או יותר של אסתמה בשנה החולפת.

טרימבו 5/12.5/100 היא תרופה המסייעת לנשימה המכילה את שלושת החמורים הפעילים:

• בקלומטזון דיפרופיונאט

• פורמטורול פומראט דיבידראט

• גליקופירוניום

בקלומטזון דיפרופיונאט שיך לקבוצה של תרופות הנקראות קורטיקוסטרואידים, הפעולות להפחחת הנפיחות והגירוי בריאות.

פורמוטROL וגליקופירוניום שייכים לקבוצה של תרופות הנקראות מרחיבי סימפונות פעילים לאורך זמן. הם פועלים בדרכים שונות להרפות את השירים בדרכי הנשימה ובכך לסייע בהרחבת דרכי הנשימה ולאפשר לנשומת יותר קלות.

טיפול קבוע בשלושת החומריים הפעילים הללו מסייע בהקלת ובמניעה של תסמיינים כמו קוצר נשימה, צפופים (נשימה עם קול של שריקה) ושיעול בקרב מטופלים מבוגרים הסובלים ממחלה ריאות חסימתית. טרימבו 5/12.5 100/6 יכול להפחית את החומרות (התלקחות) של תסמיין COPD ואסתמה. COPD היא מחלת רצינית וארוכת טווח בה דרכי הנשימה נחסומות והאנדיות בתוך הריאות נפגעות, מה שבobiluskshi נשימה.

אסתמה היא מחלת רצינית וארוכת טווח, בה השירים המקיים את דרכי הנשימה מתכווצים (כיווץ הסימפונות) ונעשה נפוחים ומוגורים (דלקת). התסמינים באים והולכים וכוללים קוצר נשימה, צפופים, לחץ בחזה ושיעול.

עליך לשימוש בטirimbo בכל יום ולא רק כאשר יש לך בעיות נשימה או תסמיינים אחרים של אסתמה. הדבר יבטיח שליטה טובה באסתמה שלך. אל תשמש בתרופה זו להקלת התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפופים.

קובוצה רפואייתית:
תרופות למחלות חסימתיות של דרכי הנשימה, אדרנרגיים בשילוב עם אנטי-קולינרגיים ושילוב של שלישי עם קורטיקוסטרואידים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבקלומטזון דיפרופיונאט, פורמוטROL פומראט דיהידראט וגליקופירוניום או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף".

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה:

טרימבו 5/12.5 100/6 משמשת לטיפול החזוקתי של מחלת הריאות החסימתית שלך. אל תשמש בתרופה זו לטיפול בהתקף פתאומי של קוצר נשימה או של צפופים.

אם הנשימה שלך מחייבת

אם אתה מפתח החומרה בקוצר נשימה או צפופים מיד לאחר שאיפת התרופה שלך, הפסיק לשימוש במסאי טרימבו והשתמש מיד במשאף מהיר הפעולה שלך "להקלת". عليك לפנות מיד לרופא שלך. הרופא יעריך את התסמינים שלך ובמידת הצורך עשוי להתחיל לטיפול אחר. ראה גם סעיף 4, "תופעות לוואי".

אם מחלת הריאות שלך מחייבת

אם התסמינים שלך מחייבים או שקשה לשלוט בהם (למשל, אם אתה משתמש במסאי נפרד "להקלת" בתדירות גבוהה יותר) או אם משאף ה"הקלת" שלך לא מsharp את התסמינים שלך, פנה לרופא מייד. יתכן כי מחלת הריאות שלך מחייבת והרופא שלך יctrיך לרשום טיפול שונה.

לפני הטיפול בטirimbo, ספר לרופא אם

- הינך סובל מבעיות לב, כמו תעוקת חזזה (כאב בלב, כאב בלב, כאב בחזה), התקף לב לאחרונה (אוטם שריר הלב), אי ספיקת לב, היצרות העורקים מסביב לב (מחלת לב כלילית), מחלת בשיטומי הלב שלך או מליקויים אחרים בלב שלך או אם יש לך מכב המכונה קרדיוומיופתיה היפרטרופית חסימתית (hypertrophic obstructive cardiomyopathy).

- יש לך הפרעות בקצב הלב כגון קצב לב לא סדיר, דופק מהיר או דפיקות לב או אם נאמר לך כי רישום הפעילות החשמלית של הלב (אק'ג) אינו תקין.
 - יש לך היצרות של העורקים (הידועה גם בשם טרשת העורקים), יש לך לחץ דם גבוה או אם יש לך מפרצת (בליטות חריגות בדופן כלי הדם).
 - הינך סובל מפעילות יתר של בלוטת התannis.
 - יש לך רמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמייה). השילוב של טרימבו עם כמה תרופות אחרות לריאות או עם תרופות מסוימות (תרופות הגורמות לגוף לאבד מים, לטיפול במחלת לב או בחץ דם גבוה) עלול לגרום לירידה חדה ברמת האשלגן בדם. לכן, יתכן ורופא יבקש למדוד את רמות האשלגן בדמך מדי פעם.
 - יש לך מחלת כלשתי בכבד או בכליות.
 - יש לך סוכרת. מינונים גבוהים של פורמטורול עלולים להעלות את רמת הסוכר בדם ועל כן יתכן ותצטרכך לבצע בדיקות דם נוספת כדי לבדוק את רמת הסוכר בדם כאשר אתה מתחילה להשתמש בתרופה זו, ומדי פעם במהלך הטיפול.
 - יש לך גידול בבלוטת יותרת הכליה (ידוע בשם פאוכרומוציטומה).
 - אתה אמר לך לקבל חומר הרדמה. יתכן וייה צורך להפסיק את השימוש בטרימבו לפחות 12 שעות לפני הרדמה, תלוי בסוג חומר הרדמה.
 - אתה מטופל או טופלת בעבר בשחפת (TB) או אם יש לך זיהום בchner.
 - הינך סובל מביעיה בעין הנקראט גלאוקומה צרת זווית.
 - הינך סובל מקושי במנון שtan.
 - יש לך זיהום בפה או בגרון.
- אם אחד מהסעיפים לעיל חל עלייך, ספר לרופא לפני התחלת השימוש בטרימבו.
אם אתה סובל או סבלת בעבר מביעות רפואיות או מאלגיות כלשהן או אם אין לך בטוח אם אתה יכול להשתמש בטרימבו, שוחח עם הרופא שלך או עם הרוקח לפני השימוש במשאף.

אם אתה כבר משתמש בטרימבו

אם אתה משתמש בטרימבו או במינונים גבוהים של קורטיקוסטירוואידים אחרים בשאייפה במשך תקופות ארוכות יותר ותזדקק לכמויות גדולות יותר של תרופה זו במצבי לחץ (למשל, נסיעה לבית חולים לאחר תאונה, פצעה חמורה או לפני ניתוח). במקרה כזה יתכן והרופא יצטרכך להגדיל את מינון הקורטיקוסטרוואידים שלך כדי להתמודד עם הלחץ והוא עשוי לרשום אותך בטבליות או בזיריקות. פנה לרופא שלך אם אתה חווה טשטוש ראייה או הפרעות ראייה אחרות.

ילדים וمتבגרים

התרופה אינה מיועדת לשימוש ילדים וمتבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ומעקב

טרימבו אינה מכילה מינון גבוה של קורטיקוסטרוואידים בשאייפה, אך יתכן והרופא שלך יבקש למדוד את רמות הקורטיזול בדמך מדי פעם.

אינטראקטיות/תגובה בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות הדומות לטרימבו המשמשות למחלת הריאה שלך.

- תרופות מסוימות עלולות להגבר את ההשפעות של טרימבו והרופא שlk עשו להחלטת על מעקב רפואי
 - קפדי אם אתה לוקה תרופות אלה (כולל תרופות מסוימות ל HIV : ריטונואיר, קובייסטאט).

- אל תשמש בתroppה זו יחד עם **טרופות חסומות בטא** (משמעות לטיפול בעיות לב מסוימות כמו תעוקת חזז או להפחחת לחץ דם) אלא אם הרופא שlk בחר בחוסם בטא שאינו משפייע על נשימתך.
- חסומי בטא (כולל טיפולים עיניים חסומות בטא) עלולים להפחית את ההשפעות של פורמוטROL או לגרום לכך שהוא לא ישפייע כלל. מצד שני, שימוש בתרופות אחרות מסוג בטא-างוניסטיות (שפועלות באותו אופן כמו פורמוטROL) עלולות להגבר את ההשפעות של פורמוטROL.

שימוש בטריימבו בלבד עט:

- **תרופות לטיפול ב-**
 - קצב לב לא תקין (קווינידין, דיסופיראמיד, פרוקaicנאמיד),
 - **תגובה אלרגיות** (אנטי היסטמינים)
 - **טסמים של דיכאון או הפרעות נפשיות** כמו מעכבי מונואמין אוקסידאז (כגון פנליין ואיזוקארבוקסازיד), נוגדי דיכאון טריציקליים (כגון אמיטריפטילין ואימיפראמין), פנותיאזידים עלולות לזרום לשינויים מסוימים באלקטרוקרדיוגרם (אקי'). הן עלולות גם להגבר את הסיכון להפרעות בקצב הלב (אריתמיה חריפה).

- **תרופות לטיפול במחלת פרקינסן (לבודופה), לטיפול בתת פעילות של בלוטת התריס (לבותירוקסין), תרופות המכילות אוקסיטוצין** (הגורם להתקכוות הרחם) ואלכוהול, עלולות להגדיל את האפשרות לתופעות לוואי של פורמוטROL על הלב.

- **מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs)**, כולל תרופות בעלות תכונות דומות כגון פוראוזולידון ופרורבזון, המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות, עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם.

- **תרופות לטיפול במחלת לב (דיגוקסין)** עלולות לגרום לירידה ברמת האשלגן בدم. דבר זה עלול להגדיל את הסבירות לקצב לב בלתי תקין.

- **תרופות אחרות המשמשות לטיפול במחלת ריאות חסימתית (טיאופילין, אמינופילין או קורטיקוסטרואידים)** ותרופות מסוימות עלולות אף הן לגרום לירידה ברמת האשלגן שlk.

- **חומר הרדמה מסוימים** עלולים להעלות את הסיכון לקצב לב בלתי תקין.

- **דיסופירם, תרופה המשמשת לטיפול באנשים עם אלכוהוליזם (בעיות שתיה)** או מטרונידازול, אנטיביוטיקה לטיפול בזיהום בגוף עלולות לגרום לתופעות לוואי (למשל בחילה, תחושת חולץ, כאב בטן) כתוצאה מכמות האלכוהול המועטה אשר בטריימבו.

הריון, הנקה ופוריות

אין מידע בטיחותי או ניסיון לגבי השימוש בטריימבו בנשים הרות או מניקות. אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכנת לדחת תינוק, התיעצץ עם הרופא שlk או עם הרוקח לפני נטילת תרופה זו. ניתן להימנע משימוש בטריימבו במהלך הלידה בגין ההשפעות המעכבות של פורמוטROL על התקכוויות הרחם. אין להשתמש בטריימבו בתקופת ההנקה. עלייך ועל הרופא שlk לקבל החלטה האם להפסיק את ההנקה או להפסיק/להימנע מטיפול בטריימבו תוך התחשבות בנסיבות ההנקה הילד וביתרונו הטיפול עבורך.

נהיגה ושימוש במכונות
לא סביר כי טריימבו תשפייע על יכולת הנהיגה וכי יכולת השימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התroppה

טרימבו 100/6.12.5 מכילה 8.856 מ"ג אלכוהול (אתנול) בכל לחיצה, אשר שווה ערך ל- 17.712 מ"ג לעומת של שתי לחיצות. הכמות בשתי לחיצות של תרופה זו הנה פחותה מ-1 מ"ל של יין או בירה. לכמות הקטנה של אלכוהול בתroppה זו לא תהיה השפעה מורגשת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח שלך אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתחום. **המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.**

מבוגרים

המינון והמקובל בד"כ הוא שתי שאיפות (לחיצות) בבוקר ושתי שאיפות (לחיצות) בערב.

אל תשתמש יותר ממה שהרופא שלך אמר לך להשתמש.
עליך להשתמש בטרימבו 12.5/600 בכל יום, גם כאשר האסתמה שלך אינה מטרידה אותך.
אל תשתמש בתרופה זו כדי להקל על התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפופים.

אם אתה מרגנש כי התרופה לא מספיק עיליה, פנה לרופא שלך.
אם השתמשת במשאף אחר המכיל בקלומטזון דיפרופיונאט לפני כן, בקש יעוץ מהרופא שלך, מכיוון שהמיןון הייעיל של בקלומטזון דיפרופיונאט בטרימבו 12.5/600 לטיפול במהלך הריאות החסימوتית שלך עשוי להיות נמוך מזה של כמה משאפים אחרים.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

טרימבו מיועד לשימוש בשאיפה.

עליך לשאוף את התרופה דרך פיך כך שהתרופה תעגיא ישירות לריאות שלך.

תרופה זו נמצאת במיכל דחוס בתוך מעטפת פלסטיק עם פיה.

בגב המשאף יש מונה המציג כמה מנתו נותרו. בכל פעם שאתה לוחץ על המיכל הדחוס, משתחררת מנתה של תרופה ומהמונה יורד במספר אחת. יש להקפיד לא להפעיל את המשאף מכיוון שהוא עלול לגרום לדמדומים בספירה.


בדיקות המשאף שלך

לפני השימוש במשאף בפעם הראשונה, עליך לבדוק את המשאף כדי לוודא שהוא פועל כהלכה, כדלקמן:

1. בדוק שМОנה המנות קורא 121
2. הסר את מכסה המגן מהפייה
3. החזק את המשאף באופן אנכי עם הפיה כלפי מטה
4. כוון את הפיה הרחק מגוף ולחץ בחזקה על המיכל בלחץ כדי לשחרר מנתה אחת
5. בדוק את מונה המנות. אם אתה בודק את המשאף בפעם הראשונה, קריית המונה תהיה 120:



כיצד תשתמש במשאף שלך
עליך לעמוד או לשבת זקור בזמן שאיפה.
חשוב: אל תבצע את השלבים 2 עד 5 מהר מדי.



1. הסר את מכסה המגן מהפייה ובודק כי הפיה נקייה ולא אבק ולכלוך.
2. נשוף החוצה לאט ועמוק ככל האפשר, על מנת לרוקן את הריאות שלך.

3. החזק את המשאף באופן א נכי עם הפיה כלפי מטה והנח את הפיה בין השיניים שלך מבלי לנשוך אותה. מקום את השפתיים סביר הפיה, כאשר הלשון שטוחה תחתיה.
4. שאף אוורר לאט ועומק דרך הפיה כדי למלא את ריאוטיך (זה אמור לקחת כ- 5-4 שניות). מיד אחרי תחילת השאיפה, לחץ בחזקה על החלק העליון של המשאף כלפי מטה כדי לשחרר מנה אחת.
5. החזק נשימתך זמן ארוך ככל האפשר ולבסוף הוציא את המשאף מהפה ונשוף החוצה באיטיות. אל תנשוף לתוך המשאף.
6. בדוק שמוונה המנוח (120 לחיצות) ירד באחד.

עבור השאייה השנייה, החזק את המשאף בצורה א נכי במשך כחצי דקה ולאחר מכן חזר על שלבים 2 עד 5. אם אתה רואה שיצא "ערפל" מהחלק העליון של המשאף או מצידי הפיה שלך, פירוש הדבר שטרימבו לא הגיע לריאוטיך כמו שצריך. כך שאיפה נוספת, תוך חזרה על ההוראות החל משלב 2.

לאחר השימוש יש להחזיר את מכסה המגן.

כדי למנוע זיהום פטריאטי בפה ובגרון, יש לשטוף את הפיה או לגרגר במים מבלי לבולו אותם או לצחצח שניינים לאחר כל שימוש במשאף.

מתי יש צורך במשאף חדשUnless קיבל משאף חדש כאשר המונת מראה את המספר 20. הפסיק להשתמש במשאף כאשר המונת מראה 0, מכיוון שתרופה שנותרה במשאף עלולה לא להספיק למנת מלאה עבורה.

אם יש לך אחיזה חלה, יתכן שהיא לך קל יותר להחזיק את המשאף בשתי הידיים: החזק את החלק העליון של המשאף בשתי האצבעות המזרחיות ואת החלק התיכון עם שני האגודלים.

אם אתה מתקשה להשתמש במשאף בזמן שאתה מתחליל לשאו פנימה, אתה יכול להשתמש בהתאם (spacer) spacer. שאל את הרופא או הרוקח לגבי המתאים. חשוב שתקרו את העلون המוסף עם מכשיר ה-AeroChamber Plus spacer שלך ושתעקוב אחר הוראות AeroChamber Plus spacer והניקיון במכשיר ה-AeroChamber Plus spacer.

ניקוי של המשאף טרימבו 12.5/6/100

- עליך לנוקות את המשאף פעמיים בשבוע.
1. אל תוציא את המכיל מהמשאף ואל תשתמש במים או בנוזלים אחרים לנקיי המשאף.
 2. הסר את מכסה המגן מפיה המשאף על ידי משיכתו.
 3. נגב את החלק הפנימי והחיצוני של הפיה ואת המשאף בעזרת מטלית נקייה ויבשה או טישו.
 4. החזר את מכסה הפיה.

אם נטלת יותר טרימבו ממה שאתה צריך שטיפול את המנה שלך לפי המלצת הרופא שלך. אין לעבור על המנה המומלצת מבלי לדבר עם הרופא שלך. אם אתה משתמש בטirimbo יותר ממה שאתה צריך, עלולות להופיע תופעות לוואי, כמו תואר בסעיף 4. ספר לרופא שלך אם השתמשת בטirimbo יותר ממה שאתה צריך ואם אתה חווה אחד מהתסמים הללו. יתכן והרופא שלך יבקש ממך לבצע כמה בדיקות דם. אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול טרימבו
יש ליטול את המנה מיד כשנוצרת. אם כמעט הגע הזמן למנה הבאה שלך, אל תיקח את המנה שהחמצת, אלא קח את המנה הבאה בזמן המתאים. אין ליטול מנה כפולה.

אם אתה מפסיק את נטילת טרימבו
חשוב להשתמש בטirimbo בכל יום. אין להפסיק להשתמש בטirimbo או להוריד את המינון, גם אם אתה מרגיש טוב יותר או שאין לך תסמים. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה או להוריד את המינון ללא התיעיצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהinct נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רפואי שלך או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטריימבו 12.5/6/100 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

קיימים סיכון להחמרה קוצר נשימה וצפופים מייד לאחר השימוש בטריימבו. מצב זה נקרא עווית סימפוניות פרדוקסלית (עלול להשפיע על עד 1 מכלל 1,000 מטופלים). במקרה זה עליך להפסיק מיד את השימוש בטריימבו ולהשתמש מיד במקרה "להקלה" המהיר שלך כדי לטפל בקוצר הנשימה והצפופים. עליך לפנות מיד לרופא שלך.

ספר לרופא שלך מייד

- אם אתה חווה תגובה אלרגית כמו אלרגיות בעור, סרפת, גירוד בעור, פריחה בעור (עלול להשפיע על עד 1 מכלל 100 משתמשים), אדמומיות בעור, נפיחות בעור או ברירות בעיניים, פנינים, בשפטים ובגרון (עלול להשפיע על עד 1 מכלל 1,000 משתמשים).
- אם אתה חווה כאב בעיניים או אי נוחות, טשטוש ראייה זמני, הילות ויזואליות או תമונות צבעוניות יחד עם עיניים אדומות. אלה עשויים להיות סימנים להתקף חריף של גלאוקומה צרת זווית (עלול להשפיע על עד 1 מכלל 10,000 משתמשים).

ספר לרופא שלך אם אתה חווה אחד מהתסמים הבאים בעת השימוש בטריימבו, מכיוון שהם יכולים להיות סימנים של זיהום בריאות (עלול להשפיע על עד 1 מ 10 משתמשים) :

- חום או צמרמוורת
- עלייה בייצור ליחח, שינוי בצבע הליכה
- שיурול מוגבר או קשי נשימה מוגברים.

תופעות לוואי אפשריות מפורטות מטה בהתאם לשכיחותן.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-11 משתמשים מתוך 100) :

- כאב גרון
- נזלת או אף גدوש והתעטשות
- זיהומים פטריאיטיים בפה. שטיפת הפה או גיגור במים וצחצוח השיניים מיד לאחר השאייפה עשויים לעזור במניעת תופעות לוואי אלה.
- צרידות
- כאב ראש
- זיהום בדרכי שתן

תופעות לוואי לא שפיריות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000) :

- שפעת
- דלקת בסינוסים
- אף מגרד, נזול או סתום
- זיהומיים פטריאיטיים בגרון או בוושט
- זיהומיים פטריאיטיים בנרתיק
- אי שקט
- רעד
- סחרורת
- תחושת טעם שונה או מופחתת
- חסור תחושה
- דלקת באוזן
- פעימות לב לא סדירות
- שינויים אלקטרוקרדיוגרמים (אק"ג)
- פעימות לב מהירות במילוי והפרעות בקצב הלב
- דפיקות לב (תחושת פעימות לב לא תקין)
- אודם בפנים
- הגברת זרימת הדם לרקמות מסוימות בגוף
- התקף אסתמה
- שייעול ושיעול פרודוקטיבי
- גירוי בגרון
- דימומים באף
- אדמומיות של הלוע
- פה יבש
- שלשול
- קשיי בליעה
- תחושת חוליה
- כאב בטן
- אי נוחות בבטן לאחר ארוחות
- תחושת צריבה בשפטאים
- עששת
- פריחה בעור, סרפדת, גירוד בעור
- דלקת בקרום הרירי של הפה עם או בלי כיבים
- הזעה מוגברת
- התכווצויות שרירים וכאבים בשרירים
- כאבים בזרועות או ברגליים
- כאבים בשרירים, עצמות או במפרק החזקה
- עייפות
- עליה בלחץ הדם
- ירידת ברמה של חלק ממרכיבי הדם : תא דם לבנים מסוימים הנקראים גראנוולוציטים, אשלאן או קוורטיזול
- עליה ברמה של חלק ממרכיבי הדם : גליקוז, חלבון מגיב C (C-reactive protein), טסיות דם, אינסולין,
- חומצת שומן חופשית או קטוינום.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000) :

- זיהומיים פטריאיטיים בחזה
- תיאבון מופחת
- הפרעות שינה (שינה מועטה או ארוכה מדי)
- כאב מוחץ בחזה
- תחושה של החסרת פעימות לב, או של פעימות לב נוספות, פעימות לב איטיות במילוי

- החמרה של אסתטמה
- דליפת דם מכל הדם לרקמות מסביבו
- ירידיה בלחץ הדם
- חולשה
- כאב בחלק האחורי של הפה והגרון
- דלקת בלוע
- גרון יבש
- מותן שtan כאב ותכווצ'
- קושי וכואב בעת מותן שtan
- דלקת בклילות.

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שモופיעות בפחות ממائת מש Achד מתוך 10,000) :

- רמה נמוכה של טסיות הדם
- תחושת חוסר נשימה או קוצר נשימה
- נפיחות בכפות הידיים והרגליים
- פיגור בגדילה אצל ילדים ומתבגרים.

תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה (לא ניתן להעריך את התדריות מהנתונים הזמינים) :

- ראייה מטושטשת.

שימוש במינון גבוה של קורטיקוסטרואידים בשאייפה לאורץ זמן עלול לגרום במקרים נדירות מאוד להשפעות מערכתיות:

- בעיות בתפקוד בלוטות יותרת הכליה (דיכוי של בלוטות יותרת הכליה)
- ירידיה בצליפות המינרלים עצומות (דילול עצומות)
- עכירות בעדשות העיניים שלך (קטראקט).

תופעות הלואוי הבאות גם יכולות להופיע במינון גבוה של קורטיקוסטרואידים בשאייפה במשך זמן רב, אך התדריות אינה ידועה (לא ניתן להעריך את התדריות מהנתונים הזמינים) כרגע:

- דיאנון
 - הרגש דאגה, חוסר מנוחה, התרגשות יתר או עצבנות.
- אירועים אלה נוטים להופיע יותר אצל ילדים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>
בנוסף, ניתן לדוח לחברת קמהදע בע"מ בדוא"ל:
pharmacovigilance@kamada.com

5. איך לאחסן את התרופת?

מנع הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ואו תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה זו לאחר תאריך התפוגה (Exp. date) אשר מופיע על גבי הקרטון והתוויות. תאריך התפוגה מתиיחס ליום האחרון של אותו חודש.

לפני הניפוי למטופל (מידע עבור הרוקח):
יש לאחסן במקסר (2°C-8°C).
אין להקפיה.

לאחר הניפוי למטופל (מידע עבור המטופל):
ניתן לאחסן את התרופה למשך מקסימום 4 חודשים בטמפרטורה של עד 25°C.

אין לחשוף לטמפרטורות הגבוהות מ 50°C.
אין לנקב את מיכל הלחץ.

אין להשליך תרופות דרך הביבוב או האשפה הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש.
אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומרים הפעילים בתרופה מכילה גם :

Norflurane (HFA 134a), Ethanol anhydrous, Hydrochloric acid 1M

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה

טרימבו 100/6/12.5 מגיעה בצורה של תמיסה דחוסה בתוך מיכל לחץ (אלומיניום מצופה) בעל שסתום מדידה. המיכל נמצא בתוך משאף פלסטיק, המשלב فيه המטופקט עם מכסה מגן מפלסטיק וכן מונה מנוט. כל אריזה מכילה מיכל אחד המספק 120 מנות (שאייפות).

שם הייצור וכתובתו
Chiesi Farmaceutici S.p.A., פארמה, איטליה.

בעל הרישום וכתובתו
קמיהדע בע"מ
בית קמה

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות : 164-94-36103

שם הפטוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.