

עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרוקאפ 160 מ"ג™

טבליות מצופות

החומר הפעיל:

כל טבלייה מכילה:

קאפיואסרטיב 160 מ"ג mg Capivasertib 160

טרוקאפ 200 מ"ג™

טבליות מצופות

החומר הפעיל:

כל טבלייה מכילה:

קאפיואסרטיב 200 mg Capivasertib 200

לחומרים בלתי פעילים בתכשיר – אנא ראה סעיף 6 " מידע נוספת".
אנא ראה גם סעיף 2 – " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טרוקאפ, טיפול משולב עם פולבסטרונט, מיועד לשימוש במטופלים מבוגרים עם סרטן שד מתקדם מקומית או גוררתי המבטא קולטנים הורמונליים (HR) ו-HER2 שלילי, ועם שינוי אחד או יותר ב-PIK3CA/AKT1/PTEN בבדיקה מאושרת, לאחר התקדמות על לפחות טיפול אחד מבוסס-אנדוקרייני בשלב הגוררתי, או לאחר חזרה מחלת בתקופה של 12 חודשים מסיום טיפול משלים (אדג'ובנטי).

קבוצה רפואיית

טרוקאפ הינו טיפול מסווג מעכבי חלבון סרין/תריאונין קינאז אשר מסוגל לעכב בצורה ספציפית ופוטנטית את שלושת האיזופורמים של האנזים AKT (AKT1/2/3)

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בטרוקאפ

לפני הטיפול בטרוקאפ, ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של רמות גבוהות של סוכר בدم או סוכרת
- יש לך היסטוריה של פריחה או בעיות עור אחרות
- הנר סובל מבעיות כבד
- את בהריון או מתכנתה הריון. טרואקאפ יכול להזיק לעובר. ראי סעיף הריון והנקה.

ילדים ומתבגרים:

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה ילדים ומתבגרים.

בדיקות ומעקב

הרופא המתפלל יעקוב אחר רמות הסוכר בדם לפני ובמהלך הטיפול בטרואקאפ.

לא ידוע האם טרואקאפ בטוח לשימוש באנשים עם סוכרת סוג 1 או באנשים המשמשים באינסולין לטיפול בסוכרת שלהם. הרופא המתפלל יעקוב אחר רמות הסוכר בדם לעיתים קרובות יותר אם יש לך היסטוריה של סוכרת, או אם הינך חולה סוכרת בעל גורמי סיכון לפתח היפרגליקמיה, כגון: השמנת יתר ($BMI > 30$), רמה גבוהה של סוכר (בدم (גבולה מ 160 מ"ג לדציליטר ($L/dl > 8.9$ mmol)), רמות המוגולובין A1C בגבול העליון או מעליו, שימוש בו זמני בקורטיקוסטרואידים סיסטמיים או זיהומיים המתרחשים במהלך מחלה אחרת (intercurrent infections)

איןטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- מעכבי CYP3A חזקים או בינוניים, כגון: איטראקונזול, אריתרומיצין, וורפםיל, מעלים את ריכוז קאפיואסרטיב בדם, דבר העולול להעלות את הסיכון לתופעות לוואי לטרואקאפ.
- מגברי CYP3A חזקים או בינוניים, כגון: ריפאמפיצין, אפאבירן, מוריידים את ריכוז קאפיואסרטיב בדם, דבר העולול להוריד את יעילות טרואקאפ.

שימוש בתרופה ומזון:

יש להימנע מאכילת אשכוליות או משתית מיץ אשכוליות במהלך הטיפול בטרואקאפ.
ניתן ליטול טרואקאפ עם או ללא מזון.

הריון והנקה:

הריון

יש לספר לרופא אם אתה בהריון או מתכנתה הריון. טרואקאפ יכול להזיק לעובר.

נשים בגיל הפוריות:

- הרופא שלך יבודק האם אתה בהריון לפני תחילת הטיפול בטרואקאפ.
- עליך להשתמש באמצעות מניעת ייעלים במהלך הטיפול בטרואקאפ ובמשך חודש אחד לאחר נטילת המנה האחורה. שוחחי עם הרופא שלך לגבי אמצעי מניעה המתאימים לך בתקופת הטיפול.
- אם אתה בהריון או חושבת شيئاך ונכנסת להריון יש לידע את הרופא מיד.

מטופלים גברים עם בניית זוג בגיל הפוריות צריכים להשתמש באמצעות מנעה ייעלים בתקופת הטיפול בטרואקאפ ובמשך 4 חודשים לאחר נטילת המנה האחורה. אם בת הזוג נכנסת להריון, יש לידע את הרופא מיד.

הנקה

יש לספר לרופא אם את מיניקה או מתכונת להניק. אין להניך במהלך הטיפול בטרוקאף. שוחחי עם הרופא על הדרך הטובה ביותר לאכילת תינוקר במהלך הטיפול בטרוקאף.

נהיגה ושימוש במכונות

טרוקאף עלול להשפיע על יכולת הנהיגה שלך או הפעלת מכונות. יש לשים לב במיוחד בעת הפעלת מכונות או נהיגה, אם היין מרגיש עירף כאשר אתה לוחץ טרוקף.

מידע חשוב על חלק מהמכבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, ולכן נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בטוח ברגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- יש ליטול את התרופה פעמיים ביום (בഫראש של כ- 12 שעות בין מנתה למנה) בבוקר ובערב, בערך באותו זמן כל יום.
- יש ליטול את התרופה במשך 4 ימים ברציפות, ולאחר מכן 3 ימים ללא נטילת התרופה, בכל שבוע.
- ניתן ליטול טרוקאף עם או ללא מזון.
- יש לבלווע את טבליות טרוקאף בשלמותן עם מים. אין מידי לאבוי לעיסה, ח齐יה, כתישה, ריסוק של הטבליות.
- אין לקחת טבליות אם הן שבורות, סודוקות או נראות פגומות.
- בנשים שעוד לא הגיעו לגיל המעבר או שרק התחליו את גיל המעבר, הרופא ירשום תרופה נוספת נספפת הנקרואט אగוניסט ל- LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) בלבד עם טרוקאף ופוליבסטרנת.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר או אם בטיעות בלבד ליד מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיעון של בית החולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה:

אם שכחת ליטול את טרוקאף, אתה יכול ליטול את המנה בטוחה של 4 שעות מהשעה הרגילה. אם עברו יותר מ- 4 שעות משעת הנטילה הרגילה, יש לדלג על המנה. יש ליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנתה כפולה על מנת לפזרת על המנה שנשכחה.

אם הנר מקיא לאחר נטילת טרוקאף, אין ליטול מנתה נוספת. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

יש להתמודד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית ומהנה בכל פעם שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטורקאף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

**תופעות לוואי המחייבות התיעובות מיוחדת
יש לפניהם מידית לרופא אם הinker מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות:**

תופעות לוואי שכיחות מאד (עלולות להשפיע על יותר משמש אחד מעשרה):

- **רמת גבוזות של סוכר בدم (היפרגליקמיה)** – אם היפרגליקמיה אינה מוכרת ומטופלת כראוי היא יכולה להתרפתח למצברים חמורים יותר. יש לידע את הרופא אם אתה מפתח סימנים של רמות סוכר גבוהות הכוללים: צמא מוגבר, פה יבש, נתינת שתן לעיתים קרובות מהרגיל או כמות גדולה יותר מהרגיל, תאבורן מוגבר עם ירידת במשקל, בלבול, בחילה, הקאה, ריח פירוטי בנשימה, עור יבש או סמו.
- **שלשול** – שלשול הוא תופעת לוואי מאוד שכיחה של טורקאף ועלול להיות חמור. שלשול חמור עלול לגרום לאובדן נזלים שימושיים (התיעובות). יש לידע את הרופא המטפל אם אתה מפתח סימנים של שלשול, כולל צואה רכה או מימית. הרופא ינחה אותך לשותות יותר נזלים או לקחת תרופות לטיפול בשלשול.
- **תגובה עוריות** – יש לידע את הרופא או לקבל עזרה רפואית מוד אם אתה מפתח תופעות כגון: פריחה או אמ הפריחה מהמין, האדמה של העור, חום, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או בפה, שלפוחיות בעור, עור מתקלף, גרד או עור יבש, אקזמה, פריחה עורית חמורה הגורמת להופעת שלפוחיות (אריתמה מוליטפורמה), שינוי צבע של העור, חתכים בעור, כיבים בעור, חרלה, פריחה בעור שנובעת מדיימות מכל דם קטנים (ণימים) אל תוך רקמות (ארגמנת).

ייתכן והרופא המטפל יורה לך להפחית את המנה, או להפסיק את הטיפול בטורקאף באופן זמני או קבוע אם הנך סובל מחלק מתופעות הלוואי החמורות.

תופעות לוואי אחרות:

תופעות לוואי שכיחות מאד (תופעות שימושיים ביוטר משמש אחד מעשרה) בעת נטילת טורקאף כוללות:

- ירידת ברמות המגולובין בדם
- בחילה
- עייפות
- הקאה
- פצעים בפה
- ירידת בתיאבון
- כאב ראש
- זיהום בדרכי השתן
- פגיעה בклיות כולל אובדן מהיר של תפקוד הכליות (פגעה חריפה בклיות)
- שינויים בבדיקות דם מסוימות: ירידת ברמות הלוקוציטים, לימפוציטים ונוטרופילים, עלייה ברמות הטריגליקידים
- רמה גבוהה של קריatinין שנצפהה בבדיקות דם, מה עשוי להיות על סימן לבעה בклיות
- רמה גבוהה של המגולובין מסוכר בדם (סמן של רמת הסוכר בדם במהלך 8 עד 12 השבועות האחרונים)
- ירידת ברמות אשלגן בדם
- ירידת ברמת הטסיות בדם
- עלייה ברמת האלניין אמינוטרנספרاز בדם
- ירידת ברמות הסידן בדם

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושיים מトー 1-10 משמשים מトー 100) בעת נטילת טורקאף כוללות:

- רגישות יתר (כולל תגובה אנפילקטית)
- אנמיה
- דלקת ריאות
- חום
- טעם מחר בפה
- קשי עיכול
- גידולים משניים

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שימושים מתח 1-1000) בעת נטילת טרוקאף כוללות:

- אלח דם (ספסיס)
- התקף לב

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون,
עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על התופעה לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את טרוקאף?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין לשימוש בתרופה אחרי תאריך הת滂גה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂גה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שספק לך את התרופה.
- אין לאחסן תרופות שונות באותו ארון.
- אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Cellulose, microcrystalline, Calcium hydrogen phosphate, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate
ציפוי הטבלייה:

Hypromellose, Copovidone, Titanium dioxide, Polydextrose, Macrogols 3350, , medium-chain

Triglycerides, , , Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה
טרוקאף 160 מ"ג:

טבלייה מצופה, עגולה, קמורה שני צידה, בצבע בז'. הטעבלייה מסומנת ב- "CAV" מעל "160" בצד אחד וחולקה בצד השני.

טרוקאף 200 מ"ג:

טבלייה מצופה, בצורת כמוסה, קמורה שני צידה, בצבע בז'. הטעבלייה מסומנת ב "CAV200" בצד אחד וחולקה בצד השני.

האריזה מכילה 4 בליסטרים, 16 טבליות בכל בליסטר. בסך הכל 64 טבליות מצופות באריםזה.

צרכן: אסטרהוזניקה AB, סודרטליה, שבדיה.

בעל הרישום והיבואן: אסטרהוזניקה (ישראל) בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

טרוקאף 160 מ"ג: 176-55-37770-99

טרוקאף 200 מ"ג: 176-56-37771-99

לשם הפשטות ולהקלת הקירהה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך יולי 2024.