

אוקטובר 2026

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ מבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון

Adatar
אדטאר

התווית התכשיר:

Cutaneous treatment of acne vulgaris when comedones, papules and pustules are present.

מרכיבים פעילים:

Benzoyl Peroxide (as hydrous) 2.5% W/W
Adapalene 0.1% W/W

צורת המינון של התכשיר: ג'ל

תוספת מסומנת כטקסט **אדום**. שינוי שמהווה החמרה מודגש **בצהוב**. כמו כן, בעלון בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <https://israeldrugs.health.gov.il>
ניתן לקבלו מודפס באמצעות פנייה לבעל הרישום, חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761, טל. 04-8475700

להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן [.....]

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול באקנה (פצעי בגרות) **המלווה בהופעת קומדונים, פפולות ופוסטולות**.

[.....]

2. לפני השימוש בתרופה

....

לפני הטיפול באדטאר ספר לרופא אם אתה נוטל, נטלת לאחרונה, או עשוי ליטול תרופות אחרות.

....

• **אם מופיעה תגובה המעידה על רגישות לרכיב כלשהו בתכשיר, יש להפסיק את השימוש באדטאר ולפנות לרופא.**

- הימנע מחשיפה נרחבת לשמש או לקרינת UV (למשל, באמצעות **מנורת UV**) ודאג להגנה מתאימה אם אתה חייב להיחשף לשמש (בגדים ארוכים, כובע, תכשירי הגנה מהשמש וכו').
- יש לשמור שהג'ל לא יבוא במגע עם השיער ועם אריגים צבעוניים (**לדוגמא בגדים, מגבות, מצעים**), היות שהוא עלול לגרום לשינוי הצבע (כגון הפיכתו לדהוי או לבן).
-

אינטראקציות / תגובות בין תרופתיות:

תרו תעשייה רוקחית בע"מ / תרו אינטרנשיונל בע"מ, הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761, טל: 04-8475700

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות:

-
- מוצרים קוסמטיים העלולים לגרות, לייבש או לקלף את העור: יש להימנע משימוש בזמן הטיפול באדטאר, **מאחר שהם עלולים להוביל לגירוי מצטבר של העור.**

[.....]

היריון והנקה:

הריון:

אין להשתמש בג'ל בזמן היריון או כאשר את מתכננת היריון. אם הרית במהלך הטיפול באדטאר, יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא **בהקדם האפשרי** להתייעצות והמשך מעקב.

[.....]

3. כיצד תשתמש בתרופה?

....

אין לבלוע

[.....]

4. תופעות לוואי

....

הפסק את הטיפול ופנה מיד לרופא או לחדר מיון אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:
תגובה אלרגית חמורה (כולל שוק אנאפילקטי) או סימני רגישות כלשהם שיכולים לכלול בין היתר: היצרות בגרון, התנפחות העיניים, הפנים, השפתיים או הלשון; עילפון (כולל תחושת עילפון), קשיי נשימה. יש להפסיק את הטיפול אם מתפתחות תופעות של אורטיקריה (סוג של פריחה) או גרד בפנים או בגוף. **תדירות הופעת תופעות הלוואי הללו אינה ידועה.**