

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג**תמישה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש**

כל עט מזרק מוכן לשימוש של 1 מ"ל מכיל 200 מ"ג בלימומאב (belimumab 200 mg).

לשימוש החומרה הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - " מידע נוספת".
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת כתוספת טיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) אדמנטיית מערכתית (SLE) פעילה, חיובית לנוגדים אוטואימוניים, עם רמת פעילות גבוהה של המחלת (למשל נוכחות נוגדים נגד DN'A דו גידילי (dsDNA) ורמת משלים נמוכה (low complement)), למטרת הטיפול הרגיל.

בנלייטה מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) נפריטיס פעילה בשילוב עם טיפולים מדכאי מערכת חיסון.

קבוצה רפואיית: נוגדים חד-שבתיים, מדכאי חיסון.
זאבת היא מחלת שבה מערכת החיסון (המערכת שנלחמת בזיהום) תוקפת את התאים והركמות שלך, וגורמת לדלקת ולפגיעה באיברים. המחלת יכולה לפגוע כמעט בכל איבר בגוף וחוشبים שהוא קשורה לסוג של תא דם לבנים, הנקראים תא B.
בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מכילה **בלימומאב** (נוגדן חד-שבטי אנושי). היא מפחיתה את מספר תא B בכך באמצעות חסימת הפעילות של SBLyS, חלבון העוזר לתאי B להיות זמן רב יותר ונמצא ברמות גבוהות באנשים עם זאבת.
אתה תקבל בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג בנוסף לטיפול הרגיל שלך לザבת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגish (אלרגי) לבלימומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).

← **ספר לרופא** אם אתה חושב שאחד מלאה חל עלייך.

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימורו בתרופה

לפני הטיפול בבניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, ספר לרופא אם:

- יש לך זיהום או אם יש לך זיהום מתמשך או אם אתה סובל מזיהומים לעתים קרובות. הרופא יחולט אם אפשר לחתך לך בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
 - אתה מתכוון להתחסן או שהתחסנת ב- 30 הימים האחרונים. ישנו חיסונים שאין לחתם אותם בסמור או במהלך הטיפול בבניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
 - הזאתה משפיעה על מערכת העצבים שלך.
 - אתה נשא של HIV (נגיף החיסוני האנושי) או אם יש לך רמות נמוכות של אימונוגלובולינים.
 - יש לך או הייתה לך דלקתCBD נגיפית מסוג B או C.
 - עברת השתלת איברים או מה עצם או תאגיד.
 - היה לך סרטן.
- ← ספר לרופא אם ייתכן שאחד מלאה חל עלייך.

דיכאון והתאבדות

קיים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות לרבות התאבדות במהלך הטיפול עם בניליסטה. ספר לרופא אם יש לך היסטוריה של מצבים אלה. אם אתה חש בתסמינים חדשים או החמרה בתסמינים בכל זמן שהוא:

← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.

אם אתה מודока או שיש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להתאבד, ייתכן שתמצא שזה מועיל לספר לך חבר קרוב ולבקש מהם לקרוא עליו זה. תוכל בבקשה מהם לומר לך אם הם מודאגים לגבי שינויים במצב הרוח או בהתנהגות שלך.

שים לב לתסמינים חשובים

מטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלהם עלולים להיות בסיכון מוגבר להידבק בזיהומיים, כולל בזיהום מוחי נדרי אף חמור הקרי לויקואנצפלופתיה ובסיכון מוקדית מתקדמת.

(PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

← מידע נוספת קריא על "סיכון מוגבר לזיהום מוחי" בסעיף 4 בעлон זה.

ילדים ומתבגרים

אל תיתן בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18.

איןטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח תרופות המשפיעות על מערכת החיסון, כולל כל תרופה המשפיעה על תאגיד B (משמש לטיפול הסרטן או במחלות דלקתיות).

← השימוש בתרופות כאלה בשילוב עם בניליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עלול לגרום למערכת החיסון להיות פחות יעילה. הדבר עלול להעלות את הסיכון שלך להידבק בזיהום חמור.

היריון והנקה

אמצעי מניעה בנשים בגין הפוריות

השתמשי באמצעות ייעיל במהלך הטיפול בבנלייטה תת-עורית 200 מ"ג ובמהלך 4 חודשים לפחות לאחר המנה האחרונה.

היריון

בדרך כלל, בנלייטה תת-עורית 200 מ"ג אינה מומלצת אם את בהיריון.

• **ספרי לרופא אם את בהיריון, אם את חושבת שעת בהיריון או אם את מתכוננת להרות.**

הרופא יחליט אם את יכולה להשתמש בבנלייטה תת-עורית 200 מ"ג.

• **אם כניסה להיריון בזמן שתת מטופלת בנלייטה תת-עורית 200 מ"ג, ספרי על כך לרופא.**

הנקה

ספרי לרופא אם את מניקה. סביר להניח שבנלייטה תת-עורית 200 מ"ג יכולה לעבור לחלב האם. הרופא ישוחח איתך האם עלייך להפסיק את הטיפול בבנלייטה תת-עורית 200 מ"ג בזמן שתת מניקה או האם עלייך להפסיק להניק.

נהיגה ושימוש במכונות

בנלייטה תת-עורית 200 מ"ג יכולה לגרום לתופעות לוואי העוללות לפגוע ביכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

מידע חשוב על תכונות בנלייטה:

בנלייטה תת-עורית 200 מ"ג מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, לכן התרופה נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

בנלייטה תת-עורית 200 מ"ג ניתנת בזריקה מתחת לעור באותו היום בכל שבוע.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

זאבת (לופוס) אדמנתיית מערכית (SLE)

המינון המקביל בדרך כלל הוא: 200 מ"ג (תcolaה מלאה של עט אחד) פעם בשבוע.

זאבת (לופוס) נפריטיסים

המינון המקביל עשוי להשנות. הרופא יקבע את המינון הנכון בשביילר, שהוא:

• **מנה של 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.**

או

• **מנה של 400 מ"ג (תוכן מלא של שני עטים בפעם אחת) פעם בשבוע במשך 4 שבועות.**

במunsch, המינון המומלץ הוא 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.

אם אתה מעוניין לשנות את יום הזרקה:
הזרק מנה ביום החדש (אפילו אם עבר פחות משבוע מהמנה האחרונה שלך). מאותו יום המשך עם לוח הזמנים השבועי החדש.

הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:

האחות או הרופא יראו לך או למי שמטפל לך כיצד להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג. הזריקה הראשונה עם עט המזורך המוכן לשימוש של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג תהיה תחת השגחה של האחות או הרופא. לאחר שידריכו אותך כיצד להשתמש בעט, האחות או הרופא יכולים להחליט WHETHER יש יכולת להזריק לעצמך או שהמטפל שלך יכול להזריק לך. האחות או הרופא גם יינחו אותך לאילו סימנים ותסמינים יש לשים לב כאשר משתמשים בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, מכיוון שיכולה להוביל לתגובה אלרגית חמורת (ראה בסעיף 4 "תגובות אלרגיות").

יש להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מתחת לעור באזור הבطن או באזור הירך. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג היא זריקת תת עורית ואסורה להזריק אותה לתוך הוריד (V.I.). הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזורך המוכן לשימוש נמצאות בסוף העלון זה.

אין לעبور על המנה המומלצת.

אם נטلت בטיעות מינון גבוהה יותר של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג
עליך לפנות מיד לרופא או לאחות שישגיחו عليك במקרה שתפתח סימנים או תסמינים של תגובה לוואי, ושיטפלו בתסמינים אלו במידת הצורך. במידת האפשר, הראה להם את הארידזה או את העלון הזה.
אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחתי להשתמש בבנלייסטה תת-עוררי 200 מ"ג
הזרק את המנה ששכחתי ברגע שנזכרת. לאחר מכן המשך עם לוח הזמנים השבועי הרגיל או התחילה לוח זמנים שבועי חדש שתחלתו מיהי מחרזת את המנה שנשכחה.
אם לא הבחנתה שהחמצת מנה עד הגיעו להגיעה הזמן למנה הבאה, הזרק רק את המנה הבאה כמתוכנן.
יש להתמיד לטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

הפסקת הטיפול בבנלייסטה תת-עוררי 200 מ"ג

גם אם חיל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא הティיעצות עם הרופא.

הרופא יחליט אם عليك להפסיק להשתמש בבנלייסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנתק זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רפואי או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבנלייסטה תת-עוררי 200 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מכך אף אחת

מהן.

תגבות אלרגיות - פנה מיד לקבלת סיוע רפואי
בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לתגבה לזריקה, או לתגבה אלרגית (רגישות יתר). אלו תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים). לעיתים תופעות אלו עלולות להיות חמורות (תופעות לוואי שאין שכיחות, עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים), והן עלולות להיות מסכנות-חיים. סביר יותר שתופעות חמורות אלו תתרחשנה ביום של הטיפול הראשון או השני עם בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג, אולם הן יכולות להתעכב ולהתרחש מספר ימים אחר כך.

ספר מיד לרופא או לאחות, או פנה לחדר מיון בבית-החולים הקרוב, אם אתה חש באחד מהתסминים הבאים של>tagבה אלרגית או-tagבה לזריקה:

- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה או הלשון
- צפופים בנשימה, קשיים בנשימה או קוצר נשימה
- פריחה
- גבושיםות מוגדרות בעור או חrelת

לעתים נדירות, תגבות מאוחרות לבנלייטה, פחות חמורות, עלולות גם כן להתרחש, בדרך כלל חמישה עד עשרה ימים לאחר הזרקה. הן כוללות תסמינים כגון פריחה, בחילה, עייפות, כאבי שרירים, כאבי ראש, או נפיחות של הפנים.

אם אתה חווה תסמינים אלו, במיוחד אם אתה חווה יחד שני תסמינים או יותר:
← **ספר לרופא או לאחות.**

זיהומים

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לך בזיהומים בסביבות גבואה יותר כולל זיהומים בדרכי השתן והנשימה. אלה תופעות לוואי שכיחות מאוד ועלולות להופיע ב- יותר מ- 1 מתוך 10 אנשים. זיהומים מסוימים עלולים להיות חמורים ויכולים לגרום למות באופן לא-שכיח.

אם אתה חווה אחד מהתסминים הבאים של **זיהום**:

- חום ו/או צמרמורות
 - שיעול, בעיות נשימה
 - שלשול, הקאה
 - תחושת צריבה בזמן מתן שתן; מתן שתן לעתים תכופות
 - עור חם, אדום או כואב או פצעים בגוף.
- ← **פנה מיד לרופא או לאחות.**

דיכאון והתאבדות

קיימים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות במהלך הטיפול עם בנלייטה. דיכאון עלול להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים, מחשבות אובדן וניסיונות התאבדות עלולים להופיע ב- עד 1 מתוך 100 אנשים. אם אתה מודוכא, יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או מחשבות מטרידות אחרות, או אם אתה מודוכא ומבחן שהרגשתך מחמירה או שאתה מפתח תסמים חדשים:

← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.

סיכון מוגבר לziehoms מוחי:

תרופות המחלישות את מערכת החיסון, כגון בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, עלולות לשים אותך בסיכון מוגבר להידבק בziehoms מוחי נדרי אף חמור ומסכן חיים הקרוי **PML** - **Progressive Multifocal Leukoencephalopathy**.

תסמינים של לויוקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת:

- אובדן זיכרון
- קושי לחשוב
- קושי לדבר או ללכט
- אובדן ראייה

← **ספר לרופא מיד** אם אתה חווה אחד מתחומיים אלו, או בעיות דומות שנמשכו מעל למספר ימים.

אם כבר חוותה תסминים אלו לפני תחילת הטיפול עם בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:

← **ספר מיד לרופא** אם אתה מבחין בשינויים כלשהם בתסминים אלה.

תופעות לוואי אפשריות נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מתוך 10 אנשים:

- ziehomsים חידקניים (ראה פסקה "ziehomsים" לעיל)

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים:

- חום גבוה
- תగבות באזור ההזרקה, לדוגמה: פריחה, אדמומיות, גרד או נפיחות של העור במקום בו הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג
- פריחה גבשוית ומגרדת (חרלה), פריחה בעור
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (ניתן להבחין בבדיקה דם)
- ziehoms באף, בגרון או בקיבה
- כאב בידים או בכפות הרגליים
- מיגרנה
- בחילה, שלשול

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי לשדר הביריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות

(המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה www.health.gov.il)
ל קישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל-8°C).
- אין להקפיא.
- יש לאחסן באזירה המקורי כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מאור במשך 12 שעות לכל היותר. לאחר הוצאתו מהקרר יש להשתמש בעט תוך 12 שעות או להשילכו.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Sodium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Histidine Monohydrochloride,
L-Histidine, Polysorbate 80, Water for Injection.

ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
בנלייטה תה-עוררי 200 מ"ג משוקת בעט מזרק מוכן לשימוש, המכיל 1 מ"ל תמייסה נתולת צבע עד צהבהבה בצבעה, לשימוש חד-פעמי.
כל אריזה מכילה 1 עט מזרק מוכן לשימוש או 4 עטי מזרק מוכנים לשימוש.
ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקרים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיהתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקסוסמיהתקליין טריידינג סרוויסס לימייד, דבלין, אירלנד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 161-25-35439
- לשם הפשתות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינט בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש

פעם בשבוע

מלא אחר ההוראות שלහן המנוחות כיצד להשתמש בצורה נכונה בעט מזרק מוכן לשימוש. אי-AMILIO אחר ההוראות עלול להשפיע על תפקוד תקין של עט המזרק המוכן לשימוש. עליך גם לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט המזרק המוכן לשימוש. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת לשימוש **תת עוררי בלבד**.

אחסון


- יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל- 8°C).
- אין להקפי.
- שמור באזית הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהמקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (25°C) כשהוא מוגן מאר במשך 12 שעות לכליותר. לאחר הוצאתו מהמקרר **יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשליכו**.
- יש להרחיק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

ażhorot

- �ט המזרק המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו לאחר מכון.
- אין לחלוק את בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש עם אדם אחר.
- אין לנער.
- אין להשתמש אם נפל על משטח קשה.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני הזרקה.


חלקי בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש

חלון בדיקה



מעצור אפור


מכסה טבעי




מגן מחט מוחהב

תאሪיך תפוגה

אביזרים הדורשים להזרקה




בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן



מטלית אלכוהול

(לא כולל באירועה)



פְּדָ גָּזָה או צִמְרָ גַּפְן

(לא כולל באירועה)

1. אסוף ובודק את האביזרים

אסוף אביזרים


- הוצאת המקרר מגש אחד סגור של עט מזרק מוכן לשימוש.
- מצא משטח נוח, מואר היטב ונקי והנחת עליו את האביזרים הבאים בהישג יד:
- בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש.
- מטלית אלכוהול (לא כולל באירועה).

- פד גזזה או צמר גפן (לא כולל באריזה).
- מכל ריק עם מכסה צמוד להשלכת העט המשומש (לא כולל באריזה).
- אל תבצע את ההזרקה אם אין לך את כל האביזרים הרשומים מעלה.

בדוק את תאריך התפוגה

- קלף את הכיסוי של המגש והווצה את עט המזרק המוכן לשימוש.
- בדוק את תאריך התפוגה שלל עט המזרק המוכן לשימוש (ציוויל 1).

ציוויל 1



- אל תשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר
- 2. הכן ובדוק את עט המזרק המוכן לשימוש יש לאפשר לעט המזרק להגיע לטמפרטורת החדר
 - הניח את העט בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות (ציוויל 2). הזרקה של עט בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג קר עלולה לקחת זמן ממושך יותר ועלולה להיות לא נוחה.

ציוויל 2




- אל תחמס את העט בכל דרך אחרת. לדוגמה, אל תחמס במיקרוגל, במים חמים או באור שימוש ישיר.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי במהלך שלב זה.

בדוק את התמיסה של בNELISPA תחת-עורית 200 מ"ג

- הסתכל בחלון הבדיקה כדי לבחון שתמיסת בNELISPA תחת-עורית 200 מ"ג היא נטולת צבע עד צהבהבה בצבעה (ציפור 3).
- זה תקין לראותות בוועת אוויר אחת או יותר בתמיסה.

ציפור 3

תמייסת בNELISPA תחת-עורית 200 מ"ג




- אל תשתמש אם התמיסה נראהיה עכורה, בצבע שונה או אם יש בה חלקיקים.

**3. בחר ונקה את אזור ההזרקה
בחר את אזור ההזרקה**

- בחר את אזור ההזרקה (בטן או ירך) כפי שניתן לראותות בציור 4.

ציפור 4




- אם אתה זקוק לשתי זריקות להשלמת המינון, השאר לפחות 5 ס"מ בין כל מקום ההזרקה אם אתה מזניק באותו אזור.
- אל תזריק בכל פעם בדיקות באותו האזור. זאת על מנת למנוע מהעור להתקשות.
- אל תזריק באזוריים בהם העור רגיש, פצוע, אדום או קשה.
- אל תזריק במרחב הקטן מ- 5 ס"מ מהטבור.

נקה את אזור ההזרקה

- רחץ את ידך.
- נקה את אזור ההזרקה על ידי ניגובו במטלית אלכוהול (ציפור 5). הנה לעור להתייבש באוויר.

ציפור 5




- אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזריקה.

4. התכוון להזרקה הסר את המכסה הטבעתי

- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני ההזרקה.
- הסר את המכסה הטבעתי על ידי משיכה או סיבוב שלו. ניתן לסובב את המכסה הטבעתי עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון (ציפור 6).

ציפור 6




- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.

מקם את העט

- אחוז בעט בנוחות כך שתוכל לצפות בחלון הבדיקה. זה חשוב כדי שתוכל לוודא מתן מינון מלא (ציפור 7).

ציפור 7




- במידת הצורך, משור או מתח את העור באזור ההזרקה כדי להפוך אותו למוצק יותר.
- מקם את העט ישר מעל אזור ההזרקה (בזווית של 90 מעלות). ודא שמאן המחט המוחаб שטוח על-פני העור.

5. האזק בניליטה תחת-עוררי 200 מ"ג התחל את ההזרקה

- לחץ את העט באופן יציב וחזק כל הדרך לתוך אזור ההזרקה והחזיק אותו במקום (ציפור 8).

פעולה זו תחדיר את המחט ותתחל את ההזרקה.

ציפור 8




ייתכן שתשמעו "קליק" ראשון בתחילת ההזרקה. אתה תראה את המחוון (אינדיקטור) הסגול מתחילה לנوع דרך חלון הבדיקה (ציפור 9).

ציוויל 9



השלם את ההזרקה המשך להחזיק את העט בכיוון מטה עד שהמחוון (אינדיקטור) הסגול יפסיק לנوع. ניתן שתתשמעו "קליק" שני כמו שנויות לפני שהמחוון (אינדיקטור) הסגול מפסיק לנوع (ציוויל 10).

ציוויל 10



ניתן שההזרקה תימשך 15 שניות עד להשלמה.

- כאשר ההזרקה הושלמה, הרם את העט מאזור ההזרקה.

6. השליך ובודק השלך את העט המשומש

- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.
- השלך את העט המשומש והמכסה הטבעתי לתוך מכל ריק עם מכסה צמוד.
- בקש מהרופא או מהרווקח הסבר כיצד להשליך כראוי עט משומש או מכל שבתוכו עטים משומשים.
- אל תמחזר או תשליך עט משומש, או מכל שבתוכו עטים משומשים, בפסולת ביתית.

בדוק את אזור ההזרקה

ייתכן שתהייה כמות קטנה של דם באזורה ההזרקה.

- במידת הצורך, לחץ צמר גפן או פד גזהה על אזור ההזרקה.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה.

Ben 200mg PT v8