

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

בפנטן® פלוס
קרם

חומרים פעילים:
כל גרם מכיל:

Dexpanthenol 50 mg

דקספנטנול 50 מ"ג

Chlorhexidine dihydrochloride 5mg

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 5 מ"ג

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה פרק 6 "מידע נוסף" ופרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 10 - 14 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיטוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון גירויים קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.

קבוצה תרפויטית:

דקספנטנול – פרו ויטמין B5

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד – מחטא (אנטיספטי)

בפנטן פלוס מכיל כלורהקסידין שנלחם בחיידקים על העור או כאלה שחדרו לפצע עם לכלוך, וכך מונע או ממתן זיהום חיידקי בפצעים. התכשיר מכיל גם דקספנטנול, שבעור נהפך לוויטמין חומצה פנטוטנית, מה שתומך בחידוש תאי העור מבפנים בקצב מואץ, וכך גורם לזירוז ריפוי הפצע. בנוסף, העור שנוצר גמיש יותר. הקרם קל למריחה ולהסרה בשטיפה ואינו שומני או דביק.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• אם אתה רגיש (אלרגי) לדקספנטנול, לכלורהקסידין דיהידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.• על עור תוף מנוקב.• לפצעים עמוקים, חמורים או מזוהמים. טיפול בפצעים אלו יתבצע על ידי רופא. |
|---|

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• לפני הטיפול בבפנטן® פלוס ספר לרופא אם:

- אתה סובל ממחלה כלשהי.
- אתה סובל מאלרגיות, רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי.
- אתה נוטל תרופות אחרות (כולל תרופות ללא מרשם) או משתמש במשחות אחרות.

- יש להימנע ממגע עם האוזניים או רקמות ריריות.
- בשל הסיכון לפגיעה בראייה, יש להימנע ממגע התכשיר בעיניים. במקרה של מגע התכשיר בעיניים, יש לשטוף אותן מייד עם מים ביסודיות. במקרה שיופיעו גירוי, אדמומיות, כאבים בעין או הפרעות ראייה, יש לפנות מייד לקבלת עזרה רפואית. מקרים חמורים של נזק בלתי-הפיך לקרנית העין (נזק למשטח העין), שעשויים להצריך השתלת קרנית, דווחו בחולים שעיניהם באו בטעות במגע עם תרופות דומות (שמכילות כלורהקסידין) במהלך ניתוחים תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ונטולת כאבים). בפנטן® פלוס מתאים לשימוש על שטחי עור מצומצמים בלבד. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.
- שימוש חוזר באותו שטח עור עלול להוביל לגירוי העור.
- פצעים נרחבים, עמוקים, חמורים או מזוהמים וכן עקיצות/נשיכות ופצעי דקירה דורשים פנייה לרופא/טיפול רפואי בגלל הסיכון לזיהום טטנוס.

- יש לפנות לרופא אם גודל הפצע איננו קטן לאחר זמן מה או אם הפצע איננו מחלים בתוך 10-14 יום. הדבר נכון גם לגבי פצע בעל שוליים אדומים מאוד, אם הפצע מתנפח במהירות או מאוד כואב וכן אם הפצע מלווה בחום (קיים סיכון לאלח דם).
- אין להשתמש בתכשיר לטיפול בגירויים אשר הסיכון שיזדהמו נמוך (לדוגמה: כוויות שמש, נקודות לחץ, אזורי עור דלקתיים). במקרה כזה, מומלץ לעשות שימוש בתכשיר שאינו מכיל חומר מחטא.
- במקרים נדירים עלולות להופיע תגובות אלרגיות חמורות כולל הלם אנפילקטי בעת שימוש בתרופות המכילות כלורהקסידין כגון בפנטון[®] פלוס. אם אתה חש בתסמינים של תגובה אלרגית חמורה, כגון צפצופים או בעיות נשימה, התנפחות הפנים, גרד, סרפדת (אורטיקריה) שיכולים להוביל במהירות לתסמינים חמורים יותר, פריחה חמורה בעור או הלם, יש להפסיק את הטיפול בפנטון[®] פלוס מיד ולפנות לרופא ללא דיחוי.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תרופות למריחה על גבי העור ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין להשתמש באזור המטופל בפנטון[®] פלוס, בו זמנית בסבונים, דטרגנטים וחומרים מחטאים אחרים. השימוש במחטאים אחרים בו זמנית עלול להחליש את השפעת תרופה זו.

היריון והנקה

היריון

אם את בהריון היועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בפנטון[®] פלוס. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.

הנקה

ניתן לעשות שימוש בפנטון[®] פלוס בתקופת ההנקה אך יש להימנע ממריחה על שטחי עור נרחבים. אם את מיניקה, עליך להסיר שאריות התכשיר לפני ההנקה כדי להבטיח שהתכשיר לא ייבלע על ידי התינוק.

נהיגה ושימוש במכוונות

לא ידועה השפעה שלילית על יכולת הנהיגה או שימוש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה צטיל אלקוהול, סטאריל אלקוהול ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור ממגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אופן השימוש והמינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: מרח שכבה דקה על האזור הנגוע עד 4 פעמים ביום. ניתן לחבוש את הפצע או להשאירו חשוף.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 - 10 ימים.

אם אתה מרגיש שפעולת התכשיר חזקה או חלשה מדי, יש להיוועץ ברופא או רוקח.

צורת הנטילה

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אם בלעת בטעות כמות גדולה של התכשיר, יש להיוועץ ברופא. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים ולהיוועץ מיד ברופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד (אמינוטרנזפראז).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנטון[®] פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא במקרים הבאים:

- תגובות אלרגיות בעור כגון דלקת עור ממגע, גרד, אודם, אקזמה, חרלת (אורטיקריה), גירוי העור, שלפוחיות או תחושת בעירה או נזק לקרנית העין (נזק למשטח העין) ונזק בלתי-הפיך לעין כולל לקות ראייה בלתי-הפיכה (לאחר מגע התכשיר בעין, ראה פרק 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- תגובת רגישות יתר, תגובה אנפילקטית, שוק אנפילקטי נצפו הכוללים ביטויים קליניים כגון אסתמה, קוצר נשימה, צפצופים, בעיות אחרות במערכת הנשימה, התנפחות הפנים, תגובות של העור כגון גרד, פריחה או חרלת (אורטיקריה), בעיות במערכות העיכול, הלב וכלי הדם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/השפופרת. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון:** אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- ניתן להשתמש בבפנטן® פלוס עד 12 חודשים מיום פתיחת השפופרת. מומלץ לרשום את תאריך הפתיחה על האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Liquid paraffin, white soft paraffin, cetyl alcohol, wool fat (lanolin), macrogol stearate, stearyl alcohol, DL-pantolactone, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קרום בצבע שמנת.

גדלי אריזה: 3.5, 30, 100 גרם. יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

בעל הרישום/היבואן וכתובתו: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.

נערך בפברואר 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 127 48 26501 01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.