

ינואר 2026

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ מבקשת לעדכן כי העלון לצרכן של התכשירים מטה עודכן.

Name of the medicinal product:

Registration number:

DESMOPRESSIN SANDOZ 60 MCG SLT

181-27-38136-99

DESMOPRESSIN SANDOZ 120 MCG SLT

181-28-38137-99

DESMOPRESSIN SANDOZ 240 MCG SLT

181-29-38138-99

התוויה רשומה:

DESMOPRESSIN SANDOZ® SLT is indicated for Nocturnal enuresis.

בהודעה זו מצויינים רק הסעיפים בהם בוצעו שינויים מהותיים בעלון לצרכן.

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israel drugs.health.gov.il/#!/byDrug>

כמו כן ניתן לקבל את העלון המודפס על ידי פניה לבעל הרישום – סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

לעדכוןכם בברכה,

סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ

השינויים בעלון לצרכן:

שימוש בתרופה עם מזון ושתייה:

צריכת הנוזלים צריכה להיות מוגבלת למינימום החל משעה לפני נטילת מינירין מלט בערב ועד הבוקר שלמחרת (ובכל מקרה למשך לפחות 8 שעות).

בזמן הטיפול בתרופה יש להימנע משתיית כמות גדולה של נוזלים. שתיית כמות גדולה של נוזלים עלולה לגרום להצטברות מים ודילול ריכוז המלחים בגוף. זה עלול לגרום לכאב ראש, בחילות / הקאות, עלייה במשקל ומקרים חמורים להתכווצויות.

מזון עלול להפחית את הספיגה של דסמופרסין אצטט. כדי להבטיח שהמינון הנכון ייספג, חשוב להקפיד ליטול תרופה זו תמיד באותו תזמון ביחס לארוחות.

אופן השימוש

אין ליטול יותר מהמינון שנרשם לך במהלך כל תקופה של 24 שעות. אם יש לך תחושה שההשפעה של דסמופרסין סנדוז אס. אל. טי חזקה מדי או חלשה מדי, יש לפנות לרופא או לרוקח. יש להוציא את הטבלייה מאריזת הבליסטר, להניח אותה מתחת ללשון ולאפשר לה להתמוסס. אין ללעוס או לבלוע. יש ליטול תרופה זו באופן קבוע באותו תזמון ביחס לארוחות. אכילת מזון עשויה להפחית את כמות התרופה הנספגת בגוף ולקצר את משך השפעתה (ראה פרק 2 "שימוש בתרופה עם מזון ושתייה").