

01.2025

רופא/ה נכבד/ה  
רוקח/ת נכבד/ה**FORTEO**  
Solution for Injection

חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלון לצרכן של התכשיר שבנידון עודכן. טקסט שהתווסף מודגש בצהוב. טקסט שנמחק מסומן בקו חוצה. העלון המעודכן לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום:

אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה, טל': 09-9606234

בברכה,  
חברת אלי לילי**החומר הפעיל:**

Teriparatide 250mcg/ml

**ההתוויה המאושרת לתכשירים:**

FORTEO is indicated:

- For the treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk for fracture (defined herein as having a history of osteoporotic fracture or multiple risk factors for fracture) or who have failed or are intolerant to other available osteoporosis therapy. In postmenopausal women with osteoporosis, FORTEO reduces the risk of vertebral and nonvertebral fractures.
- To increase bone mass in men with primary or hypogonadal osteoporosis at high risk for fracture or who have failed or are intolerant to other available osteoporosis therapy.
- For the treatment of men and women with osteoporosis associated with sustained systemic glucocorticoid therapy (daily dosage equivalent to 5 mg or greater of prednisone) at high risk for fracture or who have failed or are intolerant to other available osteoporosis therapy.

**העדכון העיקרי בעלון לצרכן הוא:****כיצד תשתמש בתרופה?**

...

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, או אם בלע ילד מן התרופה פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. אם אתה נוטל יותר מדי פורטאו, אתה עלול לסבול מבחילות, הקאות, עייפות או סחרחורת-מבחילות, חולשה/רדמת (לתרגיה, lethargy), ותת לחץ דם. סימנים, תסמינים וסיבוכים נוספים של מינון יתר של פורטאו יכולים לכלול אפקט היפרקלצמי מושהה, הקאות, סחרחורת וכאב ראש.**