

Inovamed Pharma Ltd

Making Health Affordable™

ספטמבר 2026

רופא/ה נכבד/ה

רוקח/ת נכבד/ה

עדכונים בעלון לצרכן:

חברת אינובמד פארמה בע"מ מודיעה על עדכון העלון לצרכן של התכשיר:

פורוסמיד אינובמד

Furosemide Inovamed

טבליות Tablets

כל טבליה מכילה:

Furosemide 40mg

התוויה שאושרה על-ידי משרד הבריאות:

Edema associated with congestive heart failure, cirrhosis of the liver and renal disease, including the nephrotic syndrome. Adjunctive therapy in acute pulmonary edema. Treatment of hypertension.

ברצוננו להודיע על עדכון העלון לצרכן של התכשיר הנ"ל.

בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום – החמרה, והסרות מידע כטקסט מחוק) כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע (כחול), ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

[...]

1. למה מיועדת התרופה?

[...]

קבוצה תרפויטית: תרופות משתנות.

תרופות אלו ניתנות לטיפול בבצקת, מצב בו יש יותר מדי מים בגוף שלך. מצב זה יכול להתרחש עקב בעיה בלב, בריאות, בכליות, בכבד, בכלי הדם או עקב לחץ דם גבוה.

פורוסמיד אינובמד עוזרת לכליות להיפטר מעודף המים שלא נדרשים בגוף.

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

[...]

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

[...]

- נוגדי פטריות (סיכון לאובדן אשלגן או לנזק כלייתי המתואר בשילוב עם פורוסמיד).

[...]

- תרופות או מוצרי מזון המכילים ליקריץ' (סיכון מוגבר לאובדן אשלגן בשילוב עם פורוסמיד).

- ציספלאטין - לטיפול בסרטן (סיכון מוגבר לנזק לכליות בשילוב עם פורוסמיד).

[...]

- לבדופה - לטיפול במחלת פרקינסון (סיכון מוגבר להורדת לחץ דם בשילוב עם פורוסמיד).

[...]

היריון, והנקה ופוריות

יש להיוועץ ברופא לפני שאת נוטלת פורוסמיד אינובמד אם את הינך בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת ללדת תינוק.

[...]

פוריות

אין נתונים זמינים בבני אדם לגבי השפעת פורוסמיד על הפוריות.

[...]

Inovamed Pharma Ltd

Making Health Affordable™

3. כיצד תשתמש בתרופה?

[...]

אופן השימוש

[...]

יש לבלוע את הטבליה עם כוס מים.

[...]

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מינון יתר כוללים התייבשות, שינויים ברמות של חומרים מסוימים בדם, לחץ דם נמוך, נפח דם נמוך והפרעת קצב לבבית.

[...]

4. תופעות לוואי

[...]

תופעות לוואי נוספות

עליך לדווח לרופא או לרוקח אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:

[...]

- ירידה בלחץ דם הגורמת לפגיעה בריכוז ובתגובות, הרגשת סחרור, תחושות של לחץ בראש, כאב ראש, סחרחורת, נמנום, הרגשת חולשה, שינויים בראייה, יובש בפה וחוסר יכולת לעמוד זקוף

[...]

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:

[...]

- התכווצויות או חולשת שרירים או חולשה

[...]

- ייצור השתן עלול להיפסק בפתאומיות, אם יש לך הפרעה בשלפוחית השתן, בלוטת ערמונית מוגדלת או היצרות של השופכנים, ייצור השתן עלול להיפסק בפתאומיות

- ירידה בלחץ דם הגורמת לפגיעה בריכוז ובתגובות, הרגשת סחרור, תחושות של לחץ בראש, כאב ראש, סחרחורת, נמנום, הרגשת חולשה, שינויים בראייה, יובש בפה וחוסר יכולת לעמוד זקוף

[...]

- בעיות שמיעה כגון 'צלצולים באוזניים', חירשות (לפעמים בלתי הפיכה)

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

[...]

- בעיות שמיעה כגון "צלצולים באוזניים", אובדן שמיעה הפיך או בלתי הפיך

- ייצור שתן מוגבר עלול להתרחש או להחמיר, אם יש לך חסימה בדרכי השתן, ייצור שתן מוגבר עלול להתרחש או להחמיר

[...]

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

[...]

- סחרחורת, עילפון ואובדן הכרה (נגרמים עקב תת-לחץ דם סימפטומטי)

[...]

5. איך לאחסן את התרופה?

[...]

- יש לאחסן את התרופה במקום קריר יבש, בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

[...]

העלון נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות <https://www.health.gov.il> וניתן לקבלו באמצעות פניה לחברת אינובמד פארמה בע"מ, טל: 037150600.

בברכה

דר' עמליה לוי

רוקחת ממונה