

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

הימפבזי™

תמיסה להזרקה תת עורית

עט מוכן לשימוש מכיל:
מרסטסימב 150 מ"ג / 1 מ"ל
marstacimab 150 mg/1 ml

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר הימפבזי קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בהימפבזי ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

הימפבזי מיועד לטיפול מניעתי שגרתי של אירועי דמם במטופלים בני 12 ומעלה, השוקלים לפחות 35 ק"ג, עם:

- המופיליה A חמורה (חסר פקטור VIII מולד, $FVIII < 1\%$) ללא נוגדנים מעכבים לפקטור VIII, או
- המופיליה B חמורה (חסר פקטור IX מולד, $FIX < 1\%$) ללא נוגדנים מעכבים לפקטור IX.

קבוצה תרופוטית: נוגדי דימום, המוסטטיים סיסטמיים אחרים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בהימפבזי אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בהימפבזי, ספר לרופא על כל המצבים הרפואיים שלך, לרבות אם:

- אתה עומד לעבור ניתוח מתוכנן. הרופא עשוי להפסיק את הטיפול בהימפבזי לפני הניתוח. התייעץ עם הרופא על המועד שבו עליך להפסיק את השימוש בהימפבזי ועל המועד שבו עליך להתחיל בטיפול בו שוב אם אתה עומד לעבור ניתוח מתוכנן.
- אתה סובל ממחלה חמורה קצרת טווח (חריפה) כגון זיהום או פציעה.

ילדים מתחת לגיל 12

אין מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בהימפבזי בילדים מתחת לגיל 12. אין להשתמש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 12.

בדיקות ומעקב

אם את אישה, לפני תחילת השימוש בהימפבזי הרופא יפנה אותך לבצע בדיקת היריון.

תרופות אחרות והימפבזי

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

עליך להכיר את התרופות שאתה נוטל. שמור רשימה של התרופות כדי להראות אותה לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

היריון והנקה

אין מידע על השימוש בהימפבזי בקרב נשים בהיריון. שימוש בהימפבזי במהלך ההיריון עלול לפגוע בעובר. אם את יכולה להיכנס להיריון, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול בהימפבזי ובמשך חודשיים לאחר המנה האחרונה של הימפבזי.

הרופא יפנה אותך לבצע בדיקת היריון בטרם תתחילי בטיפול בהימפבזי. אם את בהיריון, חושבת שאולי את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, התייעצי עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

ספרי לרופא מייד אם תהרי או תחשבי שאת עשויה להיות בהיריון במהלך הטיפול בהימפבזי.

לא ידוע אם הימפבזי מופרש בחלב אם.

אם את מניקה, התייעצי עם הרופא אם להפסיק להניק או להפסיק להשתמש בהימפבזי. הרופא ישקול את התועלת שבשימוש בהימפבזי מול היתרונות עבור התינוק היונק.

נהיגה ושימוש במכונות

להימפבזי אין השפעה, או שהינו בעל השפעה מוגבלת על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הימפבזי מכיל 0.2 מ"ג פוליסורבט 80 בכל מ"ל. פוליסורבטים עלולים לגרום לתגובות אלרגיות. ספר לרופא אם יש לך אלרגיות ידועות.

הימפבזי מכיל פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה, כלומר נחשב "נטול נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

הטיפול יתחיל תחת פיקוח של רופא מוסמך לטיפול בחולי המופיליה. יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. הרופא ינחה אותך לגבי הפסקת הטיפול הנוכחי בעת מעבר מתרופות מבוססות פקטור, או שאינן מבוססות פקטור להימפבזי. פנה לרופא אם אינך בטוח מה לעשות. אם אתה חולה מאוד או צריך לעבור ניתוח גדול, ספר לרופא שאתה משתמש בהימפבזי.

כיצד ניתן הימפבזי

- הימפבזי ניתן בהזרקה מתחת לעור (הזרקה תת-עורית). אין להזריק לווריד או לשריר.
- לקבלת הזרקה נוחה יותר, ניתן להניח את הימפבזי להתחמם בטמפרטורת החדר בתוך האריזה, הרחק מאור שמש ישיר, למשך כ-15 עד 30 דקות לפני השימוש. אין לחמם את הימפבזי בשום דרך אחרת. לדוגמה, אין לחמם במים חמים או במיקרוגל.

לפני השימוש הראשון בעט ההזרקה, הרופא, האחיות או הרוקח יראו לך ו/או למטפל שלך כיצד להזריק את הימפבזי. **אם אתה מזריק את הימפבזי בעצמך או אם המטפל שלך מזריק אותו, עליך או על המטפל לקרוא בעיון ולפעול לפי ההוראות המפורטות לשימוש המופיעות בהמשך של עלון זה.**

היכן להזריק את הימפבזי

- הרופא או האחיות יראו לך ו/או למטפל שלך אילו אזורים בגוף מיועדים להזרקה הימפבזי. המקום הטוב ביותר להזרקה הימפבזי הוא אזור הבטן או הירך. הזרקות לישבן צריכות להתבצע רק על ידי מטפל, רופא או אחות.
- יש להחליף את מקום ההזרקה בגוף בכל פעם שמבצעים הזרקה.
- אם נדרשות יותר מהזרקה אחת כדי לתת את המנה המלאה, כל הזרקה צריכה להתבצע באזור הזרקה שונה.
- אם אתה משתמש בתרופות אחרות שיש להזריק מתחת לעור, יש לבצע את ההזרקות הללו באזורי הזרקה שונים.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **המינון המקובל בדרך כלל הוא:**
- הטיפול שלך יתחיל במנת העמסה ולאחר מכן יימשך במנת תחזוקה הניתנת אחת לשבוע:
 - מנת העמסה (מנת פתיחה גבוהה יותר כדי להעלות במהירות את הרמות בגוף): המנה המומלצת היא 300 מ"ג.
 - מנת תחזוקה: המנה המומלצת היא 150 מ"ג.

יש להשתמש בתרופה זו פעם בשבוע (בכל שעה ביום) באותו יום בכל שבוע. מומלץ לרשום באיזה יום בשבוע אתה משתמש בהימפבזי כדי לעזור לך לזכור להזריק את התרופה פעם בשבוע. בהתאם לתגובה להימפבזי, הרופא עשוי לשנות את מנת התחזוקה לפי הצורך, עד למקסימום של 300 מ"ג בשבוע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בקרב מתבגרים

הימפבזי ניתן לשימוש בקרב מתבגרים מגיל 12 ומעלה. מתבגר יכול להזריק את התרופה בעצמו, בתנאי שהרופא או האחיות וההורה או המטפל מסכימים לכך, והמטופל עבר הדרכה מתאימה לביצוע ההזרקה.

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר

אם השתמשת בכמות גדולה יותר של הימפבזי מהכמות הנדרשת, פנה לרופא מייד. ייתכן שאתה בסיכון לפתח תופעות לוואי כגון קרישי דם ותזדקק לטיפול רפואי. תמיד השתמש בהימפבזי בדיוק כפי שהרופא הנחה אותך ובדוק עם הרופא, הרוקח או האחיות אם אינך בטוח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להזריק את הימפבזי בזמן המיועד, הזרק את המנה שנשכחה בהקדם האפשרי לפני היום של המנה הבאה המתוכננת. לאחר מכן המשיך להזריק את התרופה לפי התוכנית. אין להזריק מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. אם שכחת שתי מנות מתוכננות ברצף (כלומר עברו יותר מ-13 ימים מאז ההזרקה האחרונה), פנה לרופא בהקדם האפשרי ושאל מה לעשות. אם אינך בטוח מה לעשות, שאל את הרופא, הרוקח או האחיות.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש בהימפבזי

אל תפסיק להשתמש בהימפבזי מבלי להתייעץ עם הרופא. אם תפסיק להשתמש בהימפבזי, ייתכן שלא תהיה מוגן מפני דימומים. אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתרופה זו, פנה לרופא, לרוקח או לאחות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהימפבזי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מייד אל הרופא אם מופיעות תופעות לוואי חמורות:

- **קרישי דם (אירועים תרומבואמבוליים).** הימפבזי עלול להגביר את הסיכון לקרישת דם בכלי הדם בזרוע, ברגל, בריאה או בראש, תופעה העלולה להיות מסכנת חיים. הפסק את השימוש בהימפבזי ופנה לרופא מייד אם אתה מפתח אחד מהסימנים או התסמינים של קרישי דם שלהלן:
 - נפיחות או כאב בזרועות או ברגליים
 - תחושת עילפון
 - אודם או שינוי צבע בזרועות או ברגליים
 - כאב ראש
 - קוצר נשימה
 - חוסר תחושה בפנים
 - כאב בחזה או בגב העליון
 - קצב לב מהיר
 - קצב לב מהיר או נפיחות בעין
 - קושי בראייה
 - הפרשת דם בשיעול
- **תגובות אלרגיות.** הימפבזי עלול לגרום לתגובות אלרגיות, לרבות פריחה וגרד. הפסק את השימוש בהימפבזי ופנה לרופא מייד אם אתה מפתח אחד או יותר מהתסמינים הבאים של תגובה אלרגית חמורה:
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה או בלשון
 - סחרחורת או עילפון
 - קושי בנשימה
 - קצב לב מהיר או פעימות לב הולמות בחזה
 - צפצופים
 - הזעה

תופעות לוואי נוספות

- **תופעות לוואי שכיחות מאוד** (עשויות להופיע ביותר מ-1 מכל 10 אנשים):
 - תגובה באזור ההזרקה (כולל גרד, נפיחות, התקשות, אדמומיות, חבורות, כאב)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקרר (2°C - 8°C). אין להקפיא.
- יש לשמור את העט המוכן לשימוש בקופסת הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- ניתן להוציא את הימפבזי מהמקרר ולאחסן באריזת הקרטון המקורית למשך עד 7 ימים בטמפרטורת החדר (30°C). אין להחזיר את הימפבזי למקרר לאחר אחסון בטמפרטורת החדר. אם הימפבזי היה בטמפרטורת החדר במשך יותר מ-7 ימים, יש להשליך אותו, גם אם נותרה בו תרופה שלא נעשה בה שימוש.
- אין לנער.
- הוצא את הימפבזי מהמקרר לפני השימוש. לקבלת הזרקה נוחה יותר, ניתן להניח את הימפבזי להתחמם בטמפרטורת החדר בתוך האריזה למשך כ-15 עד 30 דקות, הרחק מאור שמש ישיר, לפני השימוש.
- לפני השימוש בתרופה, יש לבדוק את התמיסה כדי לוודא שאין בה חלקיקים או שינוי צבע. אין להשתמש אם התרופה נראית עכורה, צהובה כהה, או מכילה פתיתים או חלקיקים.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

- sucrose
- L-Histidine monohydrochloride
- L-Histidine
- polysorbate 80
- disodium edetate

- water for injection

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הימפבזי הוא תמיסה שקופה וחסרת צבע עד צהבהבה בהירה להזרקה, המגיעה בעט מוכן לשימוש.

הימפבזי משווק באריזת קרטון המכילה עט מוכן לשימוש אחד.

בעל הרישום וכתובתו: פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה 4672509.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 181-17-38406

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אושר ב-06/2026.

הוראות שימוש

הימפבזי 150 מ"ג תמיסה להזרקה תת עורית בעט מוכן לשימוש

הוראות השימוש מכילות מידע על אופן ההזרקה של הימפבזי.

קרא את הוראות השימוש בעיון לפני השימוש בעט המוכן של הימפבזי ובכל פעם שאתה מקבל מרשם חוזר, שכן ייתכן שיש מידע חדש.

הרופא או האחיות צריכים להראות לך או למטפל שלך כיצד להכין ולהזריק את המנה של הימפבזי בצורה נכונה לפני השימוש הראשון.

אל תזריק לעצמך או לאחרים עד שהוסבר לך כיצד להזריק את הימפבזי.

מידע חשוב

- כל עט מוכן לשימוש של הימפבזי מיועד למנה אחת בלבד. העט המוכן לשימוש מכיל 150 מ"ג של הימפבזי להזרקה מתחת לעור (תת-עורית).
- אין להזריק הימפבזי לווריד.
- אין לנער את הימפבזי.
- כדי לזכור מתי להזריק את הימפבזי, ניתן לסמן מראש ביומן. פנה לרופא, לאחות או לרוקח אם יש לך או למטפל שלך שאלות לגבי אופן ההזרקה הנכון.

אופן האחסון של הימפבזי


- יש לאחסן את הימפבזי שלא נעשה בו שימוש במקרר בטמפרטורה של 2°C - 8°C . אין להקפיא את הימפבזי. יש לאחסן באריזת הקרטון המקורית להגנה מפני אור ישיר.
- במידת הצורך, ניתן לאחסן את הימפבזי באריזת הקרטון המקורית בטמפרטורת החדר (עד 30°C) למשך עד 7 ימים. אין להשתמש בהימפבזי אם שהה מחוץ למקרר יותר מ-7 ימים. יש להשליך את הימפבזי אם נשמר בטמפרטורת החדר מעל 7 ימים.
- אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המודפס על אריזת הקרטון של הימפבזי.
- יש להרחיק את הימפבזי ואת כל התרופות מהישג ידם של ילדים.

ציוד נדרש להזרקת הימפבזי

יש להכין את הציוד הבא על משטח נקי וישר:


- 1 עט מוכן לשימוש של הימפבזי.
- 1 מטלית אלכוהול (לא כלולה באריזת הקרטון).
- 1 כדור צמר גפן או פד גזה (לא כלול באריזת הקרטון).
- 1 מכל לפינוי פסולת חדה להשלכת העט המוכן לשימוש (לא כלול באריזת הקרטון).

הימפבזי עט מוכן לשימוש



הימפבזי עט מוכן לשימוש

עט הימפבזי לפני השימוש:



עט הימפבזי לאחר השימוש:




הכנה להזרקת הימפבזי

שלב 1 – הכנה

- **הוצא את העט מאריזת הקרטון והרחק אותו מאור שמש ישיר.**
 - **ודא שהשם הימפבזי מופיע על אריזת הקרטון ועל תווית העט המוכן לשימוש.**
 - **בדוק את העט** לפגם הנראה לעין כגון סדקים או דליפות.
 - **רחץ את ידיך ויבש אותן.**
 - **אין להסיר את המכסה עד אשר תהיה מוכן להזריק.**
 - **השלך (פנה) את העט המוכן לשימוש אם הוא פגום, או אם העט או אריזת הקרטון המכילה את העט נפל/ה.**
 - **אין להשתמש בעט אם:**
 - הוא אוחסן באור ישיר. חשיפה לאור החדר במהלך הכנת המנה וההזרקה היא קבילה.
 - הוא הוקפא או הופשר, או אם היה מחוץ למקרר יותר מ-7 ימים.
- הערה:** להזרקה נוחה יותר, הנח לעט להתחמם לטמפרטורת החדר באריזת הקרטון הרחק מאור שמש ישיר במשך כ- 15 עד 30 דקות.
- אין להשתמש בכל שיטה אחרת לחימום העט, כגון חימום העט במיקרוגל או במים חמים.**

שלב 2 – בדיקת תאריך התפוגה



- **בדוק** את תאריך התפוגה (EXP) המודפס על תווית העט המוכן לשימוש.
- **אין** להשתמש בעט אם תאריך התפוגה (EXP) חלף.

שלב 3 – בדיקת התרופה



- **בדוק** את התרופה בקפידה דרך החלון שעל העט.
 - התרופה צריכה להיות צלולה וחסרת צבע עד בעלת צבע צהוב בהיר.
 - **אין** להשתמש בעט אם התרופה עכורה, בעלת צבע צהוב כהה, או מכילה פתיתים או חלקיקים.


הערה: נוכחות בועות אוויר בחלון היא תקינה.

אם יש לך שאלות לגבי התרופה, פנה לרופא, לאחות או לרוקח.

שלב 4 – בחירה וניקוי של מקום ההזרקה

שלב
4

בחירה וניקוי של מקום ההזרקה



אזור הבטן:

שמור על מרחק של לפחות
5 ס"מ מהטבור

**האזור הקדמי
של הירך**



עכוז:

איש צוות רפואי
או מטפל בלבד

- **בחר** מקום הזרקה באזור הבטן או באזור הקדמי של הירך, אלא אם כן הרופא או האחיות הציע/ה מקום אחר. כמו כן, הימפבזי ניתן להזרקה לעכוז על ידי איש צוות רפואי או מטפל בלבד. שמור על מרחק של לפחות 5 ס"מ מהטבור.
- **שנה** את מקום ההזרקה בכל פעם שאתה מזריק לעצמך הימפבזי, הרחק מכל תרופה אחרת הניתנת מתחת לעור. באפשרותך להשתמש באותו אזור בגוף, אך הקפד לבחור מקום הזרקה שונה באותו אזור.
- **נקה** את מקום ההזרקה במים וסבון, או במגבון אלוהול.
- **הנח** למקום להתייבש. **אין** לגעת, לאוורר או לנשוף על מקום ההזרקה שנוקה.
- **אין** להזריק הימפבזי לתוך אזורים גרמיים או אזורי עור חבולים, אדומים, כאובים (רגישים) או קשים. הימנע מהזרקה לתוך אזורים עם צלקות או סימני מתיחה.
- **אין** להזריק הימפבזי לתוך וריד.
- **אין** להזריק הימפבזי דרך הבגדים.

שלב 5 – הסרת המכסה בתנועה סיבובית



- הסר את המכסה באמצעות **סיבוב ומשיכה**.
- **השלך** מייד את המכסה למכל לפינוי פסולת חדה. לא תזדקק לו שוב.

הערה:


- הופעת מספר טיפות תרופה בקצה המחט היא תקינה.
- מכסה המחט יישאר בתוך מכסה העט לאחר הסרת מכסה העט.

אזהרה: יש לטפל בעט בזהירות מאחר שהוא מכיל מחט.

אין להניח או ללחוץ את כף היד על פני מגן המחט. פעולה זו עלולה לגרום לפציעה מדקירת מחט.

שלב הזרקת

שלב 6 – הזרקת התרופה



- אחוז בעט במצב ישר (בזווית של 90°) כנגד העור שנוקה כך שתוכל לראות את החלון.
 - לחץ על העט כלפי מטה בחוזקה כנגד העור והמשך ללחץ עד השלמת ההזרקה. תשמע את הנקישה הראשונה עם תחילת ההזרקה.
 - המשך ללחץ על העט בחוזקה כנגד העור, בעוד הפס הצהוב נע לאורך החלון. תשמע נקישה שנייה כאשר ההזרקה כמעט הושלמה.
 - ספור לאט עד 5 לאחר הישמע הנקישה השנייה כדי לוודא שקיבלת מנה מלאה.
- אין להוציא את העט מהעור עד אשר תספור לאט עד 5 לאחר הישמע הנקישה השנייה ועד אשר הסמן הצהוב ימלא את החלון במלואו (ראה "שלב 7 – הוצאת העט").
- הערה:** המחט חודרת לתוך העור בעת לחיצת העט כלפי מטה. הרופא או האחיות עשויים להציע לצבוט את העור בעדינות במהלך ההזרקה.
- הערה:** אם אינך שומע נקישה בעת לחיצת העט כנגד העור, נסה להגביר את הלחץ כלפי מטה. אם עדיין אינך מצליח להתחיל את ההזרקה, השתמש בעט הימפבזי חדש.
- אזהרה:** אם תשנה את דעתך לגבי מקום ההזרקה לאחר החדרת המחט לתוך העור, תצטרך להשליך (לפנות) את העט ולהשתמש בעט הימפבזי חדש.

שלב 7 – הוצאת העט



- הוצא את העט מהעור.
○ אם אתה רואה טיפת תרופה קטנה על העור, המתן פרק זמן מעט ממושך יותר טרם הוצאת העט בעת ההזרקה הבאה.

הערה: לאחר הוצאת העט מהעור, מגן המחט יכסה את המחט באופן אוטומטי ויינעל במקומו.

העט אינו ניתן לשימוש חוזר.

שלב 8 – בדיקת החלון



- בדוק את החלון כדי לוודא שכל התרופה הוזרקה.

אם הפס הצהוב אינו נמצא במצב המוצג, משמעות הדבר היא שלא קיבלת מנה מלאה. פנה לרופא, או לאחות לעזרה.

אין להזריק מנה נוספת.

שלב 9 – טיפול לאחר ההזרקה



- **לחץ** בעדינות כדור צמר גפן או פד גזה נקי על פני מקום ההזרקה למשך מספר שניות אם אתה רואה טיפת דם.
 - **אין** לשפשף את האזור.
- הערה:** אם הדימום אינו נעצר, פנה לרופא או לאחות.
- הערה:** אם המנה שנרשמה לך דורשת 2 הזרקות של הימפבזי, חזור על השלבים 1-9. שנה (החלף) את מקום ההזרקה בכל פעם שאתה מזריק לעצמך הימפבזי. באפשרותך להשתמש באותו אזור בגוף, אך הקפד לבחור מקום הזרקה שונה באותו אזור.

שלב 10 – פינוי העט



- **השלך** את העט המשומש למכל לפינוי פסולת חדה מייד לאחר השימוש.
- **אין** להשליך (לפנות) עטים לאשפה הביתית.