

- סבלת מקרישי דם בעורק בעין (חסימה של כלי דם ברשתית) או בלב (התקף לב). ספר לרופא אם אתה מבחין בשינויים פתאומיים בראייה (ראייה מטושטשת, אובדן ראייה חלקי או מלא), כאבים בחזה, קוצר נשימה מאחר שאלה עשויים להיות סימנים של קרישי דם בעורקים.

סיכון לתסמינים עצביים, כולל הפרעות בשמיעה:

- יש לכנות לרופא/ה או הרוקח/ת:
- לפני ובמהלך הטיפול בליטפולו אם אתה סובל מתסמינים לא מוסברים הנגרמים מבעיה במערכת העצבים.
- אם במהלך הטיפול בליטפולו אתה חש בירידה בשמיעה.

מניעת היריון והיריון

אין להשתמש בליטפולו במהלך היריון. אם את אישה שיכולה להיכנס להיריון, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל בזמן הטיפול בליטפולו, ולפחות במשך חודש נוסף לאחר מנת הטיפול האחרונה. הרופא יכול ליעץ לגבי אמצעי מניעה מתאימים. ספרי לרופא מייד אם נכנסת להיריון או אם את חושבת שייתכן שאת בהיריון במהלך הטיפול מאחר שליטפולו יכולה להזיק לעובר.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il

או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפיזור במייל:

isr.aereporting@pfizer.com

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ברטיס זה נוסח בלשון זכר. על אך זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

ברטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות באוקטובר 2024.

**ברטיס מידע בטיחותי
למטופל
ליטפולו LITFULO
(ריטלסיטיניב Ritlecitinib)**



שם המטופל/ת:

שם הרופא/ה (שרשמו ליטפולו):

מספר טלפון של הרופא/ה:

תאריך התחלת הטיפול בליטפולו:

מידע בטיחותי למטופלים על ליטפולו (Litfulo):

- כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני הטיפול בליטפולו ובמהלכו.
- למידע נוסף, יש לקרוא את העלון לצרכן הנכלל בכל אריזה של ליטפולו.
- יש להתייעץ עם רופא/ה או רוקח/ת אם מידע כלשהו אינו ברור.

עליך לשאת איתך את הכרטיס ולהראות אותו לכל איש מקצוע רפואי המעורב בטיפול הרפואי, לדוגמה, רוקחים או רופאי רפואה דחופה.

מהו ליטפולו ולמה הוא נועד:

ליטפולו (Litfulo) מכיל את החומר הפעיל ריטלסטיניב (Ritlecitinib). הוא משמש לטיפול בקרחת אזורית ומתבגרים מגיל 12. קרחת אזורית (אלופסיה אראטה) היא מחלה שבה מערכת החיסון של הגוף עצמו תוקפת זקיקי שיער וגורמת לדלקת המובילה לאובדן שיער בקרקפת, פנים ו/או אזורים אחרים בגוף.

ליטפולו פועלת על ידי הפחתת הפעילות של אנזימים הנקראים JAK3 קינאז ו TEC קינאז אשר מעורבים בדלקת בזקיק השערה. זה מפחית את הדלקת וגורם לצמיחת שיער במטופלים עם קרחת אזורית.

עליך להכיר תופעות לוואי מסוימות ונושאים המפורטים להלן. עליך להודיע לרופא/ה שלך אם יש לך תופעות לוואי כלשהן:

סיכון לזיהומים

- יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת לפני ובמהלך הטיפול בליטפולו אם:
- אתה סובל מזיהום (סימנים אפשריים יכולים להיות חום, הזעה, צמרמורות, כאבי שרירים, שיעול, קוצר נשימה, דם בליחה, ירידה במשקל, שלשולים, כאבי בטן, צריבה בעת מתן שתן, הטלת שתן בתכיפות גבוהה יותר מהרגיל, מרגיש מאוד עייף).
- אתה חולה או שחלית בעבר בשחפת, או שהיית במגע קרוב עם אדם חולה שחפת, או שאתה גר או מטייל

באזורים בהם שחפת מאוד שכיחה. הרופא יפנה אותך לבדיקת שחפת לפני הטיפול בליטפולו וייתכן שגם במהלך הטיפול.

- סבלת בעבר מהרפס (כמו אבעבועות רוח או שלבקת חוגרת), מאחר שליטפולו עלולה לגרום להתפרצות נוספת. ספר לרופא אם אתה מפתח פריחה כואבת בעור עם שלפוחיות מאחר שזה עלול להיות סימן לשלבקת חוגרת.

חיסונים:

יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת אם קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון - בגלל שחיסונים חיים מסויימים אינם מומלצים במהלך הטיפול בליטפולו, או מייד לפני התחלת הטיפול.

סיכון לסרטן:

לא ברור אם ליטפולו מגדילה את הסיכון לחלות בסרטן, והרופא ידון איתך לגבי מידת התאמת הטיפול עבורך, ולגבי הצורך במעקב, כולל בדיקות עור שגרתיות שיידרשו במהלך הטיפול.

סיכון לקרישי דם בורידים או בריאות:

- יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת אם את/ה:
- סבלת מקרישי דם בוורידי הרגליים (פקקת בוורידיים עמוקים) או בריאות (תסחיף ריאתי). ספר לרופא אם הרגל שלך הופכת לנפוחה וכואבת, אם יש לך כאבים בחזה או קוצר נשימה, מאחר שאלה עלולים להיות סימנים לקרישי דם בוורידיים.