

אוגוסט 2026

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

אנו רוצים להביא לידיעתך כי עלונים לרופא ולצרכן של תכשירים

Minirin tablets 0.1mg

Minirin tablets 0.2mg

עודכנו בהתאם לחוזר המחלקה לרישום תכשירים בנושא "מסלול הודעה (נוטיפיקציה) לעדכון עלונים של תכשירים הומניים ווטרינריים – עדכון ינואר 2026".

שם תכשיר:

Minirin tablets 0.1mg

Minirin tablets 0.2mg

חומר פעיל:

Each tablet of **Minirin tablets 0.1 mg** contains 0.1 mg of desmopressin acetate.

Each tablet of **Minirin tablets 0.2 mg** contains 0.2 mg of desmopressin acetate.

התוויה:

Central Diabetes Insipidus, Nocturnal Enuresis (in patients from 5 years of age with normal ability to concentrate the urine) and for symptomatic treatment of nocturia in adults associated with nocturnal polyuria, i.e. nocturnal urine production exceeding bladder capacity.

The treatment must be started before the age of 65.

העדכונים העיקריים המהווים החמרות במידע בטיחותי מפורטים בטבלאות מטה. אלו רק חלק מעדכונים שבוצעו, למידע מלא עבור העדכונים יש לעיין בעלון המצורף.

בעלון לרופא	
פרק	העדכון מטה מכיל רק מידע חדש שהתווסף בפרק זה. למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא
4.2 Posology and method of administration	Food intake can reduce the intensity and duration of the antidiuretic effect at low doses of orally administered desmopressin. Desmopressin acetate should always be taken at the same time in relation to meals (see section 4.5)

FERRING

PHARMACEUTICALS

Musculoskeletal and connective tissue disorders. Uncommon (0.1-1%) : Muscle spasms, Myalgia Other special populations: Elderly patients and patients with serum sodium levels in the lower range of normal may have an increased risk of developing hyponatraemia (see section 4.4).	4.8 Undesirable effects
--	---

בעלון לצרכן	
פרק	העדכון מטה מכיל רק מידע חדש שהתווסף בפרק זה. למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא
2. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:	מזון מפחית את הספיגה של דסמופרסין אצטט. כדי להבטיח שהמינון הנכון ייספג, חשוב להקפיד ליטול תרופה זו תמיד באותו תזמון ביחס לארוחות.
3. כיצד תשתמש בתרופה?	יש ליטול תרופה זו באופן קבוע באותו תזמון ביחס לארוחות. אכילת מזון עשויה להפחית את כמות התרופה הנספגת בגוף ולקצר את משך השפעתה.
4. תופעות לוואי	הפסק את נטילת התרופה ופנה לרופא או לבית חולים הקרוב מייד אם אתה מרגיש: כאב ראש חזק מאוד או ממושך, כאב בטן, בלבול, עלייה בלתי מוסברת במשקל, בחילות, הקאות, סחרחורת, תחושה של אי נוחות כללית, פגיעה בזיכרון, תחושה שאתה מסתחרר, מסתובב (ורטיגו) או נופל.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום באתר האינטרנט של אגף הרוקחות.

ניתן גם לקבל את העלונים בעותק קשיח ע"י פניה לבעל הרישום: חברת פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ, רחוב השיטה 8 קיסריה.

בברכה,
אורית זוזוט

מנהלת רגולציה ואיכות
פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ