

دليل جيب للمريض

دليل لتحديد علامات وأعراض الآثار الجانبية المحتملة أثناء تلقي العلاج المناعي،
بما في ذلك الأعراض الجانبية المتوسطة بالمناعة

يرجى وضع علامة وفقا للعلاج المناعي
الذي يتلقاه المتعالج

☐ أوبديفو كفانتيج®

☐ أوبديفو®

☐ أوبديفو® + يرقوي®

☐ يرقوي®

للحصول على نسخة من دليل الجيب هذا، يرجى الاتصال
بشركة بريستول مايرس سكويب
على رقم الهاتف: 03-5231021، فاكس: 03-9226896
أو عبر البريد الإلكتروني: Office_IL@bms.com

افصل بطاقة المعلومات واحملها معك في جميع الأوقات

■ املاً تفاصيل الاتصال بالطبيب أخصائي علاج الأورام

اقرأ المعلومات الواردة في الدليل واستعمل قائمة العلامات والأعراض
لتحديد ما يجب عليك الإبلاغ عنه على الفور

■ اتصل بالطبيب أخصائي الأورام الذي يعالجك على الفور إذا واجهت أي
شيء غير طبيعي أثناء العلاج بـ أوبديفو® أو بـ يرقوي® أو أوبديفو كفانتيج®

■ اتصل بالطبيب أخصائي علاج الأورام إذا كنت تواجه أي من الأعراض
المرجحة في قائمة العلامات والأعراض أو إذا كانت تتفاقم.

قد يساعد الحصول على علاج طبي بشكل فوري في منع تفاقم المشكلة

أبرز هذه البطاقة أثناء أي زيارات خارج شبكة الرعاية الصحية
الخاصة بك

■ أخبر فريق الرعاية العاجلة/غرفة الطوارئ أنك تتعالج بـ أوبديفو أو يرقوي
أو أوبديفو كفانتيج® وأعرض عليهم القسم المخصص للأطباء/المرضى
الذي يحتوي على معلومات مهمة في بطاقة المعلومات هذه.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو و يرقوي و أوبديفو كفانتيج التي تظهر في
الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بنواء
أوبديفو و يرقوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

افصل بطاقة المعلومات واحملها معك في جميع الأوقات

- املاً اسم الدواء (الأدوية) للعلاج (للعلاجات المناعية) التي وصفها الطبيب إخصائي الأورام
- املاً اسم المتعالج
- املاً اسم طبيب إخصائي الأورام ورقم هاتفه
- يجب الاحتفاظ ببطاقة المعلومات في محفظة المتعالج

احرص على إخبار جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين
تزورهم بأنك تتلقى العلاج المناعي، وأبرز لهم هذه البطاقة.

اعرض بطاقة المعلومات هذه في كل زيارة لمركز
الرعاية العاجلة / غرفة الطوارئ.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

נא להתקשר לאונקולוג שלי. Please call my oncologist.

קיבלתי טיפול אימונוטרפי הנקרא: I have received an immunotherapy called:

שם התכשיר(ים): (סמן את המתאים)	OPDIVO Qvantig® / OPDIVO® / YERVOY® / OPDIVO® + YERVOY®
שם המטופל/ת:	
שם האונקולוג:	
מספר טלפון של האונקולוג:	
אעرض هذه البطاقة في كل مرة تقابل فيها فرد من الطاقم الطبي	

©2026 Bristol-Myers Squibb Company.

חשוב

מידע עבור רופאים/אחיות

הגישה לטיפול בתופעות לוואי הנגרמות
מאימונוטרפיה עשויה להיות שונה
מטיפולים אחרים לסרטן

אין להמתין עם הענקת טיפול למטופל
במקרה שנדרש טיפול דחוף



שים לב

**התקשר
לרופא האונקולוג
של המטופל**

למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא הישראלי של אופדיבו ושל יירבוי ובעלון לרופא של אופדיבו קוונטיג המצורף לארזיות התכשיר.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>



احتفظ بهذا الدليل في متناول يدك حتى تتمكن من مراجعته عند الحاجة. يحتوي الدليل على قائمة مفيدة بالعلامات والأعراض التي يجب عليك مراقبة ظهورها عن كثب. اتصل بطاقم علاج الأورام إذا كانت لديك هذه العلامات أو الأعراض، أو إذا كانت تتفاقم.

هذه ليست جميع الأعراض الجانبية المحتملة لـ أوبديفو® (نيقُولوماب)، أو يرفوي® (إيبيليموماب)، أو أوبديفو كفاتنتيج® (نيقُولوماب و هيلورونيداز-خفحي). لهذا السبب يجب عليك الإبلاغ عن أي عدم راحة أو تغييرات في شعورك إلى طاقم علاج الأورام.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرفوي وأوبديفو كفاتنتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفاتنتيج المرفقة بالعبوة

الغدد التي تنتج الهرمونات

- حالات صداع لا تزول أو حالات صداع غير معهودة
- حساسية في العينين للضوء
- مشاكل العينين
- ضربات قلب سريعة
- زيادة التعرق
- تعب شديد
- زيادة الوزن أو فقدان الوزن
- الشعور بالعطش أو الجوع زيادة عن المعتاد
- التبول بوتيرة أعلى من المعتاد
- تساقط الشعر
- الشعور بالبرد
- الإمساك
- ازدياد غلظة الصوت
- الدوخة أو الإغماء
- تغييرات في المزاج أو تغييرات سلوكية، مثل انخفاض الرغبة الجنسية، العصبية أو النسيان

الجلد

- طفح
- حكة
- ظهور بثور في الجلد أو تقشير في الجلد
- انتفاخ في العقد الليمفاوية
- تقرحات أو قروح مؤلمة
- في تجويف الفم أو الأنف، في الحلق أو في منطقة الأعضاء التناسلية
- حُمى أو أعراض شبيهة بالانفلونزا
- ظهور بثور في الجلد أو تقشير في الجلد
- انتفاخ في العقد الليمفاوية
- تقرحات أو قروح مؤلمة
- في تجويف الفم أو الأنف، في الحلق أو في منطقة الأعضاء التناسلية
- حُمى أو أعراض شبيهة بالانفلونزا

الرئتين

- سعال
- آلم في الصدر
- ضيق التنفس

الكلى

- انخفاض في كمية البول
- ظهور دم في البول
- تورم في الكاحلين
- فقدان الشهية

الأمعاء

- الإسهال (البراز الرخو) أو نشاط معوي بوتيرة أكثر من المعتاد
- براز أسود، يشبه القطران، لزج، أو براز مع الدم أو المخاط
- آلم شديد أو حساسية شديدة في منطقة البطن

قد يرتبط يرفوي بمشاكل في العينين مع علامات وأعراض تشمل عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة أو مشاكل الرؤية الأخرى، والألم أو الاحمرار في العين

الكبد

- اصفرار الجلد أو بياض العينين
- غثيان أو تقيؤ شديد
- آلم في الجانب الأيمن من البطن
- البول الداكن (بلون الشاي)
- الميل إلى النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر من المعتاد

الأعضاء الأخرى

قد تظهر مشاكل أيضا في الأعضاء والأنسجة الأخرى. هذه ليست جميع علامات وأعراض المشاكل في الجهاز المناعي التي قد تظهر عند استعمال أوبديفو أو يرفوي أو أوبديفو كفاتنتيج. اتصل أو توجه فورا إلى الطبيب الذي يعالجك إذا ظهرت علامات أو أعراض جديدة أو إذا طرأ تفاقم على العلامات أو الأعراض، والتي يمكن أن تشمل:

- آلام في الصدر، عدم انتظام ضربات القلب، ضيق في التنفس أو تورم في الكاحلين
- الارتباك، النعاس، مشاكل في الذاكرة، تغييرات في المزاج أو تغييرات في السلوك، تيبس الرقبة، مشاكل في التوازن، الوخز أو الخدر في الذراعين أو الساقين
- رؤية مزدوجة، عدم وضوح الرؤية، حساسية للضوء، آلم في العينين، تغييرات في الرؤية
- آلام في العضلات أو ضعف عضلي مستمر أو شديد، تقلصات عضلية
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، الميل للكدمات

لا تعالج الأعراض بنفسك

يمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء العلاج

لا تشعر بالحرج أو بأنك تسبب الإزعاج للطبيب أخصائي الأورام الذي يعالجك

المضاعفات، بما في ذلك داغ الطعم حيال النَّوَيّ [Graft-versus-host disease (GVHD)] لعملية زرع نخاع العظم (الخلايا الجذعية)، التي تستخدم خلايا جذعية من متبرع (زراعة خيفية). قد تكون هذه المضاعفات شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة. وقد تحدث هذه المضاعفات إذا خضعت لعملية الزراعة إما قبل العلاج بادوية أوبديفو، أو يرفوي، أو أوبديفو كفاتنتيج أو بعده. سيقوم الطبيب المعالج بمراقبة هذه المضاعفات.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرفوي وأوبديفو كفاتنتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفاتنتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة

أوبديفو® (نيقولوماب) ويرقوي® (إبيليموماب) وأوبديفو كفانتيج® (نيقولوماب وهيالورونيداز-نفحي) هي أدوية قد تُستخدم لعلاج أنواع معينة من السرطان من خلال العمل مع جهازك المناعي.

يمكن أن يتسبب أوبديفو ويرقوي وأوبديفو كفانتيج في مهاجمة الجهاز المناعي لأعضاء وأنسجة سليمة في أي منطقة من جسمك والتأثير على كيفية أدائها. يمكن أن تصبح هذه المشاكل في بعض الأحيان خطيرة أو مهددة للحياة وقد تؤدي إلى الوفاة.

قد تظهر هذه المشاكل في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء العلاج. من المحتمل أن تواجه أكثر من مشكلة واحدة من هذه المشاكل في نفس الوقت.

قد تحدث بعض هذه المشاكل بشكل متكرر أكثر عند استعمال أوبديفو بالدمج مع يرقوي أو مع علاج إضافي آخر.

يمكن أن يسبب يرقوي اعراض جانبية خطيرة في أجزاء كثيرة من جسمك يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. قد تظهر هذه المشاكل في أي وقت أثناء العلاج ب يرقوي أو بعد انتهاء العلاج.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرقوي و أوبديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرقوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

تذكيرات مهمة للمرضى

- اتصل فوراً بالطبيب أخصائي الأورام إذا كانت لديك أعراض تظهر في قائمة العلامات والأعراض أو إذا كانت تتفاقم، أو إذا واجهت أي شيء غير طبيعي أثناء العلاج ب أوبديفو® (نيقولوماب) أو ب يرقوي® (إبيليموماب) أو أوبديفو كفانتيج® (نيقولوماب وهيالورونيداز-نفحي). قد يساعد الحصول على علاج طبيّ بشكل فوري في منع هذه المشكلة من التفاقم.
- هذه ليست جميع الأعراض الجانبية المحتملة ل أوبديفو أو يرقوي أو أوبديفو كفانتيج. لذلك، يجب عليك الإبلاغ عن أي عدم راحة أو تغيرات في شعورك إلى الطاقم المعالج المختص بالأورام
- لا تعالج الأعراض والعلامات بنفسك دون التحدث إلى الطبيب أخصائي الأورام
- قد يقرر الطبيب أخصائي الأورام تأخير أو إيقاف العلاج بدواء أوبديفو، أو أوبديفو + يرقوي، أو يرقوي أو أوبديفو كفانتيج، أو إعطائك أدوية أخرى لعلاج الأعراض

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرقوي و أوبديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرقوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيفولوماب)، يرفوي® (إيبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو® + يرفوي

ما هي أهم المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها حول أوبيدقو® + يرفوي؟

أوبيدقو و يرفوي هما دواءان من شأنهما علاج أنواع معينة من السرطان عن طريق العمل مع جهاز المناعة. يمكن أن يتسببا أوبيدقو و يرفوي في مهاجمة الجهاز المناعي لأعضاء وأنسجة سليمة في أي منطقة من جسمك والتأثير على كيفية عملها. يمكن أن تصبح هذه المشاكل في بعض الأحيان خطيرة أو مهددة للحياة وأن تؤدي إلى الوفاة. قد تظهر هذه المشاكل في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء علاجك قد تعاني من أكثر من مشكلة واحدة من هذه المشاكل في نفس الوقت. قد تحدث بعض هذه المشاكل بشكل متكرر أكثر عند استعمال أوبيدقو بالدمج مع علاج إضافي آخر.

اتصل أو توجه على الفور إلى الطبيب المعالج إذا ظهرت عليك علامات أو أعراض جديدة أو إذا طرأ تفاقم على العلامات والأعراض، بما في ذلك:

- **مشاكل في الرئتين:** سعال؛ ضيق في التنفس؛ آلام في الصدر
- **مشاكل في الأمعاء:** الإسهال (براز رخو) أو نشاط معويّ بوتيرة أكثر من المعتاد؛ براز اسود، يشبه القطران، لزج أو البراز مع الدم أو المخاط؛ ألم شديد أو حساسية شديدة في منطقة البطن

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو و يرفوي و أوبيدقو كفاتنيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو و يرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفاتنيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيفولوماب)، يرفوي® (إيبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو® + يرفوي (يتبع)

قد تظهر مشاكل أيضا في أعضاء أخرى وفي أنسجة أخرى. هذه ليست جميع علامات وأعراض مشاكل الجهاز المناعي التي قد تحدث عند استعمال أوبيدقو و يرفوي. اتصل أو توجه على الفور إلى الطبيب المعالج إذا كانت تظهر علامات أو أعراض جديدة أو إذا طرأ تفاقم في العلامات أو في الأعراض، والتي يمكن أن تشمل:

- آلام في الصدر، عدم انتظام ضربات القلب، ضيق في التنفس أو تورم في الكاحلين
- ارتباك، نعاس، مشاكل في الذاكرة، تغيرات في المزاج أو تغيرات السلوك، تيبس الرقبة، مشاكل في التوازن، الوخز أو الخدر في الذراعين أو في الساقين
- الرؤية المزدوجة، عدم وضوح الرؤية، الحساسية للضوء، ألم في العينين، تغيرات في الرؤية
- آلام العضلات أو ضعف عضلي مستمر أو شديد، تقلصات عضلية
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، الميل إلى الكدمات

رفض عضو أو نسيج مزروع. سيخبرك الطبيب المُعالج ما هي العلامات والأعراض التي عليك التبليغ عنها وسيقوم بإجراء متابعة بحسب نوع عملية الزرع التي خضعت لها.

قد يساعد الحصول على علاج طبيّ فوري في منع تفاقم هذه المشاكل. سيقوم الطاقم الطبي بفحصك فيما يتعلق بهذه المشاكل أثناء العلاج وقد يعالجك بأدوية كورتيكوستيرويدية أو بدائل الهرمونات. قد يضطر الطاقم الطبي أيضا إلى تأخير العلاج أو إيقافه تماما في حال كنت تعاني من أعراض جانبية خطيرة.

الأعراض الجانبية المحتملة لـ أوبيدقو® + يرفوي أوبيدقو وأوبيدقو® + يرفوي قد يسببان أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك:

- **انظر "ما هي أهم المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها حول أوبيدقو® + يرفوي"**
- **ردود فعل شديدة مرتبطة بالتسريب.** أخبر الطاقم الطبي على الفور إذا كنت تعاني من الأعراض التالية أثناء تسريب أوبيدقو أو يرفوي: قشعريرة أو رجفة؛ الحكة أو الطفح؛ احمرار الوجه؛ ضيق في التنفس أو الصفير عند التنفس؛ الدوخة؛ الإحساس بالإغماء؛ حمى؛ ألم في الظهر أو في العنق
- **المضاعفات، بما في ذلك داء الطُعم حيال الثَّويّ [Graft-versus-host disease (GVHD) لعملية زرع نخاع العظم (الخلايا الجذعية)]، التي تستخدم خلايا جذعية من متبرع (زراعة خيفية).** قد تكون هذه المضاعفات شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة. وقد تحدث هذه المضاعفات إذا خضعت لعملية الزراعة إما قبل العلاج بدواء أوبيدقو، أو يرفوي أو بعده. سيقوم الطبيب المعالج بمراقبة هذه المضاعفات.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو و يرفوي و أوبيدقو كفاتنيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو و يرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفاتنيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيفولوماب)، يرفوي® (إيبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو + يرفوي (يتبع)

تشمل الآثار الجانبية المحتملة الشائعة جدًا لدواء أوبيدقو عند إعطائه بمفرده ما يلي: الشعور بالتعب؛ الضعف، الشعور العام بالتوعل؛ الحمى؛ تورم (وذمة)، بما في ذلك تورم في اليدين، الكاحلين أو القدمين (وذمة محيطية)؛ الإسهال؛ الغثيان؛ التقيؤ؛ ألم في البطن؛ الإمساك؛ عسر الهضم؛ صعوبة في البلع؛ طفح؛ حكة، بما في ذلك الحكة المنتشرة؛ البهاق، وهو مرض تظهر فيه بقع فاتحة على الجلد؛ حمى تتجلى في احمرار والتهاب الجلد؛ آلام في العضلات، في العظام وفي المفاصل، الصداع، الدوخة؛ عدوى مسالك التنفس العلوية؛ احتقان الأنف؛ الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي الذي ينطوي على الشعب الهوائية؛ السعال، السعال مع البلغم؛ ضيق في التنفس، ضيق في التنفس أثناء المجهود؛ انخفاض الشهية؛ فقدان الوزن؛ آلام الظهر؛ انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية [قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)] الذي يمكن أن يسبب التعب وزيادة الوزن، مستويات عالية من هرمون الغدة الدرقية [فرط الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)] الذي يمكن أن يسبب سرعة ضربات القلب، التعرق وفقدان الوزن؛ مشاكل في الغدة الدرقية، بما في ذلك التهاب الغدة الدرقية؛ خلل في وظائف الكلى؛ عدوى في المسالك البولية؛ التهاب الكبد؛ ارتفاع ضغط الدم؛ ارتفاع مستوى السكر في الدم (فرط سكر الدم)؛ الأرق؛ خدر، ألم، وخز أو حرقان في اليدين أو القدمين (اعتلال عصبي محيطي)؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر؛ ردود الفعل المرتبطة بالتسريب.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا لأوبيدقو عند استخدامه بالاشتراك مع

علاج كيميائي يحتوي على البلاتين ودواء كيميائي إضافي: الشعور بالتعب؛ شعور عام بتوعل؛ تورم (وذمة)؛ الحمى؛ الغثيان؛ الإمساك؛ التقيؤ؛ الإسهال؛ ألم في البطن؛ انخفاض الشهية؛ طفح جلدي؛ حكة؛ تساقط الشعر؛ خدر؛ ألم وخز أو حرقان في اليدين أو القدمين (اعتلال عصبي محيطي)؛ صداع؛ ألم في العضلات، في العظام وفي المفاصل؛ عدوى في المسالك البولية؛ مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) التي يمكن أن تسبب شعور بالتعب وزيادة في الوزن؛ اختلال في أداء وظائف الكلى؛ ظهور دم في البول؛ فقدان في الوزن؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا لأوبيدقو عند استخدامه بالاشتراك مع

يرفوي: الشعور بالتعب؛ حمى؛ تورم (وذمة)؛ طفح؛ حكة؛ حكة منتشرة؛ جفاف الجلد؛ الإسهال؛ الغثيان؛ التقيؤ؛ ألم في البطن؛ الإمساك؛ انتفاخ البطن نتيجة تراكم السوائل (داء الاستسقاء)؛ جفاف الفم؛ عسر الهضم؛ صعوبة في البلع؛ قرح أو تقرحات في تجويف الفم (التهاب الفم)؛ التهاب القولون؛ ألم في العضلات، في العظام وفي المفاصل، السعال، السعال مع البلغم؛ ضيق في التنفس، وضيق في التنفس أثناء المجهود؛ التهاب رئوي؛ عدوى في مسالك التنفس العلوية؛ التهاب في أنسجة الرئة (التهاب رئوي) يتميز بسعال وصعوبات في التنفس، ضيق التنفس والسعال؛ انخفاض الشهية؛ الصداع؛ دوخة؛ الأنفلونزا؛ مرض يشبه الأنفلونزا؛ الضعف، الشعور العام بالتوعل؛ قشعريرة؛ انخفاض ضغط الدم؛ انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية [قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)] والذي يمكن أن يتسبب بالتعب

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو ويرفوي و أوبيدقو كفاتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفاتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيفولوماب)، يرفوي® (إيبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو + يرفوي (يتبع)

وزيادة الوزن. مستويات عالية من هرمون الغدة الدرقية [فرط الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)] الذي يمكن أن يتسبب بسرعة ضربات القلب، التعرق وفقدان الوزن؛ قصور الغدة الكظرية (انخفاض في مستوى الهرمونات التي تفرزها الغدة الكظرية، التي تقع فوق الكلى)؛ فقدان الوزن؛ أرق؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا لأوبيدقو عند استخدامه بالاشتراك مع

يرفوي وعلاج كيميائي يحتوي على البلاتين ودواء كيميائي إضافي: الشعور بالتعب؛ حمى؛ ألم في العضلات، في العظام وفي المفاصل؛ الغثيان؛ الإسهال؛ الإمساك؛ التقيؤ؛ ألم في البطن؛ طفح؛ الحكة، بما في ذلك الحكة المنتشرة؛ تساقط الشعر؛ انخفاض الشهية؛ السعال؛ ضيق في التنفس؛ انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية [قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)] الذي يمكن أن يتسبب بالتعب وزيادة الوزن؛ صداع؛ دوخة؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا لأوبيدقو عند استخدامه بالاشتراك مع

كابورنتينيب: الإسهال، الغثيان، ألم في البطن؛ التقيؤ؛ عسر الهضم؛ الشعور بالتعب أو الضعف؛ مشاكل في الكبد؛ سمية كبدية؛ طفح، احمرار، ألم، تورم أو ظهور بثور في راحتي اليدين أو باطن القدمين؛ تقرحات أو قروح في تجويف الفم (التهاب الفم)؛ طفح؛ الحكة؛ ارتفاع ضغط الدم؛ انخفاض مستويات هرمون الغدة [قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)] والذي

يمكن أن يتسبب بالتعب وزيادة الوزن؛ ألم في العضلات، العظام والمفاصل؛ انخفاض الشهية؛ تغير في حاسة الذوق؛ صداع؛ سعال؛ اضطرابات الصوت (صعوبة في التكلم بسبب اضطرابات في البلعوم، الحبال الصوتية، في اللسان أو الفم)؛ عدوى في مسالك التنفس العلوية؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا لأوبيدقو عند استخدامه بالاشتراك مع

علاج كيميائي يحتوي على فلورويبريميدين والبلاتين: خدر، ألم، وخز أو حرقان في اليدين أو القدمين (اعتلال عصبي محيطي)؛ الصداع؛ الغثيان؛ الإسهال؛ التقيؤ؛ صعوبة في البلع؛ ألم في البطن؛ الإمساك؛ تقرحات أو قروح في تجويف الفم (التهاب الفم)؛ الشعور بالتعب؛ حمى؛ تورم (وذمة)؛ انخفاض الشهية؛ فقدان الوزن؛ ألم في العضلات، في العظام وفي المفاصل؛ طفح، الحكة؛ تساقط الشعر؛ طفح، احمرار، ألم، تورم أو ظهور بثور في اليدين أو القدمين؛ السعال، السعال مع البلغم، عدوى في مسالك التنفس العلوية؛ التهاب رئوي، الأرق؛ نتائج غير طبيعية لفحوصات المختبر.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو ويرفوي و أوبيدقو كفاتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفاتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيقؤلوماب)، يرفوي® (إبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو + يرفوي (يتبع)

تشمل الأعراض الجانبية الشائعة جدا لـ يرفوي: إحساس بالتعب، الإسهال؛ الغثيان؛ الحكة؛ طفح؛ التقيؤ، حمى؛ انخفاض الشهية؛ ألم في العضلات، العظام وفي المفاصل؛ السعال، السعال مع البلغم؛ ضيق في التنفس، وضيق في التنفس أثناء المجهود؛ عدوى في مسالك التنفس العلوية.

هذه ليست كل الأعراض الجانبية المحتملة. لمزيد من المعلومات، توجه إلى الطبيب الذي يقوم بعلاجك أو الصيدلي. من المهم إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية الناجمة عن الأدوية بوصفة طبية.

يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد العلاج بالعقاقير" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجهك إلى النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن أعراض جانبية، أو من خلال الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il>

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو ويرفوي و أوبيدقو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو® (نيقؤلوماب)، يرفوي® (إبيليموماب) وتوليفة من أوبيدقو + يرفوي (يتبع)

قبل العلاج بـ أوبيدقو أو يرفوي، أخبر طبيبك عن حالتك الطبية بما في ذلك إذا:

- كنت تعاني من مشاكل متعلقة بجهاز المناعة مثل مرض كرون، التهاب القولون التقرحي للأمعاء الغليظة أو الذئبة
- خضعت لعملية زرع أعضاء، وهذا يشمل زرع القرنية
- خضعت أو على وشك الخضوع لعملية زرع خلايا جذعية، عندما تكون عملية الزرع من متبرع (زراعة خيفية)
- خضعت سابقا للعلاج الإشعاعي في منطقة الصدر وتلقيت أدوية أخرى مشابهة لـ أوبيدقو
- كنت تعاني من حالة تؤثر على الجهاز العصبي، مثل ضعف العضلات الشديد (الوهن العضلي الوبيل) أو متلازمة تسمى غيلان باريه (Guillain-Barré syndrome)
- كنت حاملا أو تخططين للحمل. قد يتسببان أوبيدقو ويرفوي بضرر لجنينك
- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. من غير المعروف ما إذا كان أوبيدقو أو يرفوي يمكنهما الانتقال إلى حليب الأم. يُمنع الإرضاع أثناء العلاج بـ أوبيدقو أو يرفوي ولمدة 5 أشهر بعد تلقي آخر جرعة من أوبيدقو وكذلك لمدة 3 أشهر بعد تلقي آخر جرعة من يرفوي.

النساء اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل:

يجب أن يقوم الطبيب الذي يقوم بعلاجك بإجراء فحص الحمل لك قبل البدء في تلقي أوبيدقو أو يرفوي.

■ يجب عليك استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 5 أشهر بعد تلقي آخر جرعة من أوبيدقو ولمدة 3 أشهر بعد تلقي آخر جرعة من يرفوي. استشير الطبيب المعالج بخصوص وسائل منع حمل التي يمكنك استعمالها خلال هذه الفترة.

■ ابلي الطبيب الذي يقوم بعلاجك على الفور إذا أصبحت حاملا أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل خلال العلاج بـ أوبيدقو أو بـ يرفوي.

أخبر الطبيب الذي يعالجك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية بوصفة طبية والأدوية بدون وصفة طبية، الفيتامينات، المكملات الغذائية والمكملات العشبية.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيدقو ويرفوي و أوبيدقو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيدقو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيدقو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة المهمة الخاصة بعقار أوبيديفو كفانتيج® (نيقُولوماب و هيالورونيداز - نفحي)

ما أهم المعلومات التي ينبغي أن أعرفها عن أوبيديفو كفانتيج؟

أوبيديفو كفانتيج عبارة عن دواء قد يُستخدم لعلاج أنواع معينة من السرطان من خلال العمل على جهازك المناعي. يمكن أن يتسبب أوبيديفو كفانتيج في مهاجمة جهازك المناعي للأعضاء والأنسجة الطبيعية في أي منطقة من جسمك، ويمكن أن يؤثر على طريقة عملها. ويمكن أن تصبح هذه المشكلات خطيرة أحياناً أو قد تؤدي إلى الوفاة. قد تحدث هذه المشكلات في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء علاجك. وقد تُصاب بأكثر من مشكلة واحدة من هذه المشكلات في الوقت نفسه. وقد تحدث بعض هذه المشكلات بوتيرة أكبر عند استخدام أوبيديفو كفانتيج في توليفة مع علاج آخر.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو راجعه فوراً إذا ظهرت لديك أي علامات أو أعراض جديدة أو متفاقمة، بما في ذلك:

- **مشكلات الرئة:** السعال؛ ضيق التنفس؛ ألم في الصدر
- **مشكلات الأمعاء:** الإسهال (براز رخو) أو زيادة عدد مرات التبرز عن المعتاد؛ براز أسود، أو قطراني، أو لزج، أو يحتوي على دم أو مخاط؛ ألم شديد أو إيلام عند لمس منطقة المعدة (البطن)
- **مشكلات الكبد:** اصفرار الجلد أو بياض العينين؛ غثيان شديد أو تقيؤ؛ ألم في الجانب الأيمن من منطقة المعدة (البطن)؛ بول داكن اللون (بلون الشاي)؛ حدوث نزيف أو تكدم بسهولة أكبر من المعتاد
- **مشكلات الغدد الهرمونية:** حالات صداع لا يزول أو حالات صداع غير

معتاد؛ حساسية العين للضوء؛ مشكلات في العين؛ تسارع ضربات القلب؛ زيادة التعرق؛ تعب شديد؛ زيادة أو نقصان الوزن؛ الشعور بالجوع أو العطش أكثر من المعتاد؛ التبول المتكرر أكثر من المعتاد؛ تساقط الشعر؛ الشعور بالبرد؛ الإمساك؛ يصبح صوتك أكثر غلظة؛ الدوخة أو الإغماء؛ تغيرات في المزاج أو السلوك، مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو التهيج أو النسيان

- **مشكلات الكلى:** نقص في كمية البول؛ وجود دم في البول؛ تورم الكاحلين؛ فقدان الشهية
- **مشكلات الجلد:** طفح جلدي؛ حكة؛ ظهور بثور على الجلد أو تقشره؛ تورم العقد اللمفاوية، أو تقرحات أو قروح مؤلمة في الفم أو الأنف، أو الحلق، أو المنطقة التناسلية؛ الحمى أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة المهمة الخاصة بعقار أوبيديفو كفانتيج® (نيقُولوماب و هيالورونيداز - نفحي) (يتبع)

قد تحدث مشكلات أيضاً في أعضاء وأنسجة أخرى. وهذه ليست جميع العلامات والأعراض المتعلقة بـمشكلات الجهاز المناعي التي قد تحدث مع أوبيديفو كفانتيج. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو راجعه فوراً عند ظهور أي علامات أو أعراض جديدة أو متفاقمة، والتي قد تشمل:

- ألم في الصدر، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو ضيق التنفس، أو تورم الكاحلين
- الارتباك، أو النعاس، أو مشكلات الذاكرة، أو تغيرات في المزاج أو السلوك، أو تيبس الرقبة، أو مشكلات التوازن، أو الشعور بالوخز أو الخدر في الذراعين أو الساقين
- ازدواجية الرؤية، أو تشوش الرؤية، أو الحساسية للضوء، أو ألم العين، أو تغيرات في البصر
- ألم عضلي مستمر أو شديد، أو ضعف عضلي، أو تشنجات عضلية
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، أو التكدّم.
- **رفض عضو أو نسيج مزروع.** ينبغي أن يوضّح لك مقدم الرعاية الصحية العلامات والأعراض التي يجب عليك الإبلاغ عنها، وأن يراقب حالتك وفقاً لنوع زراعة العضو أو النسيج التي قد خضعت لها.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

قد يساعد الحصول على العلاج الطبي فوراً في منع تفاقم هذه المشكلات. سيفحصك مقدم الرعاية الصحية للكشف عن هذه المشكلات أثناء العلاج بعقار أوبيديفو كفانتيج. وقد يعالجك مقدم الرعاية الصحية بأدوية الكورتيكوستيرويد أو بأدوية بديلة للهرمونات. قد يحتاج مقدم الرعاية الصحية أيضاً إلى تأخير العلاج بأوبيديفو كفانتيج أو إيقافه تماماً إذا ظهرت لديك آثار جانبية شديدة.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة المهمة الخاصة بعقار أوبديفو كفانتيج® (نيفولوماب و هياالورونيداز - نفحي) (يتبع)

ما الآثار الجانبية المحتملة لأوبديفو كفانتيج؟

قد يسبب أوبديفو كفانتيج آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك:

■ راجع "ما أهم المعلومات التي ينبغي أن أعرفها عن أوبديفو كفانتيج؟"

■ مضاعفات، بما في ذلك داء الطعم حيال الثوي (GVHD)، لدى الأشخاص الذين قد خضعوا لزراعة نخاع العظم (الخلايا الجذعية) باستخدام خلايا جذعية من متبرع (زراعة خيفية). قد تكون هذه المضاعفات شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة. وقد تحدث هذه المضاعفات إذا خضعت لعملية الزراعة قبل العلاج بأوبديفو كفانتيج أو بعده.

سيقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبتك للكشف عن علامات المضاعفات إذا كنت قد خضعت لزراعة خلايا جذعية خيفية.

ترد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي لوحظت مع نيفولوماب المُعطى عن طريق الوريد (نيفولوماب الوريدي)، والتي قد تحدث مع أوبديفو كفانتيج، موضحة في نشرة المعلومات المرفقة داخل العبوة.

لمزيد من المعلومات بشأن الآثار الجانبية المحتملة، اسأل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي الخاص بك. ويُشجّع على الإبلاغ عن الآثار الجانبية للعقاقير الموصوفة طبيًا إلى وزارة الصحة.

يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وزارة الصحة من خلال النقر على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد العلاج بالعقاقير" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّهك إلى النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية، أو من خلال الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il>

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرفوي و أوبديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

معلومات السلامة المهمة الخاصة بعقار أوبديفو كفانتيج® (نيفولوماب و هياالورونيداز - نفحي) (يتبع)

الإثاث القادرات على الحمل:

- ينبغي على مقدم الرعاية الصحية إجراء اختبار حمل قبل البدء في تلقي أوبديفو كفانتيج.
- ينبغي عليك استخدام وسيلة فعّالة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 5 أشهر بعد آخر جرعة من أوبديفو كفانتيج. تحدثي مع مقدم الرعاية الصحية حول وسائل منع الحمل التي يمكنك استخدامها خلال هذه الفترة.
- أخبري مقدم الرعاية الصحية فورًا إذا أصبحت حاملاً أو كنتِ تظنين أنك قد تكونين حاملاً أثناء العلاج بأوبديفو كفانتيج.

أخبري مقدم الرعاية الصحية عن جميع الأدوية التي تتناولينها، بما في ذلك الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة، والفيتامينات، والمكملات الغذائية، والمكملات العشبية.

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرفوي و أوبديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 8-17، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 17-8، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبيديفو ويرفوي و أوبيديفو كفانتيج التي تظهر في الصفحات 17-8، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسرائيلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبيديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبيديفو كفانتيج المرفقة بالعبوة

قائمة التحقق من العلامات والأعراض

هل لديك أي علامات أو أعراض؟

1. إذا لاحظت أي عدم راحة أو تغيرات في شعورك، فاقصّل بطاقتك العلاج أخصائي الأورام على الفور.
 2. قد يساعد تلقي علاجاً طبياً فوراً في منع تفاقم هذه المشاكل. ولا تحاول علاج أي آثار جانبية محتملة بنفسك.
 3. قد يقرر طبيب أخصائي الأورام تأخير أو إيقاف العلاج تماماً بدواء أوبديفو® (نيقولوماب) أو يرفوي® (إيبيليموماب)، أو أوبديفو كفاتنتيج® (نيقولوماب وهيلورونيداز - نفحي) أو إعطائك أدوية أخرى لعلاج الأعراض.
- ◀ هذه ليست كل الأعراض الجانبية المحتملة لـ أوبديفو أو يرفوي أو أوبديفو كفاتنتيج. لهذا السبب يجب عليك الإبلاغ عن أي عدم راحة أو تغيرات في شعورك إلى الطاقم المعالج أخصائي الأورام. تشمل العلامات أو التغيرات التي يجب الانتباه إليها:



الكبد

- اصفرار الجلد أو بياض العين
- غثيان أو تقيؤ شديدين
- ألم في الجانب الأيمن من منطقة البطن
- البول داكن (بلون الشاي)
- الميل إلى النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر من المعتاد



الرئتين

- سعال
- ألم في الصدر
- ضيق التنفس



الجلد

- الطفح
- الحكة
- ظهور بثور في الجلد أو
- تقشر الجلد
- انتفاخ في العقد الليمفاوية
- تقرحات أو قروح مؤلمة
- في تجويف الفم أو الأنف، في الحلق أو في منطقة
- الأعضاء التناسلية
- حمى أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا



الكلية

- انخفاض في كمية البول
- ظهور الدم في البول
- تورم في الكاحلين
- فقدان الشهية



ردود الفعل المرتبطة بالتسريب

- قشعريرة أو رجفة
- حكة أو طفح
- احمرار
- ضيق في التنفس أو صفير عند التنفس
- انتفاخ في فروج مؤلمة
- دوخة
- الإحساس بالإغماء
- حمى
- ألم في الظهر أو في الرقبة



الغدد التي تنتج الهرمونات

- حالات صداع لا تنقضي أو حالات صداع غير معهودة
- حساسية في العينين للضوء
- مشاكل العينين
- ضربات قلب سريع
- زيادة التعرق
- التعب الشديد
- زيادة الوزن أو فقدان الوزن
- الشعور بالعطش أو الجوع أكثر من المعتاد
- التبول بوتيرة أكثر من المعتاد
- تساقط الشعر
- الشعور بالبرد
- الإسهال
- ازدياد غلظة الصوت
- الدوخة أو الإغماء
- تغيرات في المزاج أو تغيرات سلوكية، مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو العصبية أو النسيان



الأعضاء الأخرى

- قد تظهر مشاكل أيضاً في الأعضاء والأنسجة الأخرى. هذه ليست جميع علامات وأعراض المشاكل في الجهاز المناعي التي قد تظهر عند استعمال أوبديفو أو يرفوي أو أوبديفو كفاتنتيج
- اتصل أو توجه فوراً إلى الطبيب الذي يعالجك إذا ظهرت علامات أو أعراض جديدة أو إذا طرأ تفاقم على العلامات أو الأعراض، والتي يمكن أن تشمل:
- الألم في الصدر، أو عدم انتظام ضربات القلب، ضيق في التنفس أو تورم في الكاحلين
- الارتباك، النعاس، مشاكل في الذاكرة، تغيرات في المزاج أو تغيرات السلوك، النعاس، تيبس الرقبة، مشاكل في التوازن، الوخز أو الخدر في الذراعين أو في الساقين
- الرؤية المزدوجة، عدم وضوح الرؤية، الحساسية للضوء، ألم في العينين، تغيرات في الرؤية
- ألم في العضلات أو ضعف عضلي مستمر أو شديد، تقلصات عضلية
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، الميل إلى الكدمات



الأمعاء

- الإسهال (براز رخو) أو نشاط معوي بوتيرة أعلى من المعتاد
- براز أسود، يشبه القطران، لزج أو
- براز مع الدم أو المخاط
- ألم شديد أو حساسية شديدة في منطقة البطن

قد يرتبط يرفوي بمشاكل في العينين مع علامات وأعراض تشمل عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة أو مشاكل الرؤية الأخرى، والألم أو الاحمرار في العين. المضاعفات، بما في ذلك داء الطعم حيال الثوي [Graft-versus-host disease (GVHD)] لعملية زرع نخاع العظم (الخلايا الجذعية)، التي تستخدم خلايا جذعية من متبرع (زرعة خفيفة). قد تكون هذه المضاعفات شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة. وقد تحدث هذه المضاعفات إذا خضعت لعملية الزراعة إما قبل العلاج بأدوية أوبديفو، أو يرفوي، أو أوبديفو كفاتنتيج أو بعده. سيقيم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك مراقبة هذه المضاعفات.

إذا كان لديك أعراض جانبية خطيرة، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. إذا حدث هذا، يجب عليك:

- أن تحضر معك بطاقة المعلومات وقائمة كاملة بالأدوية التي تتناولها بما في ذلك الأدوية بوصفة طبية وبدون وصفة طبية، الفيتامينات، المكملات الغذائية والمكملات العشبية
- إبلاغ الأطباء والممرضات في غرفة الطوارئ أنك تتلقى علاجاً مناعياً لعلاج مرضك
- التأكد من أن يتم إبلاغ طاقم العلاج أخصائي الأورام الخاص بك

يرجى النظر إلى معلومات السلامة الهامة حول أوبديفو ويرفوي و أوبديفو كفاتنتيج التي تظهر في الصفحات 17-18، وكذلك في نشرة وصف الدواء الإسراييلية الكاملة ونشرة المريض الخاصة بدواء أوبديفو ويرفوي، ونشرة المعلومات الخاصة بأوبديفو كفاتنتيج المرفقة بالعبوة