

ספטמבר 2026

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה

חברת אלי לילי ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלונים לרופא של התכשירים:

אומבו 100 מ"ג/מ"ל Omvoh 100 mg/ml

חומר פעיל: Mirikizumab 100 mg/ml
צורת מינון: Solution for injection

אומבו 300 מ"ג Omvoh 300 mg

חומר פעיל: Mirikizumab 20 mg/ml
צורת מינון: Concentrate for solution for infusion

ההתוויות המאושרות לתכשיר:

Ulcerative colitis

Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis who have had an inadequate response with, lost response to, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic treatment.

Crohn's disease

Omvoh is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active Crohn's disease who have had an inadequate response with, lost response to, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic treatment.

טקסט שהתווסף מסומן בכחול.

העלונים המעודכנים מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום: אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה, טל': 09-9606234.

בברכה,
רון שוורץ
רוקח ממונה
אלי לילי ישראל בע"מ

להלן העדכונים המרכזיים בעלון לרופא:

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Pharmacodynamic properties

[...]

Clinical efficacy and safety

Ulcerative colitis

[...]

Study extension

Patients who responded to mirikizumab induction treatment in LUCENT-1, who were then re-randomized to mirikizumab maintenance therapy during LUCENT-2 and completed 52 weeks of continuous mirikizumab treatment entered the long-term extension study LUCENT-3 (n = 316). Of the patients in clinical remission at week 52 (n = 179), 62.2 % maintained clinical remission, 65.5% achieved endoscopic improvement (i.e. endoscopic remission) and 52.8 % achieved histo-endoscopic mucosal remission (HEMR) at week 212.

[...]

Crohn's disease

[...]

Study extension

Patients who completed VIVID-1 through week 52 were eligible to continue treatment in the long-term extension study VIVID-2. Among VIVID-1 endoscopic responders who also achieved clinical remission by CDAI at week 52 and entered VIVID-2 (n = 191), 78.1 % maintained combined endoscopic response and clinical remission by CDAI at week 104 with continued mirikizumab treatment.

[...]