

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

אורקמבי 100 מ"ג/ג 125 מ"ג טבליות מצופות
אורקמבי 200 מ"ג/ג 125 מ"ג טבליות מצופות

חומרים פעילים וכמותם

אורקמבי 100 מ"ג/ג 125 מ"ג טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

100 מ"ג לומקפטור (lumacaftor)

125 מ"ג איבקפטור (ivacaftor)

אורקמבי 200 מ"ג/ג 125 מ"ג טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

200 מ"ג לומקפטור (lumacaftor)

125 מ"ג איבקפטור (ivacaftor)

חומרים בלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אורקמבי (לומקפטור ואיבקפטור) משמשת לטיפול ארוך טווח בליפת כיסתית (סיסטיק פיברוזיס-CF) במטופלים בני 6 שנים ומעלה שיש להם שינוי ספציפי (שנקרא מוטציה *F508del*) המשפיע על הגן לחלבון הנקרא נקט הולכה טרנסממברני של סיסטיק פיברוזיס, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), אשר הינו בעל תפקיד חשוב בויסות זרימת הריר בריאות. אנשים עם המוטציה ייצרו חלבון CFTR פגום. אורקמבי ניתנת למטופלים בהם שני העותקים של גן CFTR הנמצאים בתא מושפעים מהמוטציה *F508del*.

אורקמבי הינה טבלייה אחת המכילה שני חומרים פעילים, לומקפטור ואיבקפטור. שני אלו פועלים יחד כדי לשפר את תפקוד חלבון ה-CFTR הפגום. לומקפטור מגדיל את כמות ה-CFTR הזמין ואיבקפטור עוזר לחלבון הפגום לפעול בצורה יותר תקינה.

קבוצה תרופוטית: לומקפטור - מתקן CFTR
איבקפטור - פוטנציאטור של חלבון CFTR

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (איבקפטור או לומקפטור) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
היוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת אורקמבי.

אורקמבי מיועדת אך ורק למטופלים בעלי שני עותקים של המוטציה *F508del* בגן CFTR.

לפני הטיפול באורקמבי ספר לרופא אם נאמר לך בעבר כי אתה סובל ממחלת **כבד או כליות**, ייתכן שיהיה על הרופא להתאים את המינון של אורקמבי עבורך.

רמות חריגות של אנזימי כבד בבדיקות דם נראו באופן שכיח בחלק מהמטופלים המקבלים אורקמבי. פנה לרופא מיד עם הופעת אחד התסמינים הבאים העשויים להיות סימן לבעיות בכבד:

- כאב או אי-נוחות באזור הבטן הימנית העליונה
- הצהבה של העור או של החלק הלבן של העיניים
- חוסר תיאבון
- בחילות או הקאות
- שתן כהה
- בלבול

אורקמבי אינה מומלצת במטופלים שעברו **השתלת איברים**.

דיכאון (כולל מחשבות אובדניות, שינויים בהתנהגות, חרדה והפרעות שינה) אשר בדרך כלל התחיל במהלך 3 חודשי הטיפול הראשונים, דווח בחולים בעת נטילת אורקמבי. פנה מיד לרופא אם אתה (או מישהו הנוטל את התרופה) חווה אחד מהתסמינים הבאים, אשר עלולים להיות סימנים לדיכאון: מצב רוח עצוב או שינוי במצב הרוח, חרדה, תחושות של אי נוחות רגשית או מחשבות על פגיעה בעצמך או על התאבדות, ו/או קשיי שינה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

ילדים

טבליות אורקמבי אינן מיועדות לשימוש בילדים מתחת לגיל 6 שנים.

בדיקות ומעקב

הרופא יערוך לך מספר בדיקות דם כדי לבדוק את תפקוד הכבד לפני ובמהלך הטיפול באורקמבי, בעיקר במהלך השנה הראשונה.

הפרעות במערכת נשימה, כגון **קוצר נשימה או לחץ בחזה או היצרות דרכי הנשימה** נראו במטופלים שהתחילו לטול אורקמבי. במיוחד במטופלים עם תפקודי ריאה ירודים. אם אתה סובל מתפקוד ריאתי ירוד, הרופא שלך עשוי לבצע מעקב לעיתים קרובות יותר לאחר התחלת הטיפול באורקמבי.

עלייה בלחץ דם נצפתה בחלק מהמטופלים באורקמבי. הרופא שלך עשוי לנטר את לחץ הדם שלך במהלך הטיפול באורקמבי.

ממצא חריג בעדשת העין (קטרקט) ללא השפעה על הראייה, נצפתה בחלק מהילדים ובני הנוער שטופלו עם אורקמבי או איבקפטור (אחד מהמרכיבים באורקמבי).

הרופא שלך עשוי לבצע בדיקות עיניים לפני ובמהלך הטיפול באורקמבי.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח, לקחת לאחרונה או אם אתה עשוי לקחת, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות אנטביוטיות (משמשות לטיפול בזיהומים חידקיים) כגון טליתרומיצין, קלריתרומיצין, ריפאמפיצין, ריפאבוטין, ריפאפנטין ואריתרומיצין
- תרופות לטיפול בפרוסים (משמשות לטיפול בהתקפים אפילפטיים) כגון פנוברביטל, קרבמזפין ופניטואין
- בנזודיאזפינים (משמשים לטיפול בחרדה, קשיי שינה ואי שקט) כגון מידאזולם וטריאזולם
- תרופות אנטי-פטרייתיות (המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים) כגון פלוקונזול, קטוקונזול, איטרקונזול, פוסקונזול וווריקונזול
- מדכאי מערכת חיסון (בשימוש לאחר השתלה) כגון ציקלוספורין, אברולימוס, סירולימוס וטאקרולימוס
- צמחי מרפא כגון פרע מחורר (**היפריקום פרפורטום**)
- תרופות אנטי-אלרגיות (משמשות לטיפול באלרגיות ו/או אסתמה) כגון מונטלוקסט ופסופנאדין
- תרופות נוגדות דיכאון (משמשות לטיפול בדיכאון) כגון ציטאלופראם, אסציטאלופראם, סרטראלין ובופרופיון
- תרופות אנטי-דלקתיות (משמשות לטיפול בדלקת) כגון איבופרופן
- חוסמי הקולטן H₂ (משמשות להפחתה בחומצת קיבה) כגון ראניטידין
- גליקוזידים של הלב (משמשות לטיפול באי ספיקת לב וקצב לב חריג הנקרא פרפור פרזודורים, בחומרה קלה עד בינונית) כגון דיגוקסין
- נוגדי קרישה (משמשים למניעת היווצרות או גדילת קרישי דם בדם ובכלי הדם) כגון וורפארין ודאביגאטראן

- אמצעי מניעה הורמונליים (משמשים למניעת היריון) הניתנים דרך הפה, בהזרקה, אמצעי מניעה מושלם, מדבקות לעור, שכוללים אתניל אסטרדיול, נוראתינדרון ופרוגסטרונים אחרים. אין להסתמך על אמצעים אלו למניעת היריון בזמן השימוש באורקמבי
- קורטיקוסטרואידים (לטיפול בדלקת) כגון מתילפרדניסולון ופרדניסון
- מעכבי משאבת פרוטונים (משמשים לטיפול בריפולקס חומצי וכיבים) כגון אומפרזול, אסומפרזול ולאנסופרזול
- תרופות להורדת רמות הסוכר בדם הניתנות דרך הפה (משמשות לטיפול בסוכרת סוג 2) כגון רפאגליניד

קיימים דיווחים על תוצאות חיוביות שגויות בבדיקת שתן להימצאות טרהידרוקנבינול (THC – רכיב פעיל בקנאביס) במטופלים הנוטלים אורקמבי. ייתכן שהרופא שלך יבקש בדיקה נוספת על מנת לאמת את התוצאה.

שימוש בתרופה ומזון

נטילת אורקמבי עם מזון המכיל שומן חשובה על מנת לקבל רמות נכונות של התרופה בגופך. יש לאכול ארוחה שומנית או חטיף המכיל שומן מיידי לפני או מיידי אחרי נטילת אורקמבי. ארוחות וחטיפים מומלצים בהנחיות לטיפול ב-CF או ארוחות המומלצות בהנחיות תזונה רגילות מכילות כמות מספקת של שומן. דוגמאות לארוחות או חטיפים המכילים שומן הינן ארוחות הכוללות חמאה, שמנים או ביצים. דוגמאות אחרות למזון המכיל שומן:

- גבינות, חלב מלא, מוצרים מחלב מלא
- בשרים, דגים עם ריכוז שומן גבוה
- אבוקדו, חמוס, מוצרים על בסיס סויה (טופו)
- חטיפי אנרגיה או משקאות

היריון והנקה

אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון, או מתכננת להיכנס להיריון היועצי ברופא לפני השימוש בתרופה. ייתכן שעדיף יהיה להימנע משימוש באורקמבי בזמן היריון במידת האפשר. הרופא יסייע לך לקבל החלטה מה יהיה הטיפול הטוב ביותר עבורך ועבור תינוקך.

לומקפטור ואיבקפטור מופרשים בחלב אם. אם את מתכננת להניק, היועצי ברופא לפני נטילת אורקמבי. הרופא יחליט האם להמליץ לך להפסיק הנקה או להפסיק את הטיפול בלומקפטור/איבקפטור. הרופא ישקול את התועלת שבהנקה עבור תינוקך מול תועלת הטיפול עבורך.

נהיגה ושימוש במכוונות

סחרחורת דווחה במטופלים שקיבלו איבקפטור, אחד המרכיבים של אורקמבי, שיכול להשפיע על היכולת לנהוג או להשתמש במכוונות. אם אתה חווה סחרחורת, אין לנהוג או להשתמש במכוונות עד שתסמינים אלו ייעלמו.

אם ילדך חווה סחרחורת בזמן נטילת אורקמבי, מומלץ שהילד לא ירכב על אופניים או יעשה כל דבר אחר הדורש תשומת לב מלאה, עד שהתסמינים שלו ייעלמו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מ"ג/מ"ל (23 מ"ג) במנה, כך שלמעשה התרופה נחשבת כ"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **המינון המקובל** למטופלים מגיל 6 ומעלה בדרך כלל הוא 2 טבליות בבוקר ו 2 טבליות בערב (12 שעות הפרש), סה"כ 4 טבליות ליום, יש לקחת עם מזון שמכיל שומן.

ישנם מינונים שונים של טבליות אורקמבי עבור קבוצות גיל שונות. בדוק שקיבלת את הטבלייה הנכונה (להלן).

גיל	טבליות	מינון
6 עד 11 שנים	אורקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג	2 טבליות בבוקר 2 טבליות בערב
12 שנים ומעלה	אורקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג	2 טבליות בבוקר 2 טבליות בערב

ניתן להתחיל לקחת אורקמבי בכל אחד מימות השבוע.

אם אתה סובל מבעיות כבד ברמה מתונה עד חמורה, ייתכן שהרופא יפחית את המינון של אורקמבי, כיון שהכבד שלך אינו מפנה את אורקמבי באותה מהירות כמו באנשים שאינם סובלים מבעיות בתפקוד הכבד.

- בעיות כבד מתונות: ייתכן שהמינון יופחת לשתי טבליות בבוקר וטבלייה אחת בערב.
- בעיות כבד חמורות: ייתכן שהמינון יופחת לטבלייה אחת בבוקר וטבלייה אחת בערב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אורקמבי מיועדת לשימוש פומי. יש לבלוע את התרופה בשלמותה. אסור ללעוס, לשבור או להמיס את הטבליות.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לחוות תופעות לוואי כולל אלו המוזכרות בסעיף 4 בהמשך. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש וטרם חלפו 6 שעות מהמועד בו היית אמור לקחת את התרופה, קח את המנה שנשכחה עם מזון המכיל שומן. אחרת יש לדלג על המנה שנשכחה. יש ליטול את המנה הבאה במועד הקבוע. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את נטילת התרופה ללא היווצרות ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באורקמבי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי שדווחו עם אורקמבי ואיבקפטור לבדו (אחד המרכיבים הפעילים של אורקמבי), מפורטות להלן ועלולות להופיע בעת שימוש באורקמבי.

תופעות לוואי חמורות

סימנים אפשריים לבעיות בכבד

נזק לכבד והחמרה בתפקוד הכבד אצל אנשים עם או ללא מחלת כבד. תופעות לוואי חמורות של אורקמבי כוללות עלייה ברמת אנזימי כבד בדם, פגיעה בכבד, והחמרה של מחלת כבד חמורה קיימת. ההחמרה בתפקוד הכבד עלולה להיות קטלנית או להצריך השתלה (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). תופעות לוואי חמורות אלו אינן שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים). **דווח לרופא מייד** אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים:

- כאב או אי נוחות בבטן הימנית העליונה
- הצהבה של העור או בלובן של העין
- אובדן תיאבון
- בחילות או הקאות
- בלבול
- שתן כהה

דיכאון

הסימנים לכך כוללים מצב רוח עצוב או שינוי במצב הרוח, חרדה, תחושות של אי נוחות רגשית (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשמש 1 מתוך 10)

- שיעול עם ליחה
- גודש באף
- קוצר נשימה
- כאב ראש
- כאב בטן

- שלשול
- עלייה בכמות הליחה
- בחילה
- הצטננות*
- סחרחורת*
- שינויים בסוג החיידקים בריר*

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100)

- לחץ בחזה
- היצרות דרכי הנשימה
- גודש בסינוסים*
- נזלת או אף סתום
- דלקת בדרכי הנשימה העליונות
- כאב גרון
- אדמומיות בגרון*
- פריחה
- גזים
- הקאות
- עלייה באנזים בדם (קראטין פוספוקינאז בדם)
- רמות גבוהות של אנזימי כבד בבדיקות הדם
- מחזור לא סדיר (וסת) או כאב בזמן הוסת
- כאב אוזניים, אי נוחות באוזן*
- צלצולים באוזניים*
- אדמומיות בתוך האוזן*
- הפרעת האוזן הפנימית (תחושת סחרחורת או סחרור)*
- גוש בשד*

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- וסת חריגה, העדר וסת או וסת נדירה או וסת תכופה יותר או דימום וסתי כבד יותר
- עלייה בלחץ הדם
- גודש באוזן*
- דלקת בשד*
- הגדלה של השדיים בגברים*
- שינוי או כאב בפטמה*

* תופעות לוואי שנצפו עם איבקטור לבדו.

תופעות לוואי בילדים

תופעות הלוואי שנצפו אצל ילדים דומות לאלו שנצפו במבוגרים ובמתבגרים. עם זאת, רמות גבוהות של אנזימי כבד בדם נצפו בשכיחות גבוהה יותר בילדים צעירים מאשר במבוגרים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש באורקמבי אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון והתווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

אחסן מתחת ל-30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

- ליבת הטבליה מכילה:

microcrystalline cellulose, hypromellose acetate succinate USP/NF, croscarmellose sodium, povidone K30, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate.

- ציפוי הטבליה מכיל opadry II (pink) 85F140026
- צבע ההדפס מכיל opacode black, S-1-17823

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

אורקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות

טבלייה ורודה בצורה אובלית, עם הדפס של "1V125" בשחור על צד אחד וצד אחר חלק.

אורקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות

טבלייה ורודה בצורה אובלית, עם הדפס של "2V125" בשחור על צד אחד וצד אחר חלק.

כל אחד מהחוזקים של אורקמבי מגיע באריזה המכילה 112 טבליות מצופות (4 אריזות של 28 טבליות מצופות)

בעל הרישום וכתובתו

ורטקס פרמסוטיקלס (אירופה) בע"מ - סניף ישראל
רחוב ריב"ל 7, תל אביב-יפו, ישראל

שם היצרן וכתובתו

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent, Dublin 9, D09 T665, Ireland

נערך ביוני 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

אורקמבי 100 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות: 161-99-35506

אורקמבי 200 מ"ג/125 מ"ג טבליות מצופות: 157-84-34839

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.