

ספטמבר 2026

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ מבקשת להודיע על עדכונים בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון

Pitriya-T **פטרייה-טי**

התווית התכשיר:

Fungal infections of the skin caused by dermatophytes such as trichophyton (e.g. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum) Microsporum canis and Epidermophyton floccosum.

Yeast infections of the skin principally those caused by the genus Candida (e.g. candida albicans).

Pityriasis (tinea versicolor) due to pityrosporum orbiculare (also known as malassezia furfur).

For the treatment of plantar-type tinea pedis (Moccasin type).

מרכיבים פעילים:

Terbinafine Hydrochloride 1% w/w

צורת המתן של התכשיר: קרם

תוספת מסומנת כטקסט **אדום**. שינוי שמהווה החמרה מודגש **בצהוב**. כמו כן, בעלון בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <https://israeldrugs.health.gov.il>
ניתן לקבלו מודפס באמצעות פנייה לבעל הרישום, חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761, טל. 04-8475700

להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן

חומר פעיל וריכוזו ביחידת מינון:

כל 1 גרם מכיל 0.01 גרם טרבינפיין הידרוכלוריד (terbinifine hydrochloride 0.01 gram)
טרבינפיין הידרוכלוריד 1% w/w ————— 1% w/w
[.....]

2. לפני השימוש בתרופה

[.....]

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפטרייה-טי ספר לרופא אם אתה סובל ממחלה אחרת או אלרגיות.

[.....]

- התכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד. **הימנע ממגע** **אסור שהקרם יבוא במגע** עם העיניים. אם יש מגע של התכשיר בעיניים, **ייתכן שיופיע גירוי בעיניים**. במידה והתכשיר בא במגע עם העיניים בטעות, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי ויסודי תחת מים זורמים. אם מרגישת אי נוחות התסמינים אינם חולפים יש לפנות לרופא.
- יש למנוע מתינוקות ומילדים צעירים לבוא במגע עם אזורי עור מטופלים, כולל אזור השד.

[.....]

היריון, הנקה ופוריות

היריון

אם את בהיריון או מניקה, אם את חושבת שאת בהריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.

אין להשתמש בתכשיר אם את בהיריון, אלא אם קיבלת מרשם מהרופא.
אם את מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ עם הרופא לפני השימוש.

הנקה

אין להשתמש בתכשיר אם את מניקה, ויש להימנע ממגע של תינוקות וילדים צעירים עם אזור העור המטופל בתכשיר, לרבות השדיים. באזור המטופל בתכשיר.

נהיגה ושימוש במכוונות

לפטרייה תי אין השפעה על היכולת לנהוג והפעלת מכונות. אין מידע לגבי השפעה של פטרייה-תי על נהיגה ושימוש במכוונות.

[.....]

4. תופעות לוואי

[.....]

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא מיד אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות, היכולות להעיד על תגובה אלרגית:

- קשיי נשימה ובליעה
- התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון
- גרד חמור בעור בליווי פריחה אדומה אדמומיות או שלפוחיות מורמזות (גם מחוץ לאזור המריחה).

[.....]

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:

פצעם נזקים בעור, גלדים, הפרעות בעור, שינוי בגון העור, אדמומיות, תחושת צריבה בעור, כאב או גירוי באזור המריחה.

[.....]

תופעות לוואי נדירות מאוד – תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:

סרפדת, פריחה או פצעונים בעור שלפוחיות (חזזיות/חטטיות).