

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פטרייה-תי

חומר פעיל וריכוזו ביחידת מינון:

כל 1 גרם מכיל 0.01 גרם טרבינפין הידרוכלוריד (terbinafine hydrochloride 0.01 gram)
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה'
ופרק 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק
למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים
לאחר שבוע ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התכשיר הינו בעל פעילות אנטי פטרייתית רחבת טווח לטיפול בזיהומים פטרייתיים בעור.
קבוצה תרפויטית: אנטי פטרייתי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפטרייה-תי ספר לרופא אם אתה סובל ממחלה אחרת או אלרגיות.

- התכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אסור שהקדם יבוא במגע עם העיניים. אם יש מגע של התכשיר בעיניים, ייתכן שיופיע גירוי בעיניים. במידה והתכשיר בא במגע עם העיניים בטעות, יש לשטוף את העיניים באופן מיידי ויסודי תחת מים זורמים. אם התסמינים אינם חולפים יש לפנות לרופא.
- יש למנוע מתינוקות ומילדים צעירים לבוא במגע עם אזורי עור מטופלים, כולל אזור השד.
- במקרה של פטרת נרחבת בכף הרגל או אם הזיהום הפטרייתי מערב גם את הציפורניים, יש לפנות לרופא.
- אין למרוח תרופות נוספות על אזורי העור המטופלים.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל 12.
פטרייה-תי אינו מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל 12.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, הנקה ופוריות

היריון

אין להשתמש בתכשיר אם את בהיריון, אלא אם קיבלת מרשם מהרופא.
אם את מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה.

הנקה

אין להשתמש בתכשיר אם את מניקה, ויש להימנע ממגע של תינוקות וילדים צעירים עם אזור העור המטופל בתכשיר, לרבות השדיים.

נהיגה ושימוש במכונות

אין מידע לגבי השפעה של פטרייה-תי על נהיגה ושימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 150 מ"ג בנזיל אלקוהול באריזת 15 גרם ו- 300 מ"ג בנזיל אלקוהול באריזת 30 גרם. שווה ערך ל-10 מ"ג/גרם. בנזיל אלקוהול יכול לגרום לתגובות אלרגיות וגירוי מקומי בעור. פטרייה-תי מכיל צטיל אלקוהול וסטיאיריל אלקוהול העלולים לגרום לגירוי מקומי בעור, למשל אקזמה (Contact dermatitis).

3. כיצד להשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

בטרם השימוש בפטרייה-תי, יש לשטוף את האזור הנגוע ולייבשו היטב.

ניתן למרוח פטרייה-תי פעם או פעמיים ביום (בוקר ו/או ערב). יש למרוח בעדינות שכבה דקה של פטרייה-תי על האזור הנגוע וסביבו.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- פטרת כף הרגל המופיעה בין אצבעות הרגליים (Tinea Pedis), פטרת המפשעה, פטרת הגוף – יש למרוח פעם ביום למשך שבוע ימים.
- פטרת כף הרגל המופיעה על כף הרגל ו/או צדי הרגל (Plantar-type Tinea Pedis) (Moccasin type) – יש למרוח פעמיים ביום למשך שבועיים.
- פטרת בעור מסוג קנדידיאזיס (skin candidiasis) - פעם עד פעמיים ביום, למשך שבוע.
- פיטריאזיס ורסיקולור (פטרת השמש (קשקשת)) – למרוח פעם עד פעמיים ביום, למשך שבועיים.

במידה והטיפול הנו בקפלי עור, ניתן לכסות האזור בחבישת גזה, במיוחד בלילה. יש להחליף גזה בכל מריחה.

יש לשטוף ידיים לאחר כל מריחה על האזור הנגוע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

למניעת זיהום חוזר, יש לטפל בפטרת על פי ההוראות בעלון זה.

במידה ולא חל שיפור במצבך לאחר שבוע יש לפנות לרופא.

יש לטפל בפטרת במינונים המצויינים בעלון. אם אתה מרגיש שההשפעה של התרופה חזקה מדי או חלשה מדי, פנה לרופא או לרוקח.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אם בלעת מהתרופה, יש לפנות לרופא על מנת שייעץ כיצד לנהוג.

אם שכחת למרוח את התרופה בזמן הדרוש, אין למרוח מנה כפולה. מרח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

- על מנת להימנע מפטרת בכף הרגל יש לבצע את הפעולות הבאות:
- יש להחליף בכל יום בגדים שהיו במגע עם האזור הנגוע.
 - יש להימנע מלבישת בגדים צמודים או כאלו שאינם מאפשרים אוורור של העור.
 - יש לייבש בעדינות את האזור הנגוע לאחר רחיצתו.
 - יש להחליף מגבת בכל יום.
 - אם אתה סובל מפטרת בכף הרגל, אל תלך יחף. בנוסף, יש לפדר או לרסס את הנעליים במוצרים ייעודיים כנגד פטרת בכף הרגל. יש לשטוף את הידיים ב'סודיות' לאחר שימוש ומגע עם העור הנגוע על מנת למנוע את התפשטות הזיהום.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפטרייה-תי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא מיד אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות, היכולות להעיד על תגובה אלרגית:

- קשיי נשימה ובליעה
- התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון
- גרד חמור בעור בליווי פריחה אדומה או שלפוחיות (גם מחוץ לאזור המריחה).

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100 :
התקלפות או גרד של העור .

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000 :
נזקים בעור, גלדים, הפרעות בעור, שינוי בגון העור, אדמומיות, תחושת צריבה בעור, כאב או גירוי באזור המריחה .

תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000 :
גירוי בעיניים, עור יבש, דלקת עור ממגע (contact dermatitis), אקזמה או החרפה של הפטרת.

תופעות לוואי נדירות מאוד – תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000 :
סרפדת, פריחה או שלפוחיות (חזזיות/חטטיות).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://reportsideffect.health.gov.il/drugs>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל - 25°C.

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה - 12 חודשים לאחר פתיחה ראשונה של שפופרת.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, isopropyl myristate, cetyl alcohol, stearyl alcohol, polysorbate 60, benzyl alcohol, sorbitan monostearate, cetyl palmitate, sodium hydroxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה -

פטרייה-תי הינו קרם חלק בצבע לבן. הקרם משווק באריזות של 15 גרם ו - 30 גרם. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

בעל הרישום וכתובתו: תרו אינטרנשיונל בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761, ישראל.

היצרן וכתובתו: Sun pharma Canada Inc., 130 East Drive, Brampton, Ontario, Canada.

נערך בספטמבר 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 166-65-36323-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.