

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשייריט) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פרבנארTM 20
תרחיף להזרקה

כל מנתה (0.5 מ"ל) מכילה:

2.2 מיקרוגרם פוליסקריד פנאומוקוקלי לסרטופים 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F

4.4 מיקרוגרם פוליסקריד פנאומוקוקלי לסרטופ 6B
 מצומדים לכ- 51 מיקרוגרם חלבון נשא CRM₁₉₇, ספוחים על אלומיניום פוספט (0.125 מ"ג אלומיניום).

2.2 micrograms of pneumococcal polysaccharide for serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F

4.4 micrograms of pneumococcal polysaccharide for serotype 6B conjugated to approximately 51 micrograms CRM₁₉₇ carrier protein, adsorbed on aluminium phosphate (0.125 mg aluminium).

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 תחת "מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מיעד נוסף".

קרא בעיון את **עלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספთ, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה או עברו ידך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרופאי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

חיסון פועל למניעת מחלת פנאומוקוקלית הנגרמת על ידי סרטופים של *Streptococcus pneumoniae* 3, 1, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F, בתינוקות, בילדים ובמבוגרים, מגיל 6 שבועות ועד גיל פרחות מ- 18 שנים.

חיסון פועל למניעת מחלת פולשנית ודלקת ריאות הנגרמים על ידי *Streptococcus pneumoniae* במבוגרים מגיל 18 שנים ומעלה.

קבוצה רפואיית: חיסון נגד זיהומיים פנאומוקוקליים.

פרבנאר 20 מסייע להגן מפני זיהומיים הנגרמים על ידי 20 זנים (serotypes) של החידק *Streptococcus pneumoniae*.

פרבנאר 20 עוזר לגוף לייצר הגנה משל עצמו (נוגדים) כנגד החידק. נוגדים אלה מסייעים להגן עליך או על ידך מפני מחלת פנאומוקוקלית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה או ילך רגש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6) או לחיסונים אחרים המכילים טוקסואיד דיפטריה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני ההתכנסות בפרבנאר 20, ספר לרופא אם לך או לילדך:

- יש או הייתה בעיה רפואית לאחר קבלת כל מנתה של פרבנאר 20 כגון תגובה אלרגית או בעיות בנשימה.

- יש מחלת חמורה או חום גבוה. יחד עם זאת, חום קל או זיהום בדרכי הנשימה העליונות (לדוגמת התקרכות) כשלעצמו אינה סיבה לדוחית הבדיקות.
- יש בעיות של דימומים או נתיחה לחברות.
- יש מערכת חיסון מוחלשת (למשל כתוצאה מדיזהום של HIV): יתכן שלא תפיק את מלאו התועלת של פרבנאר 20.

לפניהם הבדיקות, ספר לרופא אם י└ר נולד בטרם עת (שבוע 28 להריון או לפני), שכן יתכו פערים ארוכים מהרגיל בין נשימה לנשימה במשך 2-3 ימים לאחר הבדיקות. כמו בכל חיסון, יתכן כי פרבנאר 20 לא יספק הגנה לכל המתestedים.

פרבנאר 20 מגן מפני דלקות אוזניים ילדים הנגרמות על ידי הזרים של החידק *Streptococcus pneumoniae* הכלולים בחיסון בלבד. החיסון לא יגן מפני דלקות אוזניים הנגרמות על ידי מזחמים מסוימים אחרים.

תרופות אחרות או חיסונים אחרים ופרבנאר 20
אם אתה או י└ר לוקחים, או אם לקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח.

פרבנאר 20 יכול להינתן בו זמן עם יתר החיסונים השגרתיים האחרים הניתנים לילדים.

במוגרים, פרבנאר 20 יכול להינתן במקביל עם חיסון לשפעת עונתית (inactivated influenza) באזורי הזרקה שונים בגוף. בהתאם להערכת הסיכון האישית שלך על ידי הרופא, יתכן שה הפרדה בין שני החיסונים תהיה מומלצת, כמו למשל מרוח של 4 שבועות ביניהם.

במוגרים, פרבנאר 20 יכול להינתן במקביל עם חיסון COVID-19 mRNA (חיסון פועל המיעוד למניעת מחלת COVID-19 הנגרמת על ידי נגיף קורונה-2 SARS-CoV-2).

ספר לרופא או לאחות אם אתה או י└ר קיבלתם חיסון אחר לאחרונה.

הירין והנקה
אם את בהירין או מניקה, חשוב שתיתן שאט בהירין או מתכנתת להרהור, היועצץ ברופא לפני קבלת החיסון. אין נתונים על השימוש בפרבנאר 20 בנשים בהירין. מחקרים בבני נשים אינם מצבעים על השפעות מזיקות על הירין.

לא ידוע אם פרבנאר 20 מופרש בחלב אם.

nagega ו שימוש במכונות
לפרבנאר 20 אין השפעה או ישנה השפעה זניחה על היכולת לנוהג או להפעיל מכונות. אולם תופעות מסוימות המצביעות בסעיף 4 "תופעות לווא" עלולות להשפיע על היכולת שלך לנוהג או להפעיל מכונות באופן זמני.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
פרבנאר 20 מכיל נתרן בכמות של פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה, כלומר נח呼 "נטול נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם ניתן בטוח בזוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

לחוחות הזמינים להתקינות בפרבנאר 20 יקבעו בהתאם להנחיות תדריך החיסונים של משרד הבריאות.

חיסון זה ניתן על ידי רופא או אחות בהזרקה תוך שרירית, בחלק העליון של הזרוע או בחלק העליון של הזרוע או הירך של י└ר.

הרופא או האחות יודיעו לך מתי על י└ר לשוב לקבלת המנה הבאה.

מבוגרים יקבלו זריקה 1 בלבד.

ספר לרופא או לאחות אם קיבלת חיסון פנאומוקוקלי בעבר.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה או ילך קיבלתם מנת יתר, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליתול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינה זמין להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרברנאר 20 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי חמורות

ספר לרופא מיד אם אתה מבחין בסימנים של תופעת הלואן החמורה הבאה (ראה גם סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה") התנפחות של הפנים, השפטיים, הפה, הלשון או הגרון (בצקת), קוצר נשימה (דיספנאה), צפצופים (התכווצות של דרכי הנשימה) - אלו עשויים להיות סימנים של תגובה אלרגית חמורה כגון אנפילקיס, הכלולת הלם.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי בתינוקות ובילדים מגיל 6 שבועות עד 5 שנים :

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה) :

- ירידזה בתיאבוں
- רגונות
- נמנום
- חום
- באזור ההזרקה עברו כל הילדים: אודם, נוקשות או נפיחות, כאב או רגישות.
- באזור ההזרקה לאחר מנת דחף ובילדים בגיל 5-2 שנים: אודם, נוקשות או נפיחות של יותר מ- 2.0-7.0 ס"מ

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- שלשול
- הקאה
- פריחה
- חום (חום גבוה של 38.9°C או מעל)
- באזור ההזרקה לאחר סדרת החיסון הראשונה: אודם, נוקשות או נפיחות של יותר מ- 2.0-7.0 ס"מ , כאב או רגישות שמריריים לתנועה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1000):

- פרכוסים (או עוויות), כולל אלה הנגרמים עקב חום גבוה
- חרפת (אורטיקרייה, או פריחה דמוית אורטיקרייה)
- באזור ההזרקה : אודם, נוקשות או נפיחות מעל 7.0 ס"מ

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000)

- תגובה אלרגית (רגישות יתר) באתר ההזרקה.

תופעות הלואין הבאות נצפו בשימוש עם פרבנאר 13 ועשויות להופיע גם בשימוש עם פרבנאר 20:

- התמותות או מצב דמוי הלם
- תגoba אלרגית (רגישות יתר) כולל נפיחות של השפטים /או הפנים
- בכி
- שינוי חסרת מנוחה

תופעות לוואי בילדים ובמתבגרים בגילאים 6 שנים ועד גיל פחות מ- 18 שנים:**תופעות לוואי שכיחות מאד (תופעות שמופיעות ביותר משמש אחד מעשרה) :**

- כאב ראש
- כאב שרירים
- באזור ההזרקה: כאב, רגשות, אודם, נוקשות או נפיחות
- עייפות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משמשים מתוך 100) :

- כאב מפרקים
- באזור ההזרקה: כאב או רגשות שטפוריים לתנועה

תופעות לוואי שאין שכיחה (תופעות שמופיעות ב 10-1 משמשים מתוך 1000):

- חרלה (אורטיקרייה, או פריחה דמוית אורטיקרייה)
- חום

תופעות הלואין הבאות נצפו בשימוש עם פרבנאר 13 ועשויות להופיע גם בשימוש עם פרבנאר 20:

- שלשול
- הקאה
- תיאבון ירוד
- רגונות
- נמנום
- שינוי חסרת מנוחה
- פריחה

לילדים ולמתבגרים עם זיהום של VII, אנמיה חרמשית או השתלת מה עצם הוי תופעות לוואי דומות, עם זאת, התדריות של תופעות הלואין הבאות היא שכיחה מאוד: הקאה שלשול, חום, כאבי מפרקים כאב או רגשות במקום ההזרקה שטפוריים לתנועה.

תופעות הלואין הבאות נצפו בשימוש בילדים ועשויות להופיע גם בשימוש עם פרבנאר 20:

- תגoba אלרגית חריפה כולל הלם אנפילקטטי; נפיחות בשפטים, פנים או גרון (אנגיאודמה)
- הגדלת בלוטות למפה סמוך לאזור ההזרקה למשל תחת הזרוע או במפשעה
- באזור ההזרקה : חרלה (אורטיקרייה), אודם וגירוי (דרמטיטיס) וגרד (erythema multiforme)
- פריחה הגורמת לכתמים אדומים ומגרדים

תופעות לוואי במבוגרים:**תופעות לוואי שכיחות מאד (תופעות שמופיעות ביותר משמש אחד מעשרה):**

- כאב ראש.
- כאבי מפרקים וכאבי שרירים.
- כאב/רגשות באזור ההזרקה ועייפות .

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משמשים מתוך 100) :

- נפיחות באזור ההזרקה, אודם באזור ההזרקה וחום .

תופעות לוואי שאין שכיחה (תופעות שמופיעות ב 10-1 משמשים מתוך 1000):

- שלשול, בחילה והקאות .
- פריחה ונפיחות הפנים, השפטים, הפה, הלשון או הגרון, אשר עלולים לגרום לקשי בבליעה או נשימה (אנגינואדמה) .
- גרד באזורי ההזרקה, בלוטות נפוחות בצוואר, בבית שח' או במפשעה (לימפדיונופתיה), חרלה באזורי ההזרקה (סרפדת), וצמרמותות.

תופעות הלואאי הבאות נצפו בשימוש עם פרבנאר 13 ועשויות להופיע גם בשימוש עם פרבנאר 20:

- פריחה הגורמת לכ כתמים אדומים ומגרדים (erythema multiforme).
- גירוי באזורי ההזרקה.
- תיאבן ירוד.
- הגבלת תנועת הזרוע .

אם הופעה תופעת לואאי, אם אחת מתופעות הלואאי מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לואאי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואאי לשירות הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il) (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואאי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקרר (C°-8-2°C). אין להקפיא. יש להשליך אם החיסון הוקפא.
- יש להשתמש בפרבנאר 20 בהקדם האפשרי לאחר הוצאתו מהקריר.
- פרבנאר 20 יציב ל- 96 שעות כאשר מאוחסן בטמפרטורה של C° 25°-8°C, או 72 שעות אם מאוחסן בטמפרטורה של C° 2-0°.
- בסוף תקופת זו יש להשתמש בתכשיר או להשמידו. מידע זה מיועד לצוות רפואי בלבד במקרה של שינויים זמינים בטמפרטורת האחסון בלבד.
- יש לאחסן את המזקרים המוכנים מראש במנח אופקי על מנת להקטין את זמן ההרחה .
- יש לנער היטב לפני ההזרקה לקבלת תרחיף הומוגני.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

sodium chloride, succinic acid, polysorbate 80, water for injection.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

פרבנאר 20 משוקן כתרחיף בצביע לבן המגיע בתווך מזרק מוקן מראש חד מנתי של 0.5 מ"ל.
האריזה מכילה 1 או 10 מזרקים מוכנים מראש עם או בלי מחת.

יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקרים.

בעל הרישום וכותבו: פ"ייזר פרמצטטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-37443-68-172

שם הפשטות ולחיקת הקרייה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.


עודכן ב- 10/2024

המידע שלහן מיועד לצוות רפואי בלבד:

המידע שלහן מיועד לצוות רפואי בלבד:

במהלך האחסון, יתכן כי יופיעו משקע לבן ונוזל עלין צלול. הדבר אינו מעיד על ירידה באיכות. יש לאחסן את המזרקים המוכנים לשימוש במנוח אופקי כדי למזער את זמן הרחפה.

הכנה למtan



שלב 1. הרחפת החיסון

אחז במזרק המוכן לשימוש במנוח אופקי בין האגודל לאצבע המורה ונער בחזקה עד לקבלת תרחיף לבן הומוגני בתוך המזרק. אין להשתמש בחיסון אם הוא אין ניתן להרחפה.



שלב 2. בדיקה ויזואלית

בדוק את החיסון באופן ויזואלי לנוכחות חלקיקים גדולים ולשינוי צבע טרם המtan. אין להשתמש בחיסון אם נצפו חלקיקים גדולים או שינוי צבע. אם החיסון אינו תרחיף לבן הומוגני, חוזר על השלבים 1 ו- 2.



שלב 3. הסר את מכסה המזרק

הסר את מכסה המזרק המתאים ה- Luer lock באמצעות סיבוב אייטי של המכסה נגד כיוון השעון תוך כדי אחיזה בהתאם ה- Luer lock.

הערה: יש להיזהר ולהקפיד לא ללחוץ על מוט הבוכנה שנמשך תוך כדי הסרת מכסה המזרק.

שלב 4. לחבר מחת סטרילית

חבר מחת המתאימה למtan תוך-שרירית למזרק המוכן לשימוש באמצעות אחיזה בהתאם ה- Luer lock וסיבוב המחת בכיוון השעון.

יש לחת את המנה המלאה.

פרבנאר 20 מיועד לשימוש תוך-שרירית בלבד.

אין לערבע פרבנאר 20 עם חיסונים או תכשירים רפואיים אחרים באותו המזרק.

פרבנאר 20 יכול להינתן בו זמנית עם יתר החיסונים השגרתיים האחרים הנינטנים לילדים; במקרה זה יש להשתמש באזורי הזרקה שונים בגוף.

ניתן לתת פרבנאר 20 لمבוגרים באותו המועד בו ניתן חיסון השפעת העונתי (V/Q; אנטיגן פני השטח, מומת, עם אציג'ובנט). באנשים עם מחלות רקע הכרכות בסיכון גבוה להתקפות מחלת פנאומוקוקלית מסכנת חיים, ניתן לשקל הפרדה בין מתן V/Q (חיסון השפעת העונתי) למtan פרבנאר 20 (לדוגמה, בכ- 4 שבועות). יש להשתמש באתרים שונים להזרקת החיסון.

ניתן לתת פרבנאר 20 لمבוגרים באותו המועד בו ניתן החיסון mRNA COVID-19 (nucleoside modified).

יש להשליך כל תכשיר שנותר ללא שימוש או חומר פסולת בהתאם לדרישות המקומיות.