

אוקטובר 2026

רופא/ה נכבד/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

תנדון:

Ritalin LA 10, 20, 30, 40 mg, modified release capsules

Ritalin 10 mg tablets

אנו מבקשים להודיע על עדכונים בעלונים של תכשירי ריטלין.

התכשיר **Ritalin LA modified release capsules** רשום בישראל להתוויה הבאה:

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

התכשיר **Ritalin 10 mg tablets** רשום בישראל להתוויות הבאות:

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Narcolepsy

המרכיב הפעיל: Methylphenidate Hydrochloride.

להלן פירוט השינויים המהותיים:

בעלון לרופא

2. Qualitative and quantitative composition

ציון כמויות חומרי עזר בטבליות ובכמוסות

4.4 Special warnings and precautions for use

General

Stimulants, including non-pharmacotherapeutics (e.g., energy drinks, caffeine) should be used with caution in patients during treatment with Ritalin (see section 4.5 Interaction with other medicines and other forms of interaction).

Excipients with known effect

Ritalin 10 mg tablets

Lactose:

Patients with the rare hereditary problems of galactose intolerance, total lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not use this medicinal product.

Wheat starch:

One 10 mg Ritalin tablet contains no more than 4.8 micrograms gluten.

Ritalin LA modified-release capsules

Sugar spheres:

Patients with the rare hereditary problems of fructose/galactose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase insufficiency should not use this medicinal product.

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Use with stimulants

Stimulants, including non-pharmacotherapeutics (e.g., energy drinks, caffeine) should be used with caution in patients during treatment with Ritalin (see Section 4.4 Special warnings and precautions for use).

4.9 Overdose

Management

Supportive measures include preventing self-injury and protecting the patient from external stimuli that would exacerbate the overstimulation already present. ~~If the overdose is oral and the patient is conscious, the stomach could be evacuated by induction of vomiting, followed by administration of activated charcoal. Airway protected gastric lavage is necessary in hyperactive or unconscious patients, or those with depressed respiration. Intensive care must be provided to maintain adequate circulation and respiratory exchange; external cooling procedures may be required to reduce hyperpyrexia.~~

בעלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

שימוש בתרופה וצריכת חומרים מעוררים
הימנע מצריכת חומרים מעוררים כולל תרופות, מזונות או משקאות (למשל משקאות אנרגיה) המכילים קפאין במהלך הטיפול בריטלין. מאחר שגם אלה חומרים מעוררים, השימוש בהם יחד עם ריטלין עלול להגביר תופעות לוואי כגון דופק מהיר או לא סדיר ולחץ דם גבוה.

העלונים לצרכן נשלחו למאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על-ידי פניה לבעל הרישום.

בברכה,
נוברטיס ישראל בע"מ