

## נספח 1:

#### <u>הודעה על חזרה לשיווק של התכשיר Truxima</u>

תאריך ההודעה: 20/11/2024

### בעל הרישום **פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ** מודיע על **חזרה לשיווק** של:

בעל הרישום <b>פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ</b> מודיע על <u>חזרה לשיווק</u> של:	
161 74 35585 00	מספר רישום
טרוקסימה	שם התכשיר בעברית
TRUXIMA	שם התכשיר באנגלית
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION	צורת מינון
I.V	דרך מתן
RITUXIMAB	מרכיב פעיל
10 MG/ML	חוזק
Truxima is indicated in adults for the following indications:	התוויה
* Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)	
Truxima is indicated for the treatment of patients with	
relapsed or refractory low-grade or follicular, B-cell non-	
hodgkin's lymphoma. Truxima is indicated for the treatment of previously untreated patients with low-grade	
I deadine it of previously drifteated patients with low-grade	

Truxima is indicated for the treatment of patients with relapsed or refractory low-grade or follicular, B-cell non-hodgkin's lymphoma. Truxima is indicated for the treatment of previously untreated patients with low-grade or follicular lymphoma in combination with chemotherapy. Truxima is indicated for the treatment of patients with CD20 positive diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma in combination with CHOP chemotherapy. Truxima maintenance therapy is indicated for the treatment of follicular lymphoma patients responding to induction therapy.

### \* Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)

Truxima in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of patients with previously untreated and relapsed/refractory CLL. Only limited data are available on efficacy and safety for patients previously treated with monoclonal antibodies including rituximab or patients refractory to previous rituximab plus chemotherapy.

# \* <u>Granulomatosis with polyangiitis and microscopic</u> polyangiitis

Truxima, in combination with glucocorticoids, is indicated for the treatment of adult patients with granulomatosis with polyangiitis (GPA) (Wegener's Granulomatosis (WG)) and microscopic polyangiitis (MPA).



*D 1: (D)()	
* Pemphigus vulgaris (PV):	
Truxima is indicated for the treatment of adult patients with	
moderate to severe pemphigus vulgaris (PV).	
22/09/2024	תאריך תחילת הפסקת השיווק
28/11/2024	תאריך צפי לסיום הפסקת השיווק
	במידה ומדובר בהארכה יש לרשום)
	"XXXX/XX/XX במקום XXXX/XX/XX"
	(תאריך הצפי האחרון)
20/11/2024	תאריך חזרה לשיווק (יש למלא
	משבצת זאת <b>עם</b> חזרת התכשיר
	לשיווק <b>בפועל</b> )
cl	הכללה בסל הבריאות: כן / לא
סיבות תפעוליות	סיבת הפסקת השיווק: סיבות
	תפעוליות / סיבות מסחריות
2 vials x 10ML	גודל/י אריזה (נא לרשום את כל
	הגדלים הרלוונטיים להודעה זאת)
1 vial x 50 ML	זמינות של גודל אריזה אחר או חוזק
	אחר של התכשיר