

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### **תרודנט שטיפת פה**

**0.2% v/w**

**חומר פעיל**

chlorhexidine gluconate 0.2% w/w

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוספת".  
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

- לעיכוב היוציארות פלאק
- כעזר לטיפול בדלקת חניכיים ומונעתה (ג'ינג'יביטיס)
- כעזר בשמירה על היגיינת הפה
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
- לשימוש בכיבים, בדלקות עקב שינוי תותבות ובפטרת בפה

**קבוצה רפואיית:** אנטיספטיק (נגד זיהום)

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל chlorhexidine gluconate או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

**ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 אלא בהמלצת רופא.
- יש להשתמש בחולל הפה בלבד. אין לבלווע. שטופ ביסודות במים אם התכשיר בא ב מגע עם העיניים או האוזניים.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- משחות שניים עלולות לגרום לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים, שטופ את פיך ביסודות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בתודנט לשטיפת הפה. לחלוופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה בזמן אחר של היום.
- אין להלבין בדים שהו ב מגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- "תכן שיחול שינוי בתוחלת הטעם או שתורגם תחושת צריבה, עקצוץ או נימול בחולל הפה. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

#### **ילדים וمتבגרים**

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל גיל 12. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

## **אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות**

אם אתה לוקח או אם לוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

## **הירין והנקה**

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהירין או מיניקה.

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

### **המינון המקביל בדרך כלל הוא:**

השתמש **פעמיים ביום**. מלא את כוסית המדידה עד לקו 10 מ"ל. שטוף את הפה ביסודות לפחות דקה אחת ולאחר מכן.

**דלקת חניכיים:** מומלץ להשתמש במשך חדש.

**כיבים בפה ופרטת פה:** המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה.

**דלקות פה עקב שניים תותבות:** נקה והשרה את התותבות בשטיפת הפה לפחות 15 דקות פעמיים ביום.

**לאחר ניתוחים דנטליים:** לשטוף לפני הוראות רופא השיניים.

אם התסמים נמשכים, פנה לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבולע.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל'ild מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית ומהנה **בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ לרופא או לרוקח.

## **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בתרודנט שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק את השימוש בשטיפת הפה ולפנות מיד לעזרה רפואיים אם מופיע אצך **פריחה, נפיחות בשפתיים, בלשון, בגרון או בפנים או אם יש לך קשי נשימה**. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגביה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.

יש להפסיק את השימוש בשטיפת הפה ולפנות לרופא אם מופיע גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים הלחיים. תופעות אלו אמורות לחלוף עם הפסקת הטיפול.

### **תופעות לוואי נוספת:**

• הכתמה זמנית של הלשון. התופעה נעלמת עם הפסקת הטיפול.

• הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתן להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שניינים (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?"). אם הכתמה נותרת, היא ניתן להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השינינית. אתה יכול לנוקות את התותבות באמצעות חומר ניקוי תותבות.

- יתכן שתבחן בשינוי בחוש הטעם, בתחשות צריבה, נימול, או עקצוץ בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חילוף עם המשך הטיפול.
- אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, דلل את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למ משרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המופיע לדוח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת滂גה (exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂גה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסון במקום קריר וחושך.
- אין באזיזה המקורית.
- אריזת 300 מ"ל: לשימוש עד 9 חודשים מהפתיחה.
- אריזת 50 מ"ל: לשימוש עד חודש מהפתיחה.

## 6. מידע נוספת

### נוסח על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, sorbitol 70% solution, alcohol, polysorbate 80, peppermint oil

#### כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

תמייסה שקופה, צולחה עד מעט עכוורת, בריח מנטה. התרופה ארוזה בבקבוק פלסטי עם מכסה עמיד בפני ילדים וכוסית מדידה. הבקבוק מכיל 300 מ"ל או 50 מ"ל של תמייסה. יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

#### היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761.

נערך באוקטובר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי בממשרד הבריאות: 00-32-27698-060  
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.