

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרםפייהTM

مزרק/مزרק עט מוכן לשימוש, 100 מ"ג

כל מזרק או מזרק עט מוכן לשימוש מכילים:
גוסלקומב 100 מ"ג/1 מ"ל

Guselkumab 100 mg/1 ml

למיידע על חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספים".

קרא בעיון את **העלון עד סופו בטרם תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור את העalon. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

מחלחת ספחת (פסורייאזיס)

- טרםפייה מיועדת לטיפול במחלחת ספחת (פסורייאזיס) רובדית בדרגת חמירה בינונית עד קשה במטופלים בוגרים המועמדים לטיפול סיסטי או פוטותרפיה.

דלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטיט)

- טרםפייה, טיפול בודד או בשילוב עם מטוטרקסאט, מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטיט) פעילה במטופלים בוגרים בעלי תגובה לא מספקת או חרשי סבירות לטיפול קודם בתרופות המשפיעות על מהלך המחלת (DMARD).

קבוצה רפואיית:

מעכבי אינטראוקטיבים.

כיצד טרםפייה פועלת?

טרםפייה מכילה את החומר הפעיל גוסלקומב שהינו סוג של חלבון הנקרא נוגדן מונוקולוני. התרופה פועלת על ידי חסימת הפעילות של חלבון הנקרा 23-2α, אשר נוכח בرمות גבוהות באנשים הסובלים מספחת (פסורייאזיס) ואנשים הסובלים מדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטיט).

בספחת (פסורייאזיס) רובדית - התרופה יכולה לשפר את מצב העור ומראה הציפורניים ולהפחית תסמינים כגון קשקשת, השרת קשകשים, קילופים, גרד, כאב ותחושת שריפה.

בדלקת מפרקים ספחתית (פסורייאטיט) - התרופה יכולה לשפר תסמינים וסימנים של המחלת, להאט את הנזק לסחוסים ולעצמות של המפרקים ולשפר את יכולת לביצוע פעילות יומיומית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לגוסטוקומב או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בפרק 6 - "מידע נוסף"). אם הינך חושב שאתה עלול להיות אלרגי, היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.
- הינך סובל מזמן פועל, לרבות שחפת פעילה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בטרפמיה, ספר לרופא אם

- הינך מטופל בגין זיהום שאתה סובל ממנו.
- הינך סובל מזמן שאינו חולף או שהזמן שב ווחרז.
- הינך סובל משחפת או אם הייתה ברגע קרוב עם אדם הסובל משחפת.
- הינך חושב שיש לך זיהום או שהינך סובל מטאמי זיהום (ראה מטה תחת סעיף "שים לב לזיהומיים ותגובהות אלרגיות").
- קיבלת לאחרונה או שהינך מתכוון לקבל חיסון במהלך הטיפול עם טרפמיה.

אם איןך בטוח אם אחד הסעיפים מעלה רלוונטי עבורך, היועץ ברופא, ברוקח או באחות לפני השימוש בתרופה.

על פי החלטת הרופא המטפל, יתכן שתצטרכ לבצע בדיקות דם על מנת לאתר רמות גבואה של אנזימי כבד, לפני ובמהלך השימוש בטרפמיה. עליה באנזימי כבד עלולה להופיע בתדירות גבוהה יותר במטופלים המקבלים טרפמיה כל 4 שבועות בהשוואה למטופלים המקבלים טרפמיה כל 8 שבועות (ראה גם פרק 3 - "יכן תשמש בתרופה?").

שים לב לזיהומיים ותגובהות אלרגיות

טרפמיה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות הכוללות תגובה אלרגית וziehomi. עליך לעקוב אחר סימנים של מצבים אלו בתקופת השימוש בטרפמיה.

סימני ziehomi יכולים לכלול חום או תסמינים דמווי שפעת; כאבי שרירים; שיעול; קוצר נשימה; תחושת צריבה/שריפה בעת מtan שני או מtan שני בתדירות גבוהה מהרגיל; כאח דמי; ירידת משקל; שלשול או כאב בטן; עור חמוץ, אדמוני או כאוב או פצעים על הגוף שונים ממחלת הספקת (פסוריאזיס).

תגובהות אלרגיות חמורות, שיכולות לכלול את התסמינים הבאים: נפיחות של הפנים, השפטים, הפה, הלשון או האגרון, קושי בבליעה או קשי נשימה וחרפת, נצפו בשימוש עם טרפמיה (ראה סעיף "תופעות לוואי חמורות" בפרק 4 "תופעות לוואי").

יש להפסיק את השימוש בטרפמיה ולדווח לרופא מיד או לפנות לעזרה רפואיית מיידית, אם הינך מבחין בסימנים כלשהם המעידים על תופעות אלרגיות חמורות אפשריות או ziehomi.

ילדים ומתבגרים

טרפמיה איננה מומלצת לשימוש ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18, להיות שלא נקרה בקרב קבוצות גיל אלו.

אינטראקטיות/ תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לוקח לך לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי

תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. כמו כן, אם לאחרונה קיבלת חיסון או שהינך עומד לקבל חיסון, יש לידע את הרופא. אין לקבל חיסונים מסווג מסוים (חיסון חי) בעת הטיפול בטרםפייה.

הריון והנקה

- אין להשתמש בתרופה בהריון היית והשפעת התרופה בנשים בהריון איננה ידועה. המלצתה לנשים בגין הפריון הינה להימנע מכניות להריון, ולהשתמש באמצעות מינעה במהלך הטיפול ולפחות 12 שבועות לאחר מכן. המנה האחורה של טרמפה. שוחחי עם הרופא אם הינך בהריון, וחוותת שתאת עשויה להיות בהריון או מתכוננת הריון.
- שוחחי עם הרופא אם הינך מניקה או מתכוננת להניק. את והרופא תגיעו להחלטה האם להניך או להשתמש בטרםפייה.

nageha ו שימוש במכונות

לא סביר כי טרמפה תשפיע על יכולתך לנוהג ולהפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סוכוז. ראה גם פרק 6 - "מידע נוסף".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנווג למינון ואופן הטיפול בתכשיר. **באיזה מינון ניתנת התרופה ולאיזה פרק זמן?**

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ספחת (פסורייזיס) רובדיית:

- המינון של התרופה הינו 100 מ"ג (תכולת מזרק או מזרק עט אחד מוקן לשימוש) הניתנים בהזרקה מתחת לעור. הטיפול ינתן על ידי רופא או אחיות.
- המננה השנייה תינתן 4 שבועות לאחר מתן המנה הראשונה. לאחר מכן, תינתן מנה כל 8 שבועות.

דלקת מפרקים ספחתית (פסוריאטית):

- המינון של התרופה הינו 100 מ"ג (תכולת מזרק או מזרק עט אחד מוקן לשימוש) הניתנים בהזרקה מתחת לעור. הטיפול ינתן על ידי רופא או אחיות.
- המננה השנייה תינתן 4 שבועות לאחר מתן המנה הראשונה. לאחר מכן, תינתן מנה כל 8 שבועות. במטופלים מסוימים, לאחר מתן המנה הראשונה, תינתן מנה של טרמפה כל 4 שבועות. הרופא המטפל יחליט באיזו תדירות תקבל טרמפה.

בתחילת, הרופא או האחות יזיריקו לך את התרופה. עם זאת, יתכן שתחליט יחד עם הרופא שלך כי תוכל להזריק את התרופה עצמאית. במקרה זה, תקבל הדרכה לגבי הדרך הנכונה להזריק טרמפה. יש לשוחח עם הרופא או האחות במקורה שיש לך אפשרות הנוגעת להזרקה עצמאית של התרופה. חשוב לא להזריק עצמאית את התרופה עד אשר קיבלת הדרכה מתאימה מרופא או האחות.

لتיאור מפורט של הנחיות השימוש יש לקרוא את סעיף "օפן השימוש" בהמשך.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בטרםפיה ללא היעוץ עם הרופא.

אם נטלת או קיבלת בעותות מינון גבוהה יותר או שקיבלה את התרפיה מוקדם ממה שהרופא רשם:
צור קשר מיד עם הרופא.

אם בעותות בלע לצד מן התרפיה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא אריזת התרפיה איתך.

אם שכחת ליטול את התרפיה:
צור קשר עם הרופא.

אם הינך מפסיק את הטיפול בתרפיה:
אין להפסיק את הטיפול בתרפיה ללא היעוץ עם הרופא. אם הינך מפסיק את הטיפול, תסמנני המחלה עלולים לחזור.

אין לעבר על המנה המומלצת.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרפיה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפיה, השימוש בטרםפיה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות (מויפות ב- 10-1 מטופלים מתוך 1,000)
ספר לרופא או פנה לקבלת עזרה רפואיית מיידית אם מויפה אחת מתופעות הלואוי הבאות:
תגובהות אלרגיות חמורות אפשריות - הסימנים יכולים לכלול:

- קושי נשימה או בבליעה
- נפיחות באזור הפנים, השפתיים, הלשון או האגרון
- גרד חמור בעור, עם פריחה אדומה או בולתת

תופעות לוואי נוספת

תופעות הלואוי הבאות הין קלות עד בינוניות. אם אחת מתופעות לוואי אלו הופכת לחמורה פנה לרופא, רוקח או לאחות מיידית.

תופעות לוואי שכיחות מודר (מויפות ביותר מ- 10-1 מטופלים מתוך 100)

- זיהומיים בדרכי הנשימה

(מויפות ב- 10-1 מטופלים מתוך 100)

- כאב ראש
- כאבי מפרקים (ארתרalgיה)
- שלשול
- אדמומיות, גירוי או כאב באתר ההזרקה
- עלייה באנדמי כבד בدم

תופעות לוואי שאין שכיחות (מויפות ב- 10-1 מטופלים מתוך 1,000)

- תגובה אלרגית
- פריחה בעור
- ירידת בסוג מסוים של תא דם לבנים הנקראים נויטרופילים
- >Zיהום הרפס סימפלקס

- זיהומיים פטריטיים בעור, למשל בין האצבעות (לדוגמה: athlete's foot)
- דלקת המעי (גסטרואנטראיטיס)
- חrlת (סרפדת)

אם הופעה תופעת לווואי, אם אחת מהתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא הזכרה בעבר, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לווואי

ניתן לדוח על תופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לווואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדוח על תופעות לווואי, או על ידי כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסון בקירור 8°C - 2°C . אין להקפיא.
- יש לשמור את המזרק או המזרק עט מוכן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מארור.
- אין לנער.
- אין להשתמש בתרופה אם הינך מבחין כי התמיישה עכורה, شيئاה את צבעה או שמכילה חלקיקים גדולים.
- לפני השימוש, הוציא את הקרטון מחוץ למקרר. יש להשאיר את המזרק או המזרק עט מוכן לשימוש בתוך הקרטון עד להשתתטת טמפרטורת חדר על ידי המתנה של 30 דקות.
- תרופה זו מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד. אין להשליך תרופות למי השפכים או לפח האשפה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

טרומפיה מכילה את החומר הפעיל גוסלקומב (guselkumab), כאשר מזרק או מזרק עט מוכן לשימוש מכילים 100 מ"ג חומר פעיל ב – 1 מ"ל תמיישה.

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Sucrose, L-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine, Polysorbate 80, Water for injection.

תכולת סוכרוז - 79 מ"ג.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טרומפיה הינה נוזל להזרקה צלול וחסר צבע עד גוון צהבהב בהיר. כל קופסה מכילה מזרק או מזרק עט מוכן לשימוש אחד.

ישראל: סילג בע"מ, הוצ'סטרסה 8200-2011, שפהאוזן, שוויץ.

בעל הרישום: גי-ס הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

160-54-35346

שם הפטוטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בספטמבר 2024.

אוף השימוש:

להלן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק מוקן לשימוש ולאחר מכן הוראות שימוש נפרדות עבור מזרק עט מוקן לשימוש.

אוף השימוש במזרק מוקן לשימוש 100מ"ג טרמפה:

מידע חשוב

אם רופא יחליט כי הינך או מי שטפל בך יכול להזריק לך טרמפה בביתך, יהיה עליך לעבור הדרכה מיד' איש צוות רפואי בגין השימוש בכך, הכנה והזרקה של טרמפה באמצעות המזרק המוקן לשימוש (ראה איור 1), לפני שתוכל להזריק את התרופה בעצמך.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק המוקן לשימוש לפני כל הזרקה. יתכן והנחיות יתעדכנו מעט לעת. עלון זה אינו מחייב התייעצות עם הרופא בגין למצבר הרופאי או הטיפול שלך. יש לקרוא את העלון לצרכך של טרמפה בתשומת לב לפני ההזרקה. במידה יש לך שאלות פנה לרופא או לאחות.

טרמפה מזרק מוקן לשימוש מיועד להזרקה תת עורית, **ולא** להזרקה תוך שרירית או הזרקה לווריד. לאחר ההזרקה, המחט תחזור לגוף המזרק ותינעל למקום.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקדר (0°C - 8°C). אין להקפיא.

יש להרחק מהישג ידים וטוחן ראייתם של ילדים.

אין לנער את מזרק טרמפה המוקן לשימוש באף שלב.

יש לשמור את המזרק המוקן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מפני.

חלקי המזרק המוקן לשימוש

לפני השימוש:

ראה איור 2.

לאחר השימוש:

ראה איור 3.

לצורך ההזרקה תזדקק לצידם הבא:

1 מזרק טרמפה מוקן לשימוש.

צדוד שאיננו נכלל באריזת מזרק טרמפה:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדור צמר גפן או PD גזזה

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

(בדיקה הקופסה (ראה איור 4)

הוצא את קופסת מזרק הטרמפה המוקן לשימוש מהמקרר.

יש להשאיר את המזרק המוקן לשימוש בתוך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישר בטמפרטורת החדר לפחות **פחות 30 דקות** לפני השימוש.

אין לחמם את המזרק המוקן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדוק את תאריך התפוגה ('EXP') שעלה גב הקופסה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון שלו חודש. במידה ותאריך התפוגה חלף, אין להשתמש במזרק.

אין להשתמש בטרמפה במידה והקופסה איננה שלמה/איןנה סגורה היטב.

עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שספק לך את התרופה.

בחירה אתר ההזרקה (ראה איור 5)

בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:

- **קדמת הירך (מולץ).**
- אזור הבطن התחתונה, למרחוק של **פחות חמישה סנטימטרים** מהטבור.
- אחורי החלק העליון של הזרוע (רק במידה אתה מקבל את הזריקה מידי איש צוות רפואי או מטפל).

אין להזריק לעור רגish, פגוע, אדום, קשקי או קשה.
אין להזריק לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

נקיי האזור המיועד להזרקה (ראה איור 6)

רחץ יdry ביסודות באמצעות סבון ומים חמימים.

נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבן עם אלכוהול ואפשר לו להתייבש.
אל תיגע, תיבש או תנשוף על אזור זה, אחרי שניקית אותו.

בדיקות הנוזל שבמזרק (ראה איור 7)

הוצא את המזרק של טרמפה המוקן לשימוש מהקופהה.

בדוק את הנוזל שבמזרק בחלאן התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שkopim למוחזה או לבנים. יתכן ותראה גם בועת אויר אחת או יותר. זהו מצב תקין.

אין להשתמש במידה והנוזל שנינה צבעו או עכור או מכיל חלקיקים גדולים. אם אין בטוח, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופת.

2. הזרקת טרמפה באמצעות מזרק מוקן לשימוש

הסרת מכסה המחט (ראה איור 8)

אחז בגוף המזרק ביד אחת ומשור במכסה המכחה החוצה באמצעות היד השנייה. אתה עשוי להבחן בטיפות נוזל בקצה המחט - זהו מצב תקין.

יש להזריק טרמפה בתוך 5 דקוטר מרגע הסרת מכסה המחט.

אין להציג את מכסה המכחה, היota זהה עלול לפגום במחט.

אין לגעת במחט ואין לאפשר מגע של המחט עם משטח כלשהו.

אין להשתמש במזרק המוקן לשימוש במידה והוא נפל. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרופת.

מיוקם האצבעות והחדרת המחט (ראה איור 9)

יש למקם את האגודל, האצבע והאמלה **ישירות מתחת לעוגן האצבעות** כפי שניתן לראות בתמונה.

אין לגעת בעוגן האצבעות או באזור שמעליו, היota והדבר עלול להפעיל את מנגן הבטיחות של המחט.

צבות קלות ביד השנייה את העור באתר ההזרקה. יש למקם את המזרק בזווית של 45 מעלות לעור.

חשוב לצבוט מספיק עור על מנת לאפשר **הזרקה מתחת לעור** ולא לתוך השיר.

שחרור האכיביטה ומיוקם היד (ראה איור 10)

השתמש ביד החופשית על מנת לאחז בגוף המזרק המוקן לשימוש.

לחיצה על בוכנת המזרק (ראה איור 11)

יש למקם את האגודל של היד השנייה על בוכנת המזרק וללחוץ עד הסוף מטה עד לעצירת הבוכנה.

שחרור האגודל מהבוכנה (ראה איור 12)

מגן הבטיחות יכסה את המחט ויינעל למקום, תוך הוצאת המחט מהעור.

3. לאחר ההזרקה

השלכת המזרק המשומש (ראה איור 13)

השלך את המזרק המשומש של טרמפהית לתוכן מכל המועד לחפצים חדים, מיד לאחר סיום השימוש. עם מילוי המכל יש לרוקנו בהתאם להנחיות שקיבלה על ידי הרופא או האחות.

בדוק את אתר ההזרקה (ראה איור 14)

יתכן ותבחן בכמות מזעירות של דם או נזול באזור ההזרקה. הנח צמר גפן או פד גaza על אזור ההזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום. אין לשפשף את האזור. במידת הצורך, הדבק אגד מידבק על האזור. **cutת ההזרקה הושלמה!**

למיידנו נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.

אופן השימוש במזרק עט מוקן לשימוש 100מ"ג טרמפייה:

אבייזר לשימוש חד פעמי

מידע חשוב

במידה ורופאיך יחליט כי הינך או מי שמתפל ברק יכול להזריק טרמפהית בביתך, יהיה עלייך לעבור הדרכה מיד איש צוות רפואי בנוגע לשימוש נכון, הכנה והזרקה של טרמפהית באמצעות המזרק עט המוקן לשימוש, לפני שתוכל להזריק את התווך בעצמך.

יש לקרוא את הנחיות השימוש במזרק עט המוקן לשימוש לפני כל ההזרקה. יתכן וההנחיות יתעדכנו מעט לעת. עלון זה אינו מחייב התיעצות עם הרופא בנוגע למצבך הרפואי או הטיפול שלך.

יש לקרוא גם את העلون לצרכך של טרמפהית בתשומת לב לפני ההזרקה. במידה ויש לך שאלות פנה לרופא או לאחות.

במהלך ההזרקה, דחוף את הידית עד הסוף למיטה, עד שגוף המזרק עט הירוק אינו נראה כדי להזריק את המינון המלא.
אין להרים את מזרק עט המוקן לשימוש במהלך ההזרקה. אם תעשה זאת, מזרק עט מוקן לשימוש יינעל ולא תקבל את המינון המלא.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקדר (2°C-8°C). אין להקפי.

אין לנער את המזרק עט מוקן לשימוש שלך באף שלב.

יש להרחיק טרמפהית וכל תרופה אחרת מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

יש לשמור את המזרק עט המוקן לשימוש בקרטון החיצוני על מנת להגן מארור.

חלקי המזרק עט המוקן לשימוש (ראה איור 15)

הציגו לו תזדקק:

1 ספוגית/מגבון טבול באלכוהול

1 כדור צמר גפן או פד גaza

1 אגד מידבק

1 מכל איסוף לחפצים חדים (ראה שלב 3).

1. הכנה להזרקה

בדוק את הקופסה והמתן עד שטרמפהית מגע לטרמפורת החדר (ראה איור 16).

הוצא את קופסת מזרק עט המוקן לשימוש הטרמפהית מהמקדר.

יש להשאר את המזרק עט המוכן לשימוש בתוך הקופסה ולהניח אותו על משטח ישר בטמפרטורת החדר למשך כ**30 דקות** לפני השימוש.
אין לחמם את המזרק עט המוכן לשימוש בכל דרך אחרת.

בדיקות תאריך התפוגה ('EXP') שעלהגב הקופסה. תאריך התפוגה מתיחס ליום לאחר של אותוחודש. במידה ותאריך התפוגה חלף, אין להשתמש במזרק עט. אין להשתמש בטרמייה במידה והקופסה איננה שלמה/איננה סגורה היבר. עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרפופה.

בחירת אתר הזרקה (ראה איור 17)
בחר את אחד מהאזורים הבאים להזרקה:

- **קדמת הירך (מולץ).**
- אזור הבطن התחתונה. במרקח של **פחות חמישה סנטימטרים** מהטבור.
- אחורי החלק העליון של הזרוע (רק במידה ואתת מקבל את הזריקה מיד, איש צוות רפואי או מטפל).

אין להזrik לעור רגish, פגוע, אדום, קשქשי, קשה או לאזוריים עם צלקות או סימני מתיחה.
רוחצת ידיים (ראה איור 18)
רוחץ ידיים ביסודות סבון ומים חמימים.

ניקוי האזור המיועד להזרקה
נגב את האזור המיועד להזרקה באמצעות מגבן עם אלכוהול ואפשר לו להתיבש. אל תיגע, תיבש או תנשוף על אזור זה, אחרי שניקית אותו.

בדיקה הנוזל שבמזרק עט (ראה איור 19)
הוצא את המזרק עט המוכן לשימוש של טרמייה מהקופסה.
בודק את הנוזל שבמזרק עט בחلون התצוגה. יש לוודא כי הנוזל שבמזרק עט צלול עד צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים זעירים, שקופים או לבנים. יתכן ותראה גם בועת אוויר אחת או יותר.
זהו מצב תקין.

אין להשתמש במידה והנוזל:

- עכור, או
- שינוי צבעו, או
- מכיל חלקיקים גדולים

אם אין בטון, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרפופה.

2. הזרקת טרמייה באמצעות מזרק עט מוכן לשימוש

הסר את המכסה בתחתית המזרק כשהינך מוכן להזריק (ראה איור 20)
הרחק את ידך מungan המכחס לאחר הסרת המכסה. זה תקין שתראה מספר טיפות של נוזל.
יש להזריק טרמייה בתוך 5 דקות מרגע הסרת המכסה.

אין להחזיר את המכסה. זה עלול לפגום במחט.
אין להשתמש במזרק עט המוכן לשימוש במידה והוא נפל לאחר הסרת המכסה.
במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח שסיפק לך את התרפופה.

יש למקם את המזרק עט ישירות על העור (ראה איור 21)

לחץ על ידיית המזרק עט עד הסוף מטה, עד שלא נראה גופ המזרק הירוק (איור 21)

אין להרים את המזרק עט המוכן לשימוש בזמן ההזרקה!

אם תעשה זאת, מגן המכחט יונעל, יופיע פס צהוב, ולא תקבל את המינון המלא.

עם התחלת ההזרקה יתכן ותשמע צליל "קליק". המשך ללחוץ.
אם הנר מרגיש התנגדות, יש להפסיק בלחיצה. זהו מצב תקין.
התרופה מוזרקת בעת הלחיצה. יש לבצע זאת במהירות שמתאימה לו.

וודא שהזרקה הושלמה (ראה איור 22)
הזרקה הושלמה כאשר:

- הגוף הירוק אינו נראה לעין
- איןך יכול ללחוץ יותר על הידית מטה
- "יתכן ותשמע צליל "קליק"

הרם את המזרק עט כלפי מעלה (ראה איור 23)
הפס הצהוב מעיד על כך שהגן המחט נעל.

3. לאחר ההזרקה

יש להשליך את המזרק עט המשומש (ראה איור 24)

השליך את המזרק עט המשומש של טרמפהית לתוך מיכל המיועד לחפצים חדים מיד לאחר השימוש.

לאחר שהתמלא, יש לוודא שהנרג מרוקן את המיכל המיועד לחפצים חדים, לפי ההנחיות שקיבלת מהרופא או מהאחות.

אין להשליך את המזרק עט המוכן לשימוש לאשפזה הביתית.

אין למחזר את המיכל המיועד לחפצים חדים שהשתמשה בו.

בדוק את אתר ההזרקה (ראה איור 25)

ויתכן ותבחין בכמות מזעירות של דם או נזול באזור ההזרקה. הנח צמר גפן או פד גaza על

אזור ההזרקה ולחץ עד להפסקה מוחלטת של הדימום.

אין לשפשף את האзор. במידת הצורך, הדק אגד מידבק על האзор.


cutת ההזרקה הושלמה!

למיידנו נוסף פנה לרופא או לרוקח שלך.


מדריך מוקן לשימוש












1




2





מזרק עט מוכן לשימוש:




לפני השימוש

אחרי השימוש


איור 15 :




איור 16:




איור 17:




איור 20:






איור 21



איור 22


קליק



איור 23



איור 24



איור 25