

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**טרוליסיטי 1.5 מ"ג,
תמיסה להזרקה בעט מוכן
לשימוש**

החומר הפעיל ורכיביו:
 כל עט מוכן לשימוש מכיל:
 1.5 מ"ג דולגלוטיד ב- 0.5 מ"ל תמיסה
 (1.5 mg dulaglutide in 0.5 ml solution)

**טרוליסיטי 0.75 מ"ג,
תמיסה להזרקה בעט מוכן
לשימוש**

החומר הפעיל ורכיביו:
 כל עט מוכן לשימוש מכיל:
 0.75 מ"ג דולגלוטיד ב- 0.5 מ"ל תמיסה
 (0.75 mg dulaglutide in 0.5 ml solution)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספים".

קרא בעיון את העלון עד סוף בטרכם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
 תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טרוליסיטי משמשת לטיפול בסוכרת סוג 2 אשר אינה נשלטת כראוי במבוגרים, בנוסף לדיאטה ופעולות גופניות:

- טיפול ייחד כאשר טיפול במטפורמין אינו מתאים עקב אי סבלות או התווויות נגד.
- כתוספת לתרופות אחרות לטיפול בסוכרת.

קבוצה רפואיית: תרופות המשמשות לסוכרת, תרופות להורדת גליקוז בدم, לא כולל אינסולינים.

טרוליסיטי מכילה מרכיב פעיל הנקרא דולגלוטיד המשמש להורדת רמת הסוכר (גליקוז) במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 ויכול לסייע במניעת תחלואה לבבית.

סוכרת מסוג 2 הוא מצב בו גופך אינו מייצר מספיק אינסולין, והאינסולין שגופך מייצר אינו פועל כראוי. כאשר זה קורה, סוכר (גליקוז) מצבבר בדם.

חשוב להמשיך ולפעול על פי הנחיות הרופא, האחות או הרוקח בנוגע לתזונה ופעולות גופניות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (דולגלוטיד) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בפרק 6).

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- **לפני הטיפול בטROLISITI ספר לרופא אם:**

– אתה מטופל בדיאליזה, היית ותרופה זו אינה מומלצת עבורך במצב זה.

- אתה סובל מסוכרת מסווג 1 (הסוג בו הגוף שלך לא מייצר אינסולין כלל) מכיוון שתרופה זו עשויה שלך להתאים לך.
 - אתה סובל ממחמצת קוטנית סוכרתית (Diabetic Ketoacidosis - סיבוך של סוכרת אשר מתרחש כאשר הגוף שלך לא יכול לפרק גליקוז מאחר שאין מספיק אינסולין). הסימנים כוללים אי-בוד משקל מהיר, בחילה או הקאות, נשימה בעלת ריח מתוק, טעם מתוק או מתכתי בפה, או ריח שונה לשנתן או לדיעה.
 - יש לך בעיות שיכולมาตรฐาน חמורות או אם מדובר בשאר הגוף שלך למשך זמן ארוך מהרגיל [כולל התרוקנות איטית של הקיבה (גסטרופרזיס)].
 - סבלת בעבר מדלקת בלבול (פנקראטיטיס) אשר גורמת לכאבים חזקים בבטן ובגב שאינם חולפים.
 - אתה נוטל סולפונייל-אוריאה או אינסולין לטיפול בסוכרת, מאחר שהזה עלול לגרום לסוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה). יתכן שהרופא ישנה את המינון של תרופות אחרות אלו על מנת להפחית סיכון זה.
- טרוליסטי** היא לא תרופה המכילה אינסולין ועל כן אין להשתמש בה כתחליף לאינסולין.

תסמנים, לעיתים חמורים, של התרוקנות איטית של תחולת הקיבה כגון הרגשת מלאות, בחילה ו/או הקאה דווחו במקרים המשמשים **טרוליסטי**. ספר לרופא אם במהלך השימוש **טרוליסטי**, אתה מפתח בעיות חמורות בהתרוקנות הקיבה שלך שאין חולפות.

אם ידוע לך כי אתה עתיד לעבור ניתוח שבו תהיה תחת הרדמה (שינה), ספר לרופא שאתה נוטל **טרוליסטי**.

בתחילת הטיפול **טרוליסטי**, יתכן שתחוווה במקרה מסויימים אי-בוד נזילים/התיבשות, למשל במקרה של הקאות, בחילות ו/או שלשול העולמים לגרום לירידה בתפקוד הכלילי. חשוב להימנע מהתייבשות על ידי שתית' כמות גדולה של נזילים. דבר עם הרופא שלך אם יש לך שאלות או חששות כלשהם.

ילדים ומתבגרים
טרוליסטי אינה מומלצת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים מאחר שהוא לא נחקרה בחולים אלו.

אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר על כך לרופא או לרופק, כיון **טרוליסטי** עלולה להאט פניו קיבתי ולהשפיע על תרופות אחרות.

שימוש בתרופה ומדוזן
ניתן לך תחת **טרוליסטי** עם או ללא אРОחות.

הירין, הנקה ופוריות הירין

לא ידוע אם דולגוליטיד עלול לפגוע בעובר. על נשים בגיל הפוריות שיכולהו להיכנס להירין להשתמש באמצעות מנעה במהלך הטיפול עם דולגוליטיד. ספר לרופא אם אתה בהירין, חשבת שאת בהירין או מתכונת להיכנס להירין, מאחר שאין להשתמש **טרוליסטי** במהלך ההירין. היועץ ברופא בנווגע בדרך הטובה ביותר לשילוט ברמות הסוכר בدم במהלך ההירין.

הנקה
ספר לרופא אם מניקה או מעוניינת להניקה לפני נטילת תרופה זו. אל תשתמשי **טרוליסטי** אם אתה מניקה. לא ידוע אם דולגוליטיד עבר לחלב האם.

נהיגה ושימוש במכונות
ל**טרוליסטי** אין השפעה או יש השפעה מועטה על היכולת לנוהג או להשתמש במכונות. עם זאת, השימוש **טרוליסטי** בשילוב עם סולפונייל-אוריאה או אינסולין עלול לגרום לירידת רמות הסוכר בדם (היפוגליקמיה), דבר אשר עלול להפחית את יכולת הרכיז שלך. הימנע מנהיגה או שימוש במכונות אם יש לך סימנים כלשהם לסוכר נמוך בדם. ראה פרק 2, תחת סעיף "ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה" למידע על סיכון מוגבר לסוכר

נמור בدم ובפרק 4 "תופעות לוואי" לגבי סימני האזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם. שוחח עם הרופא שלא קיבלת מידע נוסף.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופתהתרופה מכילה פחות מ- 1 מילימול נטרן (23 מ"ג) בכל מנת, כך שילמעשה היא נחשבת 'טולות נטרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל הוא: בשימוש בטיפול יחיד, המינון המקבול הוא 0.75 מ"ג פעמי שבוע. בשימוש עם תרופות אחרות לסוכרת, המינון המקבול הוא 1.5 מ"ג פעמי שבוע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כל עט מכיל מנת שבועית אחת של טרוליסיטי (0.75 מ"ג או 1.5 מ"ג). כל עט מספק רק מנת אחת.

ניתן להשתמש בטרוליסיטי בכל שעה במהלך היום, עם או ללא ארוחות. עדיף להשתמש בתרופה באותו יום בכל שבוע. על מנת לעזור לך זכור, "תacen שתרצה לסמן את היום בשבוע בו אתה מזניק את המנה הראשונה על גבי אריזת התכשיר, או ביום".

טרוליסיטי מזניקה מתחת לעור (הזרקה תת-עורית) באזורי הבطن או הרגל העליונה (ירך). אם הזרקה ניתנת על ידי מישחו אחר, ניתן להזריק בזרוע העליונה.

אם תרצה בכר, ניתן להשתמש באותו אזור בגוף בכל שבוע. אך הקפיד לבחור אתר הזרקה שונה בהתאם לאזור זה.

אם אתה נוטל טרוליסיטי עם סולפוניל-אוריאה או אינסולין, חשוב לבדוק את רמות הגלוקוז בדם כדי שהוורו לך הרופא, הרוקח או האחות.

קרא בקפידה את "הוראות השימוש" של העט לפני השימוש בטרוליסיטי.

אם **נטלת בטיעות מינון גבוה** יותר או אם בטיעות הזריקILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. מינון יתר של התרופה הזה עלול לגרום לרמות נמוכות מדי של סוכר בדם (היפוגליקמיה) ועלול לגרום לך לב침לה או להתקאות.

אם **שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, ונותרו לפחות 3 ימים לפני הזמן המתוכנן של המנה הבאה**, יש להזריק את המנה בהקדם האפשרי. הזרק את המנה הבאה ביום הרגיל.

אם **נותרו פחות מ- 3 ימים לפני הזמן המתוכנן של המנה הבאה**, דלג על המנה שנשכחה והזrok את המנה הבאה ביום הרגיל.

אין לקחת מנת כפולה על מנת לפחות על מנת שנשכחה.

אם יש צורך, ניתן גם לשנות את היום בשבוע בו אתה מזניק טרוליסיטי, כל עוד עברו לפחות 3 ימים מאז המנה[האחרונה של טרוליסיטי](#).

יש להתميد בטיפול כדי שהומליך על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק להשתמש בטרוליסטי ללא היעוצות ברופא. אם תפסיק להשתמש בטרוליסטי, רמות הסוכר בدم שלך עלולות לעלות.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק את התוויות והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנהן דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטרוליסטי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

תופעות לוואי חמורות

תופעות לוואי נדירות (מופיעות אצל עד מושתמש 1 מתוך 1,000):
- תגובות אלרגיות חמורות (תגובה אנאפילקטית, אנגיאידמה).

עליך לפנות לרופא באופן מיידי אם אתה חווה **תסמינים כגון:** פיראה, גירוד והתנפחות מהירה של רקמות הצוואר, הפנים, הפה או הגרון, סרפתת (אורטיקרייה) וקושי בנשימה.

- דלקת לבלב חריפה (פנקראטיביס חריפה) שיכולה לגרום לכאב חמור בבטן ובגב שאינו חולף.
פנה מיד אל הרופא אם אתה חווה **תסמינים כהלאה.**

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (לא ניתן לקבוע את שכיחותן מהמידע הקיים):

- חסימת מעיים - סוג חמור של עצירות בלתי-תסמיינית נספירם כגון כאב בطن, נפיחות או הקאה.
פנה מיד אל הרופא אם אתה חווה **תסמינים כהלאה.**

תופעות לוואי אחרות

תופעות לוואי שכיחות מודוד (מופיעות אצל יותר מושתמש 1 מתוך 10):

- בחילות – לרוב חולפות עם הזמן.
- הקאות – לרוב חולפות עם הזמן.
- שלשול – לרוב חולף עם הזמן.
- כאבי בטן.

בדרכן כל תופעות אלו אין חמורות. הן שכיחות יותר בתחילת הטיפול בדולגולותיד אך הן חולפות עם הזמן אצל רוב המטופלים.

- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) היא תופעה שכיחה מאוד כאשר משתמשים בדולגולותיד יחד עם תרופות אחרות המכילות מטפורמין, סולפוניל-אוריה או אינסולין. אם אתה נוטל סולפוניל-אוריה או אינסולין, יתכן שייהי צריך בהורדת מינון התרופה בזמן השימוש בדולגולותיד.
- **תסמינים של סוכר נמוך** בדם יכולים לכלול כאב ראש, ישוניות, חולשה, סחרחות, תחושת רעב, הבלבול, נרגנות, דופק מהיר והצעה. הרופא ינחה אותך כיצד לטפל בסוכר נמוך בדם.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות אצל עד מושתמש 1 מתוך 10):

- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) היא תופעה שכיחה כאשר משתמשים בדולגולותיד טיפול יחיד או בשילוב עם מטפורמין ופיגליידזון יחד או בשילוב עם מעכבי קיו-טרנספורטר 2 של נתרן-גלוקוז (SGLT2) עם או ללא מטפורמין. לפירוט של **תסמינים אפשריים** ראה מעלה בסעיף **תופעות לוואי שכיחות** מאד.

- תחושה פוחתת של רעב (ירידה בתאבון).
- בעיות בעיכול.
- עצירות.
- גזים (נפיחנות).
- נפיחות בבטן.

- מחלת ההחזר הוושטי (נקראת גם מחלת ריפולוקס קיבה-וושט - GERD) או צרבת - מחלת הנגרמת על ידי חזרת חומצה מהקיבה לוושט דרך הצינור המחבר בין הפה לקיבה.
- ג'יהוקים.
- תחששות עייפות.
- עלייה בדופק.
- האטה בהולכת הזרמים החשמליים בלב.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות אצל עד 1 מתוך 100 מטופלים):

- תגובה באטר ההזרקה (כגון: פריחה או אדמדומיות).
- תגובות אלרגיות (رجישות-יתר) (כגון: נפיחות, חרלה (פריחה עורית בולטת ומגרדת)).
- התיבשות, לרוב מקושתת עם בחילה, הקאה ו/או שלשול.
- אבני מרה.
- דלקת בכיס המרה.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות אצל עד 1 מתוך 1,000 משתמשים):

- עיכוב בהתרוקנות הקיבה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על

תופעות לוואי, או ע"י כנסיה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי תווית העט ועל גבי האזזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

יש לאחסן במקדר (C-8°C-2°). אין להקפיא.

יש לאחסן באזזה המקורי בצד להגן מאורה.

בזמן השימוש, ניתן לאחסן את טרוליסטי עד 14 ימים בטמפרטורה של מתחת ל-30°C. אם העט הושאר מחוץ למקדר לתקופה של מעל 14 ימים, יש להשליך את העט גם אם תוקפו עדין לא פג.

אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין שהעט פגום, או שהתרופה עכורה, شيئاה את צבעה או שיש בה חלקיקים.

אין להשליך תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

ኖסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

mannitol; trisodium citrate dihydrate; polysorbate 80; citric acid anhydrous; water for injection.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזזה:

טרוליסטי היא תמיסה צלולה וחרסורת צבע להזרקה בעט מוכן לשימוש.

כל עט מוכן לשימוש מכיל 0.5 מ"ל תמיישה.

העט המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי בלבד.
כל ארזה מכילה 4 עטים מוכנים לשימוש.

שם בעל הרישום וכתובתו: אלי לילי ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411.

שם היצרן וכתובתו: אלי לילי בע"מ, אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

ערוך באוקטובר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

טרוליסיטי 0.75 מ"ג: 154-39-34356-00

טרוליסיטי 1.5 מ"ג: 154-40-34357-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שניהם המינים.