



פייזר פי אפ' אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ
רחוב שנקר 9, תל. 12133
הרצליה פיתוח, ישראל 46725
טל: 972-9-9700501 פקס: 972-9-9700500

נובמבר 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

ברצוננו להודיעך על עדכון ועלון לרופא של **Unasyn 1.5gr, Unasyn 3.0gr**:

Indications:

Sulbactam sodium/ampicillin sodium IM/IV is indicated for the treatment of infections due to susceptible beta-lactamase producing strains of microorganisms in the following conditions:

- 1) Skin and Skin Structure Infections.
- 2) Intra-Abdominal Infections.
- 3) Gynecological Infections.

להלן העדכנים העיקריים ועלון לרופא:

Description

~~3 g of UNASYN® (2 g ampicillin as the sodium salt plus 1 g sulbactam as the sodium salt) parenteral contains approximately 230 mg (10 mEq) of sodium.~~

~~Unasyn 3.0 Gr.~~

~~This medicinal product contains approximately 230.23 mg of sodium per vial, equivalent to 11.51% of the WHO recommended maximum daily intake of 2 g sodium for an adult.~~

Warnings

Severe Cutaneous Adverse Reactions

UNASYN® may cause severe skin reactions, such as toxic epidermal necrolysis (TEN), Stevens-Johnson syndrome (SJS), **drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)**, dermatitis exfoliative, erythema multiforme, and Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP). If patients develop a skin rash they should be monitored closely and UNASYN® discontinued if lesions progress (see **CONTRAINdications** and **ADVERSE REACTIONS** sections).

Adverse reactions

Infections and Infestations: Clostridioides difficile- associated diarrhea (see **WARNINGS** sections).

Gastrointestinal Disorders: Abdominal pain, cholestatic hepatitis, cholestasis, hyperbilirubinemia, jaundice, abnormal hepatic function, melena, gastritis, stomatitis, dyspepsia, and black "hairy" tongue and ~~Clostridium difficile~~ associated diarrhea (see **CONTRAINDICATIONS** and **WARNINGS** sections).

Musculoskeletal and Connective Tissue Disorders: Arthralgia

Skin and Subcutaneous Tissue Disorders: Toxic epidermal necrolysis,-Stevens-Johnson syndrome, **drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)**, angioedema, Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), erythema multiforme, exfoliative dermatitis, urticaria (see **CONTRAINDICATIONS** and **WARNINGS** sections), and linear IgA bullous dermatosis.

Directions for Use

TABLE 5

UNASYN® Vial Size	Volume of Diluent to be Added	Withdrawal Volume*
1.5 g	3.2 mL	4.0 mL
3.0 g	6.4 mL	8.0 mL

*There is sufficient excess present to allow withdrawal and administration of the stated volumes.

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החומרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הколоים תוספת מידע, השמטה מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החומרה. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.

<https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp?safa=12133>
לחילופין, לקבלת עליון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פיזר פי אפי פרמצטטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד.
הרצליה פיתוח, 46725.

ברכה,
אורטל עבודי
רוקחת ממונה